

〔重刊訂正本〕

中國醫學大成

錢若利題



【十一】


83453

〔重刊訂正本〕

中國醫學大成

（二）

上海科學技術出版社



C0156851

中國醫學大成 (全套共五十冊)

上海科學技術出版社出版

(上海瑞金二路四五〇號)

新華書店上海發行所發行

上海市印刷十廠印刷

開本七八七×一〇九二

三十二開

精裝

總字數二二,七九〇,〇〇〇

總印張八六二

一九九〇年六月第一版 一九九〇年六月第一次印刷

醫燈續焰提要

明王紹隆著。門人潘楫輯註。皆武林人。明萬歷壬子夏。楫由朱仲修相引。乃負笈先生之門。先生與楫同里。相去僅百武。以故朝夕隨從。風雨無阻。先生初命楫讀靈素難經。本經傷寒金匱脈經。隨讀隨講。興會所至。口言心應。三年如一日。迨先生西歸。時爲天啓甲子之二月。楫欲述其指授。愧非游夏之才。不述又無以畢先生之志。會庚寅有以崔氏脈訣索講者。讀之良備。用爲張本。益以先生平日所教者。註解之。而後附以方。名曰醫燈續焰。意謂挑其燈而續其焰耳。此乃潘先生自序中所言者也。首論血脈隧道。法地合心。始生營衛。氣動脈應。寸口大會。男女定位。七診九候。四時胃氣。平和遲數。內外因。各脈形象。各脈主病。脈病順逆。外感內傷。各脈證。奇經入脈。反關脈。真藏脈。分列八十一篇。補遺各證療法。望診。聞診。問診。辯舌。醫範。病則。凡二十一卷。因脈及證。因證及方。舉從前所闡靈素諸家之要。盡融會其間。足使讀者瞭如指掌。自此一續。竟得以普焰十方。其有功於後世。曷其有極。

陳序

武林城之東偏。曩有賢者出於其間。曰紹隆王先生。其爲人也。樸邀遲重。人莫知之。敝冠穿履。參紹覺師。師心知其賢。已而得道。遂發靈蘭金匱之藏。盡其術。皆解驗之。其治病也。劃然無疑難矣。先生沒而道大行。潘翁鄧林。乃其大弟子也。以故城東有潘氏之學。數年以來。翁道日隆。望日重。而翁必嘆然曰。嘻。此吾王先生之教也。著脈及證。數萬言。啜叶者衆。而翁必退然曰。嘻。此吾王先生之教也。人以此賢潘氏。求爲弟子者。惟恐後。僕觀自古師弟之間。蓋難言之。自馬融大儒。不能不疑其弟子康成。而呂步舒。或不知其師書。況夫士無賢不肖。入朝見嫉。女無美惡。入宮見妬。美好者。不祥之器。秦太醫李醯之事。豈必不見於門下哉。而翁終身不忘其師。諸弟子事翁益謹。取黃帝扁鵲脈書。及近世來諸名家。條分縷析。講習不倦。翁之所以教弟子。如王先生之於翁。而弟子之事翁。一如翁之所以事王先生。可不謂難耶。夫翁生平誠長者。其神術若長桑陽慶。固不待言。乃諸子以魁傑之才。丘園之秀。厭棄章句。敝屣功名。而心切嚮往。如七十子之事孔子。此非翁之道。

德殊妙。能致是哉。僕於是尤有感焉。士處斯世而全性命。亦極難耳。以譙玄之術。數而難免。以李業之志節而難免。以左慈之幻術而難免。以霍原之教授而難免。翁與弟子。治其方書。與物無害。與人無爭。亦可謂高蹈君子。質有其文矣。此尤僕所慨嘆。以爲不可及者。歲在執徐。翁春秋六十。適醫燈一書告竣。僕樂得而讀之。其網羅羣有。剖析毫芒。至矣。而猶不敢自名一家。比於詮註。翁學之富。技之精。志之謙。此豈末學淺術所能測其堂奧哉。間者蔣子介眉屬予言。因遂述其師弟源流之義。以爲翁壽。卽以爲此書之序。然則翁之所以壽世者。其又在是也夫。四明陳朝輔燮五氏謹序於西冷之不繫舟。

潘序

予素不諳醫。嘗從二三知己後。講論切磋。麓聞大義。乃知其道與易通。最精微。亦最易簡也。近世業醫家。源流弗徹。好爲奇詭之說。以欺人。而其恟恍支離。誤人滋甚。宗人鄧林子。沉心此道。博綜深思。寂寂東城水竹間者數十年。不藉人知而知藉甚。申酉後。文人墨士。疎筆硯。棄制舉。皆負笈鄧林之門。鄧林初與挾素問陰陽生化之奧。晰靈樞經脈俞節之微。次辯越人之難經。探倉公之斷案。闡仲景論叔和以及河間。潔古。東垣。丹溪等諸家異同之說。皆有以究其本而折其衷。座下數十輩。率一時名流。慮無不洞開心胸者。最後乃取紫虛真人所纂四言舉要而節解焉。因脈及證。因證及方。舉從前所闡靈素諸家之要。盡融會於平實切近之中。使讀者見如指掌。此所謂最精微。最易簡也。以爲菽粟卽菽粟。以爲珍奇卽珍奇。彼偏僻詭誕。欺人誤人者。視之竟何如耶。書成。更名醫燈續焰。藉此一續。而後得以普炤十方。其功德於後世者。又何可紀極。鄧林意蕭淡。不屑屑逐聲利。視診之餘。卽閉戶垂簾。觴詠以自樂。其高致如此。吾友張卿子。玄湛淵微。覃精易理。與鄧

林隔水而居。兩家門人。無少別異。問難和衷。相長相益。一時相傳爲藝林盛事。而予亦得數過從。聆閎論焉。嗚呼。若鄧林者。進於道矣。技云乎哉。壬辰初夏宗末之淇謹序。

自敘

紹隆王先生者。楫之受業師也。楫童年卽知之。萬曆壬子夏。有同盟朱仲修相引。乃負笈先生之門。先生與楫同里。相去僅百武。以故朝暮隨從。風雨無阻。先生蓋未嘗暇豫倦教也。先生初命楫讀靈素。次本經。次難經。次傷寒論。次金匱。次脈經。隨讀隨講。不升座。不據席。不作學究態。及其興到理融。口言心應。開闔也。升降也。方圓也。動靜也。上下之感應也。左右之往來也。折之則千。熔之則一卷。舒六合。搏弄五行。真令花落空中。風生座上。愚如楫者。亦隱隱躍躍。有瞻前忽後景象。先生豈常人也哉。先生少孤。早棄學。於經書義理。漠不相入。傳家醫業。坐此而廢。雖嘗以此爲邑邑。然亦相安於無可奈何。已弱冠。聽講於土橋紹覺師。師憫其鈍樸。指令求慧。先生乃發願拜清淨。三年如一日。忽心中若初燃之燈。乍明乍暗。久之。覺燈光漸大。燈焰漸高。試一開卷。便能解。非復疇昔之茫然矣。自此日明。一日卽大乘中秘。義理幽玄之書。皆若焚山照渚。水陸現形。一無逃遁者。先生道業因之尊崇。家聲藉以振起。益信先生之非常人也。先生西歸。僅五十有九。時爲天啓甲子。

之二月。迄今三十年所。及門者。亦復凋謝殆盡。楫老矣。欲述其指授。愧非游夏之才。不述。又無以畢先生之志。會庚寅夏日。偶及門有以崔氏脈訣索講者。讀之良備。因用爲張本。下以先生平日所教者。註解之。而後附以方。命曰醫燈續焰。意謂挑燈而續其焰耳。若曰。卽此是燈。則吾豈敢。

先生於楫。名則師生。情同父子。受恩罔極。圖報無從。嘗欲作一傳。以表先生之才異。每苦無因。今本編註成。先後翻閱。皆本先生胸臆。故不敢僭爲己有。敘表於首。以充作傳之意。

不肖潘楫敘

潘隱君鄧林先生傳

眷晚生蔣芑拜撰

隱君姓潘氏。名楫。字碩甫。一號鄧林。先世三川人。自中允公某。扈建炎皇帝蹕。因家武林。十六世傳至君。雖不仕。少以孝弟聞閭里。及壯博學有經世才。負大略。遭時喪亂。遁跡城隅。德益高。東南人士師尊之。至不敢名。且字。皆曰鄧林先生。先生父雲喬公。丈夫子四舉。先生最後。三兄走通邑大都。賈雲喬公經營先生就外傳。不令知生產業。先生移瞬輒誦如宿習。髮甫燥。一日忽請雲喬公曰。兄也牽車有弟不能代。兄奉甘旨碩勞。大人爲兒釐肉漿酒謀。卜商氏何人哉。事父母能竭其力。未學謂學兒質下中。頗及效仲由負米故事。卽百里猶膝下耳。會延教授餘杭溪南者。束修之肉不缺供。與三兄洗腆。分慶伏臘。雍雍如也。雲喬公絕憐愛之。念佳兒須卜佳婦。議先生婚。定情已協告。先生長跪阿母前。作嬰兒啼。不欲遽受室。割養妻子。迨遲久婚成。先生孝道愈不衰。雲喬公素倜儻多奇。鄙小儒章句學。顧盼諸子。惟先生神似。先生配徐孺人卒。繼配楊孺人。尤健持門戶。與先生執子婦

禮足娛兩老人堂上。雲喬公遂決策命先生遊。觀先生膽智。先生亦內顧少慰。從張將軍建閩粵東焉。當是時。楨朝亂起。所在羣盜蟻屯蜂合。不可爬梳。粵峒獠窺伺蠢動。先生角巾烏衣。以如意指麾方略。出奇搗渠。渠一鼓奪隘。餘莫敢仰視。爭牛酒下先生。先生功還閩帥。歸省親。柔聲怡容。仍一孝子。無赫赫功。見顏面也。雲喬公偵知大喜。語楊孺人曰。若真吾兒。我家安仁三十年一進階。鬱鬱著閒居賦。何如此兒。差快人意。復命先生往。先生竊見父母。飲啖減疇昔。心憂之。詭言候張將軍騎吏來同發。已而雲喬公夫婦同夕逝。先生號血數斗。偉軀者骨立矣。喪畢復遊粵。張將軍執先生手。如兩臂復完。流氛獷甚。張遷轉去粵。深入敗沒。先生病不與俱。且見事勢多不可爲。還里門。自擬清涼居士。賣藥都市中。厥後天下大定。交遊多至大官。欲舉先生於朝。先生掉頭不悅。坐醫隱。人以伯休目之。自壯及髦。凡受業先生者。數百輩。觀其器宇。卽識爲潘門弟子。有以醫從先生遊。飲上池。照不失尺寸。知先生者曰。先生寄志於醫。蓋以兄西懷君善病。先生體阿母志。往師王紹隆。不但燒鬚灼艾。終日夕視脈和藥。必精。故通於神明。如此三兄。先先生死。未亡暨藐遺孤。悉就先生。生分哺。死歸葬。又其常行。無足異者。所著書多可傳。詩

文落落有高致。年七十四。壽終於家。往歲予疾瀕殆。先生方寸匕起之。日一筭輿過余。隻雞尊酒。談譙歡甚。觀先生飲戶第一。酡顏儼紅玉。與人坐春風中。知其有隱德者。其子杓燦蒼與。皆邑知名士。蒼與早夭。杓燦敦倫尙節。槩有父風。而才尤雋爽。光大先生門戶未艾。先生沒後三年。與余遊交最善。蔣芑曰。先生非隱者也。而德以成其隱。時會然也。身不及顯。其子欲無顯得乎。惟孝友於兄弟。效奇幕府。晚晦跡於方書。是亦爲政焉。乃或父子相戾。親兄弟爭錢財。亦獨何哉。

凡例

- 一、正文崔創李刪。渾然合一。本註節而解之。門類雖藉以分。行句實因之斷。恐讀者小礙。是刻全文一帙於首。以便統閱焉。
- 一、註中辯證論脈理。與義微。非引據經書。未爲明確。自靈素而下。非秦越長沙。卽王劉朱李。不由別徑。盡屬當家。庶有志於斯者。得以從一門入也。
- 一、醫書關人軀命。唯貴義理精詳。原不取文章鬪豔也。故註中俗句俚言。淺而易見者。概不修飾。在讀者無探索之難。而不佞亦免鈎致之苦。洵稱兩便。
- 一、方者方也。如四方之不可移易也。湯丸膏散。佐使君臣。寒熱溫涼。重輕多寡。各有義意。若不釋評。了難窺測。今最要最切者。業先評定。餘多未及。尙俟補之。
- 一、所選方。皆係古今經驗。製出名家。間有冗雜無緒。及藥難覓而炮製怪誕者。俱置不錄。
- 一、癰疽胎產。小兒等書。各有專刻。此但撮論其要。至若非常之證。必效之方。則又毫無挂漏也。珠玉具存。瓦礫棄之。何礙哉。

一、補遺者。補其遺漏也。正文論脈。可謂詳矣。如經云四診者。則缺其三。論病。可謂盡矣。若周於一身者。尙遺其幾。如六淫有名而無病。註中旣衍其病。何可不選其方。今并方論而悉補之。以成全璧。

一、附餘者。附其餘事也。是編曰正文。曰註。曰評。則脈證治方之局全矣。後復拾其遺而補之。可謂全而又全。何餘之有。殊不知診治藉於醫者。脈證見於病人。醫而無品。則醫不行。病不善調。則病不愈。故又以醫範病。則繫於後。名曰附餘。實非餘於局外也。醫家病家。當識此爲第一義。乃可。

醫燈續焰

正文

本文計二千六百四十言。凡六百六十句。原名四言脈訣。乃宋南康紫虛隱君。崔嘉彥希範所撰。明
蘄州月池子。李言聞子郁刪補之。更名四言舉要。其間脈證病因始備。但無註釋。則讀者不知其所
從來。反增繁惑。庚寅春。因及門之請。乃鼓志爲釋。不敢旁引外書。唯首遵靈素。次仲景傷寒金匱。下
及張朱劉李諸賢。論有精純明確者採之。亦不取以辭害意。并妄入臆說。如意奧理微。則設喻形容。
翻覆錯辯。務令恍然在目。豁然開心。至若文之拙。字之俚。在所勿論也。因僭更名醫燈續焰。尙俟高
明者鑒教之。

潘楫識

脈乃血派。氣血之先。血之隧道。氣息應焉。其象法地。血之府也。心之合也。皮之部
也。資始於腎。資生於胃。陽中之陰。本乎營衛。營者陰血。衛者陽氣。營行脈中。衛行
脈外。脈不自行。隨氣而至。氣動脈應。陰陽之誼。氣如橐籥。血如波瀾。血脈氣息。上

下循環。十二經中。皆有動脈。惟手太陰。寸口取決。此經屬肺。上系吭嗌。脈之大會。息之出入。一呼一吸。四至爲息。日夜一萬三千五百。一呼一吸。脈行六寸。日夜八百十丈爲準。初持脈時。令仰其掌。掌後高骨。是謂關上。關前爲陽。關後爲陰。陽寸陰尺。先後推尋。心肝居左。肺脾居右。腎與命門。居兩尺部。魂魄穀神。皆見寸口。左主司官。右主司府。左大順男。右大順女。本命扶命。男左女右。關前一分。人命之主。左爲人迎。右爲氣口。神門決斷。兩在關後。人無二脈。病死不愈。男女脈同。唯尺則異。陽弱陰盛。反此病至。脈有七診。曰浮中沉。上下左右。消息求尋。又有九候。舉按輕重。三部浮沉。各候五動。寸候胸上。關候膈下。尺候於臍下。至跟踝。左脈候左。右脈候右。病隨所在。不病者否。浮爲心肺。沉爲腎肝。脾爲中州。浮沉之間。心脈之浮。浮大而散。肺脈之浮。浮濇而短。肝脈之沉。沉而弦長。腎脈之沉。沉實而濡。脾胃屬土。脈宜和緩。命爲相火。左寸同斷。春弦夏洪。秋毛冬石。四季和緩。是謂平脈。太過實強。病生於外。不及虛微。病生於內。春得秋脈。死在金日。五臟准此。推之不失。四時百病。胃氣爲本。脈貴有神。不可不審。調停自氣。呼吸定息。四至五至。平和之則。三至爲遲。遲則爲冷。六至爲數。數卽熱證。轉遲轉冷。轉數轉熱。遲數旣明。浮沉當

別。浮沉遲數。辨內外因。外因於天。內因於人。天有陰陽。風雨晦明。人喜怒憂。思悲恐驚。外因之浮。則爲表證。沉裏遲陰。數則陽盛。內因之浮。虛風所爲。沉氣遲冷。數熱何疑。浮數表熱。沉數裏熱。浮遲表虛。沉遲冷結。表裏陰陽。風氣冷熱。辨內外因。脈證參別。脈理浩繁。總括於四。旣得提綱。引伸觸類。浮脈法天。輕手可得。汎汎在上。如水漂木。有力洪大。來盛去悠。無力虛大。遲而且柔。虛甚則散。渙漫不收。有邊無中。其名曰芤。浮小爲濡。綿浮水面。濡甚則微。不任尋按。沉脈法地。近於筋骨。深深在下。沉極爲伏。有力爲牢。實大弦長。牢甚則實。愒愒而強。無力爲弱。柔小如綿。弱甚則細。如蛛絲然。遲脈屬陰。一息三至。小駛於遲。緩不及四。二損一敗。病不可治。兩息奪精。脈已無氣。浮大虛散。或見芤革。浮小濡微。沉小細弱。遲細爲澁。往來極難。易散一止。止而復還。結則來緩。止而復來。代則來緩。止不能回。數脈屬陽。六至一息。七疾八極。九至爲脫。浮大者洪。沉大牢實。往來流利。是謂之滑。有力爲緊。彈如轉索。數見寸口。有止爲促。數見關中。動脈可候。厥厥動搖。狀如小豆。長則氣治。過於本位。長而端直。弦脈應指。短則氣病。不能滿部。不見於關。唯尺寸候。一脈一形。各有主病。數脈相兼。則見諸症。浮脈主表。裏必不足。有力風熱。無力血弱。浮

遲風虛。浮數風熱。浮緊風寒。浮緩風濕。浮虛傷暑。浮芤失血。浮洪虛火。浮微勞極。
浮濡陰虛。浮散虛劇。浮弦痰飲。浮滑痰熱。沉脈主裏。主寒主積。有力痰食。無力氣
鬱。沉遲虛寒。沉數熱伏。沉緊冷痛。沉緩水畜。沉牢痼冷。沉實熱極。沉弱陰虛。沉細
痺濕。沉弦飲痛。沉滑宿食。沉伏吐利。陰毒聚積。遲脈主臟。陽氣伏潛。有力爲痛。無
力虛寒。數脈主腑。主吐主狂。有力爲熱。無力爲瘡。滑脈主痰。或傷於食。下爲畜血。
上爲吐逆。瀋脈少血。或中寒濕。反胃結腸。自汗厥逆。弦脈主飲。病屬膽肝。弦數多
熱。弦遲多寒。浮弦支飲。沉弦懸痛。陽弦頭痛。陰弦腹痛。緊脈主寒。又主諸痛。浮緊
表寒。沉緊裏痛。長脈氣平。短脈氣病。細則氣少。大則病進。浮長風癇。沉短宿食。血
虛脈虛。氣實脈實。洪脈爲熱。其陰則虛。細脈爲濕。其血則虛。緩大者風。緩細者濕。
緩瀋血少。緩滑內熱。濡小陰虛。弱小陽竭。陽竭惡寒。陰虛發熱。陽微惡寒。陰微發
熱。男微虛損。女微瀉血。陽動汗出。陰動發熱。爲痛與驚。崩中失血。虛寒相搏。其名
爲革。男子失精。女子失血。陽盛則促。肺癰陽毒。陰盛則結。疝瘕積鬱。代則氣衰。或
泄膿血。傷寒心悸。女胎三月。脈之主病。有宜不宜。陰陽順逆。凶吉可推。中風浮緩。
急實則忌。浮滑中痰。沉遲中氣。尸厥沉滑。卒不知人。入臟身冷。入腑身溫。風傷於

衛。浮緩有汗。寒傷於營。浮緊無汗。暑傷於氣。脈虛身熱。濕傷於血。脈緩細濇。傷寒熱病。脈喜浮洪。沉微濇小。證反必凶。汗後脈靜。身涼則安。汗後脈躁。熱甚必難。陽病見陰。病必危殆。陰病見陽。雖困無害。上不至關。陰氣已絕。下不至關。陽氣已竭。代脈止歇。臟絕傾危。散脈無根。形損難醫。飲食內傷。氣口急滑。勞倦內傷。脾脈大弱。欲知是氣。下手脈沉。沉極則伏。濇弱久深。六鬱多沉。滑痰緊食。氣濇血芤。數火細濕。滑主多痰。弦主留飲。熱則滑數。寒則弦緊。浮滑兼風。沉滑兼氣。食傷短疾。濕留濡細。瘧脈自弦。弦數者熱。弦遲者寒。代散者折。洩瀉下利。沉小滑弱。實大浮洪。發熱則惡。嘔吐反胃。浮滑者昌。弦數緊濇。結腸者亡。霍亂之候。脈代勿訝。厥逆遲微。是則可怕。咳嗽多浮。聚胃關肺。沉緊小危。浮濡易治。喘急息肩。浮滑者順。沉濇肢寒。散脈逆證。病熱有火。洪數可醫。沉微無火。無根者危。骨蒸發熱。脈數而虛。熱而濇小。必殞其軀。勞極諸虛。浮更微弱。土敗雙弦。火炎急數。諸病失血。脈必見芤。緩小可喜。數大可憂。瘀血內畜。却宜牢大。沉小濇微。反成其害。遺精白濁。微濇而弱。火盛陰虛。芤濡洪數。三消之脈。浮大者生。細小微濇。形脫可驚。小便淋瀝。鼻頭色黃。濇小無血。數大何妨。大便燥結。須分氣血。陽數而實。陰遲而濇。癰乃重陰。狂

乃重陽。浮洪吉兆。沉急凶殃。癰脈宜虛。實急者惡。浮陽沉陰。滑痰數熱。喉痺之脈。數熱遲寒。纏喉走馬。微伏則難。諸風眩運。有火有痰。左濇死血。右大虛看。頭痛多弦。浮風緊寒。熱洪濕細。緩滑厥痰。氣虛弦爽。血虛微濇。腎厥弦堅。真痛短澁。心腹之痛。其類有九。細遲從吉。浮大延久。疝氣弦急。積聚在裏。牢急者生。弱急者死。腰痛之脈。多沉而弦。兼浮者風。兼緊者寒。弦滑痰飲。濡細腎著。大乃腎虛。沉實閃肭。脚氣有四。遲寒數熱。浮滑者風。濡細者濕。痿病肺虛。脈多微緩。或濇或緊。或細或濡。風寒濕氣。合而為痺。浮濇而緊。三脈乃備。五疸實熱。脈必洪數。濇微屬虛。切忌發渴。脈得諸沉。責其有水。浮氣與風。沉石或裏。沉數為陽。沉遲為陰。浮大出厄。虛小可驚。脹滿脈弦。土制於木。濕熱數洪。陰寒遲弱。浮為虛滿。緊則中實。浮大可治。虛小危極。五臟為積。六腑為聚。實強者生。沉細者死。中惡腹脹。緊細者生。脈若浮大。邪氣已深。癰疽浮數。惡寒發熱。若有痛處。癰疽所發。脈數發熱。而痛者陽。不數不熱。不痛陰瘡。未潰癰疽。不怕洪大。已潰癰疽。洪大可怕。肺癰已成。寸數而實。肺痿之形。數而無力。肺癰色白。脈宜短濇。不宜浮大。唾糊嘔血。腸癰實熱。滑數可知。數而不熱。關脈芤虛。微濇而緊。未膿當下。緊數膿成。切不可下。婦人之脈。以血為

本血旺易胎。氣旺難孕。少陰動甚。謂之有子。尺脈滑利。妊娠可喜。滑疾不散。胎必三月。但疾不散。五月可別。左疾爲男。右疾爲女。女腹如箕。男腹如釜。欲產之脈。其至離經。水下乃產。未下勿驚。新產之脈。緩滑爲吉。實大弦牢。有證則逆。小兒之脈。七至爲平。更察色證。與虎口文。奇經八脈。其診又別。直上直下。浮則爲督。牢則爲衝。緊則任脈。寸左右彈。陽蹻可決。尺左右彈。陰蹻可別。關左右彈。帶脈當訣。尺外斜上。至寸陰維。尺內斜上。至寸陽維。督脈爲病。脊強癰瘤。任脈爲病。七疝瘕堅。衝脈爲病。逆氣裏急。帶主帶下。臍痛精失。陽維寒熱。目眩僵仆。陰維心痛。胸脇刺築。陽蹻爲病。陽緩陰急。陰蹻爲病。陰緩陽急。癰癩瘕瘕。寒熱恍惚。八脈脈證。各有所屬。平人無脈。移於外絡。兄位弟乘。陽溪列缺。病脈旣明。吉凶當別。經脈之外。又有真脈。肝絕之脈。循刀責責。心絕之脈。轉豆躁疾。脾則雀喙。如屋之漏。如水之流。如孟之覆。肺絕如毛。無根蕭索。麻子動搖。浮波之合。腎脈將絕。至如省客。來如彈石。去如解索。命脈將絕。蝦遊魚翔。至如湧泉。絕在膀胱。真脈旣形。胃氣已無。參察色證。斷之以臆。

醫燈續焰目錄

卷一

血脈隧道第一	一
法地合心第二	二
始生榮衛第三	三
氣動脈應第四	四
寸口大會男女定位第五	四
七診九候第六	九
四時胃氣第七	一〇
平和遲數第八	一三
內外因第九	一四
浮脈第十	二一

醫燈續焰目錄

卷二

沉脈第十一	二二
遲脈第十二	二三
數脈第十三	二四
長脈第十四	二五
短脈第十五	二六
浮脈主病第十六	一
參耆四物湯	四
四君子湯	四
九味羌活湯	五
仲景麻黃湯	五

一

清暑益氣湯·····	五
百一十味香薷飲·····	七
當歸補血湯·····	七
瓊玉膏·····	七
六味地黃丸·····	八
八味地黃丸 <small>即金匱腎氣丸</small> ·····	八
十全大補湯·····	八
生脈散·····	九
大造丸·····	九
八珍湯·····	一〇
仲景苓桂朮甘湯·····	一一
仲景小青龍湯·····	一一
二陳湯·····	一一
沉脈主病第十七·····	一二

王隱君滾痰丸·····	一三
仲景大承氣湯 <small>附小承氣湯</small> ·····	一八
和劑大七氣湯 <small>即四七湯</small> ·····	一八
河間正氣天香散·····	一九
仲景理中圓 <small>附附子理中湯</small> ·····	一九
寶鑑既濟解毒湯·····	一九
錢氏導赤散·····	二〇
仲景黃連解毒湯·····	二〇
金匱烏頭煎·····	二〇
和劑來復丹·····	二一
仲景五苓散·····	二一
和劑大七香丸·····	二二
和劑小七香丸·····	二二
神芎導水丸·····	二二

卷二

金匱腎氣丸·····	二三
六味地黃丸·····	二三
金匱桂枝附子湯·····	二三
和劑滲濕湯·····	二四
胃苓湯·····	二四
仲景小青龍湯·····	二五
潔古枳朮丸·····	二五
丹溪保和丸·····	二五
藿香正氣散·····	二六
枳實理中丸·····	二六
遲脈主病第十八·····	一
和劑蘇合香丸·····	二

和劑四七湯·····	二
四君子湯·····	二
數脈主病第十九·····	三
六君子湯·····	四
東垣朱砂安神丸·····	四
集驗龍腦安神丸·····	四
仲景桂枝湯·····	五
仲景麻黃湯·····	六
和劑涼膈散·····	六
仲景黃連解毒湯·····	六
消腫湯·····	六
當歸飲子·····	七
遲脈主病第二十·····	七
二陳湯·····	八

丹溪保和丸	八
潔古枳朮丸	八
麴蘖枳朮丸	八
仲景桃核承氣湯	八
準繩代抵當丸	九
六君子湯	一〇
大半夏湯	一〇
三因溫膽湯	一〇
東垣藿香安胃散	一〇
瀉脈主病第二十一	一一
四物湯	一一
和劑滲濕湯	一二
百一除濕湯	一二
三因腎着湯	一二

六君子湯	一三
寶鑑人參利膈丸	一三
統旨滋血潤腸湯	一三
滋陰清膈飲	一三
十全大補湯	一四
濟生耆附湯	一四
黃耆建中湯	一四
弦脈主病第二十二	一四
仲景苓桂朮甘湯	一五
仲景小青龍湯	一六
和劑倍朮丸	一六
破飲丸	一六
六君子湯	一七
澤瀉湯	一七

海藏五飲湯	·····	一七
濟生八神來復丹	·····	一八
三因控涎丹	·····	一八
玄珠茶調散	·····	一八
半夏白朮天麻湯	·····	一九
仲景吳茱萸湯	·····	二〇
仲景小建中湯	·····	二〇
<small>附黃耆建中湯</small>	·····	二〇
香砂理中湯	·····	二一
東垣厚朴湯	·····	二一
仲景四逆湯	·····	二一
緊脈主病第二十三	·····	二二
長短細大主病第二十四	·····	二二
浮沉主病第二十五	·····	二二
河間犀角丸	·····	二三

卷四

集驗龍腦安神丸	·····	二三
和劑感應丸	·····	二三
和劑紅丸子	·····	二四
洪細主病第二十六	·····	二五
緩類主病第二十七	·····	二五
濡弱小主病第二十八	·····	二六
四君子湯	·····	二六
六味丸	·····	二六
四物湯	·····	二六
微脈主病第二十九	·····	二六
動脈主病第三十	·····	二七
革脈主病第三十一	·····	二八

促結主病第三十二	一
仲景桔梗湯	二
元戎萬病紫苑丸	二
寶鑑沉香桂附丸	五
代脈主病第三十三	五
黃耆建中湯	七
小青龍湯	七
仲景炙甘草湯	七
脈病順逆第三十四	七
中風脈證第三十五	八
千金小續命湯	九
仲景桂枝湯	一〇
二陳湯	一〇
和劑四七湯	一〇

易簡星香湯	一〇
蘇合香丸	一一
仲景三物備急丸	一一
本事勝金丸	一一
千金返魂湯	一二
萬氏灸法	一二
風寒脈證第三十六	一二
仲景桂枝湯	一二
仲景麻黃湯	一三
暑濕脈證第三十七	一三
東垣清暑益氣湯	一三
十味香薷飲	一四
敗毒散	一四
和劑五積散	一四

傷寒脈證第三十八	一五
飲食勞倦第三十九	一七
東垣枳朮導滯丸	一八
丹溪保和丸	一八
潔古枳朮丸	一八
劉蘧枳朮丸	一八
東垣葛花解醒湯	一八
東垣補中益氣湯	一九
氣病脈證第四十	二〇
六鬱脈證第四十一	二〇
丹溪越鞠丸	二一
濟生導痰湯	二一
滾痰丸	二二
丹溪保和丸	二二

卷五

準繩氣鬱湯	二二
血鬱湯	二二
熱鬱湯	二二
濕鬱湯	二三
痰病脈證第四十二	一
和劑倍朮丸	二
苓桂朮甘湯	二
和劑青州白丸子	二
法製半夏	三
和劑清心牛黃丸	三
沉香墮痰丸	四
清氣化痰丸	五

丹溪保和丸	五
仲景澤瀉湯	五
瘧疾脈證第四十三	五
仲景小柴胡湯	六
仲景白虎湯	七
洩瀉脈證第四十四	七
五苓散	八
平胃散	八
東垣升陽除濕湯	九
理中湯	九
二神丸	九
五味子散	一〇
四神丸	一〇
錢氏七味白朮散	一〇

芍藥湯	一〇
香連丸	一一
益元散	一一
敗毒散	一一
東垣芍藥黃芩湯	一一
和劑真人養藏湯	一二
金匱桃花湯	一二
金匱白頭翁湯	一二
和劑參苓白朮散	一三
嘔吐反胃脈證第四十五	一三
仲景大半夏湯	一四
生薑半夏湯	一四
二陳湯	一五
四君子湯	一五

六君子湯·····	一五
理中湯·····	一五
藿香安胃散·····	一五
霍亂脈證第四十六·····	一五
仲景通脈四逆湯·····	一六
仲景理中圓·····	一六
仲景四逆加人參湯·····	一六
附子理中湯·····	一六
咳嗽脈證第四十七·····	一七
麻黃湯·····	一七
參蘇飲·····	一七
二陳湯·····	一八
小青龍湯·····	一八
拔萃半夏溫肺湯·····	一八

喘急脈證第四十八·····	一八
麻黃湯·····	一九
寶鑑香蘇散·····	一九
枳桔二陳湯·····	二〇
三子養親湯·····	二〇
丹溪保和丸·····	二〇
平胃散·····	二〇
和劑小七香丸·····	二〇
仲景瓜蒂散·····	二〇
火病脈證第四十九·····	二〇
和劑清心蓮子飲·····	二一
錢氏導赤散·····	二一
錢氏瀉黃散·····	二一
瀉青丸·····	二二

局方八正散……………二二

左金丸……………二二

河間防風通聖散……………二三

升陽散火湯……………二三

陽毒升麻湯……………二四

清胃湯……………二四

千金黑奴丸……………二四

錢氏瀉白散……………二五

當歸龍薈丸……………二五

骨蒸脈證第五十……………二五

卷六

勞極脈證第五十一……………一

四君子湯……………三

補中益氣湯……………四

參朮膏……………四

四物湯……………四

六味丸……………四

八珍湯……………四

聖愈湯……………四

濟生續斷湯……………四

木瓜散……………五

鹿角丸……………五

保命金剛丸……………五

丹溪虎潛丸……………六

保命黑地黃丸……………六

資生丸……………七

楊氏還少丹……………八

龜膠……………九

鹿膠……………九

丹溪保和丸……………九

平胃散……………〇

元戎逍遙散……………〇

腎着湯……………〇

金匱腎氣丸……………〇

寶鑑天真丹……………〇

仲景小青龍湯……………一

仲景麻黃湯……………一

夢授天王補心丸……………一

硃砂安神丸……………一

朱雀丸……………一

和劑人參養榮湯……………二

失血脈證第五十二……………二

瘀血脈證第五十三……………二

仲景桃仁承氣湯……………三

仲景大黃蠱蟲丸……………三

精濁脈證第五十四……………四

知柏八味丸……………四

河間秘真丸……………四

猪肚丸……………五

清心蓮子飲……………五

萆薢分清飲……………五

六味丸……………五

錢氏導赤散……………五

六一散……………五

三消脈證第五十五……………六

金匱猪苓湯	一八
仲景人參白虎湯	一八
子和加減三黃丸	一八
和劑涼膈散	一九
和劑酒煮黃連丸	一九
六一散	一九
大黃黃連瀉心湯	一九
六味丸	一九
固本丸	二〇
知藥八味丸	二〇
小便淋瀝脈證第五十六	二〇
局方石葦散	二三
三因石燕丸	二四
瞿麥湯	二四

卷七

沉香散	二四
鹿角霜丸	二五
兔絲子丸	二五
黃耆湯	二五
補中益氣湯	二六
立效散	二六
濟生小薊子飲	二六
肉蓯蓉丸	二六
八味丸	二七
六一散	二七
本事火府丹	二七
導赤散	二七
局方八正散	二七

大便燥結脈證第五十七.....一

和劑麻仁丸和劑方.....二

四物湯.....二

東垣導滯通幽湯.....二

得效五仁丸.....三

得效皂角丸.....三

聖惠搜風順氣丸.....三

濟生菴蓉潤腸丸.....四

大承氣湯.....四

小承氣湯.....五

四君子湯.....五

八珍湯.....五

十全大補湯.....五

六味丸.....五

八味丸.....五

六磨湯.....五

得效橘杏丸.....五

蘇麻粥.....五

黃耆湯.....六

六一散.....六

局方半硫丸.....六

枳實理中湯.....六

癲狂脈證第五十八.....七

靈苑辰砂散.....一

歸脾湯.....二

人參琥珀丸.....二

補中益氣湯.....三

仲景四逆散.....三

鐵鑾申先生交感丹

二首附
降氣湯

桃仁承氣湯

代抵當丸

逍遙散

天王補心丸

朱雀丸

白虎湯

大承氣湯

小承氣湯

涼膈散

紫雪

滾痰丸

琥珀壽星丸

一三 一四 一四 一四 一四 一四 一四 一五 一五 一五 一五 一五 一五

瀉青丸

癰病脈證第五十九

集驗龍腦安神丸

河間犀角丸

清心牛黃丸

神應丹

三聖散

大承氣湯

喉痺脈證第六十

和劑甘桔湯

三因荊芥湯

和劑解毒雄黃丸

寶鑑碧玉散

寶鑑開關散

一六 一六 一七 一七 一七 一七 一八 一八 一八 一一 一一 一一 一一 一一 一一

卷八

瓜蒂散·····	一二二
寶鑑備急如聖散·····	一二二
咽喉急備丹·····	一二三
寶鑑增損如聖散·····	一二三
瑞竹羅青散·····	一二三
燒鹽散·····	一二三
四七湯·····	一二四
四味湯·····	一二四
白礬散·····	一二四
眩暈脈證第六十一·····	一
芎藭散·····	二
東垣羌活湯·····	三

涼膈散·····	三
防風通聖散·····	三
東垣半夏白朮天麻湯·····	三
滾痰丸·····	三
玉液湯·····	三
四物湯·····	四
補中益氣湯·····	四
頭痛脈證第六十二·····	四
桂枝湯·····	六
玄珠茶調散·····	六
麻黃湯·····	六
九味羌活湯·····	六
瀉青丸·····	六
二仙散 <small>即茶調散</small> ·····	六

對金散	六
神芎丸	七
涼膈散	七
奇效芎朮湯	七
半夏白朮天麻湯	七
瓜蒂散	七
紅豆散	七
和劑玉壺丸	八
補中益氣湯	八
六君子湯	八
四物湯	八
逍遙散	八
六味丸	八
八味丸	八

心腹痛脈證第六十三	八
二陳湯	九
丹溪海蛤丸	九
前胡半夏湯	一二
正傳加味枳朮丸	一二
香砂平胃散	一三
香蘇散	一三
參蘇飲	一三
五積散	一三
蘇合香丸	一三
統旨清中湯	一三
越鞠丸	一三
左金丸	一三
黃耆建中湯	一四

補中益氣湯……………一四

六君子湯……………一四

金匱九痛丸……………一四

神效剪紅丸……………一四

蕪荑散……………一六

仲景烏梅圓……………一七

萬應丸……………一七

集效丸……………一八

仲景備急丸……………一八

紫金錠即玉樞丹……………一八

四七湯……………二一

枳桔二陳湯……………二一

平胃散……………二一

東垣溫胃湯……………二一

來復丹……………一二

理中湯……………一二

東垣天台烏藥散……………一二

和劑半硫丸……………一二

烏藥順氣散……………一二

鐵寶申先生交感丹……………一二

溫膽湯……………二三

小柴胡湯……………二三

卷九

疝氣脈證第六十四……………一

桂附二陳湯……………七

東垣川苦棟散……………七

金匱烏頭煎……………七

和劑葫蘆巴丸	七
蘇合香丸	八
桂枝湯	八
東垣丁香棟實丸	八
茴香散	八
木香散	九
東垣天台烏藥散	九
腰子散	九
五苓散	九
金匱牡蠣澤瀉散	〇
正氣天香散	〇
金匱蜘蛛散	〇
荔枝散	〇
三層茴香丸	一

濟生橘核丸	一二
香附散	一三
龍膽瀉肝湯	一三
加味逍遙散	一三
腰痛脈證第六十五	一三
調肝散	一六
加味逍遙散	一六
東垣羌活勝濕湯	一七
東垣川芎肉桂湯	一七
九味羌活湯	一八
六味丸	一八
八味丸	一八
直指青娥圓	一八
東垣蒼朮湯	一八

統旨清濕散	一八
四物湯	一九
平胃散	一九
導痰湯	一九
保命煨腎丸	一九
黑地黃丸	一九
知藥八味丸	一九
局方普賢正氣散	一九
二至丸	二〇
子和無比山藥丸	二〇
金匱腎着湯	二〇
子和禹功散	二一
良方人參順氣散	二一
烏藥順氣散	二一

調榮活絡飲	二一
仲景桃仁承氣湯	二二
滾痰丸	二二
脚氣脈證第六十六	二二
仲景麻黃湯	二五
仲景桂枝湯	二五
九味羌活湯	二五
敗毒散	二五
集驗麻黃左經湯	二五
得效芎芷香蘇散	二五
大黃左經湯	二六
仲景小柴胡湯	二六
半夏左經湯	二六
大料神秘左經湯	二七

加味敗毒散……………二八

胃苓湯……………二八

六物附子湯……………二八

仲景麻黃附子細辛湯……………二九

金匱八味丸……………二九

茱萸木瓜湯……………二九

神應養真丹……………二九

追毒湯……………三〇

卷十

痿病脈證第六十七……………一

丹溪虎潛丸……………五

補陰丸……………五

四物湯……………五

三因加減四斤丸……………五

東垣神效黃耆湯……………六

錢氏瀉黃散……………六

仲景炙甘草湯……………六

黑地黃丸……………六

知藥八味丸……………七

加味逍遙散……………七

胃苓湯……………七

仲景防己黃耆湯……………七

東垣參朮湯……………七

六味丸……………七

痺病脈證第六十八……………八

當歸湯……………一

紫蘇子湯……………一

扶神湯	一
草薢丸	二
奇效人參散	二
加味五痺湯	三
溫中法麴丸	三
黃耆丸	四
茯苓川芎湯	四
腎瀝湯	五
仙靈脾散	五
三因控涎丹	五
烏藥順氣散	五
丹溪二妙散	五
東垣神效黃耆湯	六
東垣溫經除濕湯	六

史國公浸酒方	一六
五疸脈證第六十九	一七
金匱茵陳湯	二四
金匱消石礬石散	二五
金匱梔子大黃湯	二五
金匱黃耆芍桂酒湯	二五
金匱桂枝加黃耆湯	二六
金匱猪膏髮煎	二六
金匱茵陳五苓散	二六
金匱大黃硝石湯	二六
金匱小半夏湯	二七
小柴胡湯	二七
小建中湯	二七

卷十一

水病脈證第七十	一
仲景防己黃耆湯	一五
仲景越婢湯	一五
金匱防己茯苓湯	一五
金匱蒲灰散	一六
甘草麻黃湯	一六
當歸散	一六
分氣補心湯	一七
分氣香蘇飲	一七
導水茯苓湯	一七
胃苓湯	一八
元戎調胃白朮澤瀉散	一八
金匱八味丸	一九
濟生腎氣丸	一九

調榮飲	一九
四製香附丸	二〇
濟生實脾飲	二〇
復元丹	二〇
金匱桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯	二〇
金匱枳朮湯	二一
麻黃附子湯	二一
葶蘆丸	二一
和劑五皮飲	二一
除濕湯	二二
濟生四磨湯	二二
濟生疏鑿飲子	二二
五苓散	二三

卷十一

和劑木香流氣飲	二三
和劑黑錫丹	二三
和劑蘇子降氣湯	二四
寶鑑導滯通經湯	二四
和劑木瓜圓	二五
消導寬中湯	二五
消風敗毒散	二六
和劑升麻和氣散	二六
補中益氣湯	二六
六味地黃丸	二六
東垣人參平肺散	二七
八正散	二七
仲景梔子豉湯	二七

脹滿脈證第七十一	一
枳實理中湯	六
金匱厚朴七物湯	六
仲景大柴胡湯	六
寶鑑晞露丸	六
寶鑑木香通氣散	七
寶鑑見睨丸	七
寶鑑和血通經湯	八
積聚脈證第七十二	八
濟生大七氣丸	一三
東垣肥氣丸	一三
東垣息賁丸	一四
金匱鼈甲煎丸	一四
東垣伏梁丸	一五

半夏湯	一六
東垣痞氣丸	一六
東垣奔豚丸	一七
三因奔豚湯	一八
萬病紫苑丸	一八
太無神功助化散	一八
寶鑑醋煮三稜丸	一九
寶鑑聖散子	一九
三聖散	二〇
控涎丹	二〇
雲岐牡丹散	二〇
三因化氣丸	二〇
保和丸	二〇
沉香化氣丸	二一

中惡脈證第七十三	一一
蘇合香丸	一二
調氣平胃散	一二
六君子湯	一二
香砂四君子湯	一二
千金返魂湯	一二
玉樞丹	一二
華陀救中惡方	一二
又方	一二
又方	一二
解砒毒	二四
解附子天雄川烏斑蝥	二四
毒	二四
解河豚毒	二四

解巴豆毒·····	二四
解諸藥毒·····	二四
解刺毛蟲毒·····	二四
解鬱肉漏脯毒·····	二四
解馬肉毒·····	二四
解牛肉毒·····	二四
解犬肉毒·····	二四
解中箭死鳥獸肉毒·····	二五
解諸魚毒·····	二五
解蟹毒·····	二五
解諸果毒·····	二五
解諸菌毒·····	二五
解野芋毒·····	二五
解閉口椒毒·····	二五

解水蓴荇葉毒·····	二五
解芹菜毒·····	二五
解貪食成病方·····	二五
解諸食物毒·····	二六

卷十三

癰疽脈證第七十四·····	一
遠志酒·····	一五
獨勝散·····	一六
人參敗毒散·····	一六
飛龍奪命丹·····	一六
蟾酥丸·····	一七
真人活命飲·····	一七
護心散·····	一八

防風通聖散	一八
神效托裏散	一八
正鐵箍散	一八
鐵井欄	一九
補中益氣湯	一九
玉樞丹	一九
十全大補湯	一九
當歸補血湯	一九
神仙太乙膏	一九
替針丸	二〇
六君子湯	二〇
圍藥	二〇
金絲萬應膏	二一
八珍湯	二二

疥瘡大楓膏	二二
桃花隔紙膏	二二
千槌膏	二二
烏龍膏	二三
白麥飯石膏	二三
精要神異膏	二四
內托復煎散	二五
神仙蠟礬丸	二六
癰疽收口藥	二七
比天膏	二七
仙傳萬靈膏	二八
解輕粉毒	三〇
花蕊石散	三〇

肺癰脈證第七十五.....一

金匱甘草乾薑湯.....五

金匱葶藶大棗瀉肺湯.....五

金匱桔梗湯.....五

仲景炙甘草湯.....五

千金甘草湯.....五

千金生薑甘草湯.....六

千金桂枝去芍藥加皂

莢湯.....六

外臺桔梗白散.....六

千金葶藶湯.....六

瀉白散.....七

四物湯.....七

肺癰神方.....七

濟生排膿散.....八

又排膿散.....八

肺癰收口方.....八

又肺癰方.....八

治吐膿血方.....八

又治肺癰方.....八

試肺癰法.....九

腸癰脈證第七十六.....九

薏苡附子敗醬散.....〇

大黃牡丹湯.....〇

萬氏治腸癰方.....一

薏苡仁湯.....一

四聖散.....一

神仙蠟礬丸.....二

雲母膏·····一二
排膿散·····一三

卷十五

胎產脈證第七十七·····一

保生無憂散·····二〇

八珍湯·····二一

四物湯·····二一

神妙乳砂丹·····二一

葵子如聖散·····二一

加味芎歸湯·····二一

補中益氣湯·····二二

龜殼散·····二二

十全大補湯·····二二

平胃散·····二二

千金神造湯·····二二

半夏湯·····二三

束胎丸·····二三

達生散·····二三

張氏方·····二四

神寢丸·····二四

佛手散·····二四

三合濟生湯·····二五

黑神散·····二六

阿膠赤小豆湯·····二六

兔腦丸·····二六

如神散·····二七

黃金散·····二七

清魂散	二七
六君子湯	二八
當歸建中湯	二八
奪命丹	二八
牛膝湯	二八
失笑散	二九
胡氏法	二九
加桂芎歸湯	三〇
紅花酒	三〇
芎歸湯	三〇
荊芥散	三〇
白薇湯	三一
花蕊石散	三一
起枕散	三一

六味地黃丸	三一
逍遙散	三一
加味歸脾湯	三一
加味四物湯	三一
烏金散	三一
蒲醋飲子	三一
益母丸	三一
金匱當歸散	三二
白朮湯	三三
縮砂散	三四
三物解毒湯	三四
白扁豆散	三四
豆淋酒	三四
枳實芍藥散	三四

卷十六

羊肉湯	三五
回生丹	三五
艾附煖宮丸	三六
神方驗胎散	三六
小兒脈證第七十八	一
畫眉膏	一九
金硃散	二〇
生地黃湯	二〇
真金散	二〇
外臺方	二一
豆豉膏	二一
蘇合香丸	二一

辰砂礪蠶散	二一
五苓散	二一
龍骨散	二一
白芍藥湯	二二
外消散	二二
雙金散	二二
神砂抱龍丸	二三
雞腸散	二三
外臺方	二四
六味地黃丸	二四
瀉黃散	二四
導赤散	二四
大黃黃連瀉心湯	二四
清液散	二四

五福化毒丹……………二四

膠黃散……………二五

菖蒲丸……………二五

肥兒丸……………二五

布袋丸……………二六

錢氏地黃丸……………二六

大啓脾丸……………二七

參苓白朮散……………二七

益黃散……………二七

瀉黃散……………二七

硃砂安神丸……………二七

涼膈散……………二七

花火膏……………二七

蟬花散……………二七

茅先生抹脣膏……………二八

白朮當歸煎丸……………二八

瀉白散……………二八

塗龜尿法……………二八

補中益氣湯……………二八

小兒錮頤藥……………二八

麝茸丹……………二九

千金楸葉方……………二九

榆末散……………二九

聖惠神效黑豆膏……………二九

千金冀大豆方……………三〇

清胃湯……………三〇

雄黃丸……………三〇

千金白鹽方……………三〇

靈苑生齒方	三〇
柴胡清肝散	三〇
湯氏龍黃散	三一
立驗散	三一
錢氏橘連丸	三一
豆豉大丸摩法	三一
譚氏殊聖治客忤方	三一
張渙辟邪膏	三一
竈中黃土方	三一
三物燒髮散	三一
皂莢搐鼻法	三一
沉香降氣湯	三一
葱刺鼻法	三一
葛氏肘後灸法	三一

管吹下部法	三四
千金牛舐方	三四
鬚兩脇法	三四
治鬼魘死方	三四
鷄冠血方	三四
灸法	三四
圖經治鬼持方	三五
外臺深師五邪方	三五
太乙備急散	三五
聖惠木香散	三六
范汪方十七物紫參丸	三六
羚羊角散	三七
雄黃散	三七
小兒五種蟲毒方	三七

敗鼓皮方……………三七

卷十七

奇經八脈脈證第七十九……………一

羌活勝濕湯……………○

生鐵落飲……………○

瀉青丸……………○

丁香楝實丸……………○

三因散聚湯……………○

三因化氣湯……………一

蘇子降氣湯……………一

黑錫丹……………一

震靈丹……………一

金匱桂枝龍骨牡蠣湯……………三

和劑威喜丸……………一三

東垣柴胡升陽湯……………一三

東垣退熱湯……………一四

本事枳實散……………一四

奇效拈痛丸……………一四

四七湯……………一四

胃風湯……………一五

交加散……………一五

海藏愈風湯……………一五

加味逍遙散……………一五

十全大補湯……………一五

反關脈第八十……………一六

真藏脈第八十一……………一六

卷十八 補遺

嘈雜……………一
 三聖丸……………二
 越鞠丸……………二
 二陳湯……………二
 丹溪導飲丸……………二
 烏梅圓……………二
 酒煮黃連丸……………二
 吞酸吐酸……………三
 藿香安胃散……………三
 加減二陳湯……………三
 三因鞠朮丸……………三
 二陳加茱連神麴蒼朮
 方……………三
 酒煮黃連丸……………三

盜汗	桂枝湯	黃耆建中湯	保元湯	得效玉屏風散	當歸補血湯	自汗	代抵當丸	統旨補氣運脾湯	和劑穀神嘉禾散	和劑五膈寬中散	統旨香砂寬中湯	生薑半夏湯	噎膈
八	八	八	八	八	八	七	七	七	六	六	五	五	四

當歸六黃湯

九

大建中湯

九

悸怔忡

〇

導痰湯

〇

溫膽湯

〇

茯苓甘草湯

〇

薑朮湯

一

補中益氣湯

一

四君子湯

一

六君子湯

一

小建中湯

一

黃耆建中湯

一

四物湯

一

朱雀丸

一

當歸補血湯

一

經驗定心丹

一

炙甘草湯

二

健忘

二

歸脾湯

三

讀書丸

三

朱雀丸

三

二參丸

三

開心散

三

壽星丸

四

導痰湯

四

代抵當丸

四

不寐

四

八珍湯

四

歸脾湯	一四
仲景酸棗仁湯	一四
溫膽湯	一五
六君子湯	一五
內經半夏湯	一五
導痰湯	一五
呃	一五
二陳湯	一七
溫膽湯	一七
導痰湯	一七
和劑枳實半夏湯	一七
麴蘗枳朮丸	一七
法製陳皮	一七
法製檳榔	一八

六君子湯	一八
四君子湯	一八
橘皮竹茹湯	一八
理中湯	一八
潔古柿錢散	一九
金匱腎氣丸	一九
良方參附湯	一九
面	一九
升麻胃風湯	二〇
升麻順氣湯	二〇
犀角升麻湯	二〇
補胃湯	二〇
茯苓桂枝五味甘草湯	二二
七白散	二二

洗面藥	二二
面上五色瘡方	二二
面上豆痕或斑點醫方	二三
面上粉刺方	二三
斗門方	二三
指爪破面方	二三
又方	二三
平胃散	二三
白附子散	二四
祛風白芷散	二四
目	二四
易簡補肝散	二八
本事菊花散	二八
瀉青丸	二九

局方湯泡散	二九
湯泡散	二九
分珠散	二九
清涼散	三〇
二黃散	三〇
照水丸	三〇
千金磁硃丸	三一
養肝散	三一
洗眼方	三一
菊睛丸	三一
駐景丸	三一
枸杞子酒	三一
地芝丸	三一
定志丸	三一

耳·····三三

清神散·····三四

磁石湯·····三四

益腎散·····三四

犀角飲子·····三五

鼻·····三五

通氣湯·····三六

防風散·····三六

單南星飲·····三六

葶撥餅·····三六

瓜礬散·····三七

芷夷散·····三七

鼻衄不止方·····三七

口脣·····三七

瀉白湯·····三八

黃蘗散·····三八

五福化毒丹·····三九

冰蘗丸·····三九

舌·····三九

薄荷煎·····四〇

黑參丸·····四〇

薏苡仁湯·····四〇

舌血舌腫舌出方·····四〇

齒·····四〇

清胃湯·····四一

香鹽散·····四一

謝傳笑去散·····四一

白蒺藜散·····四一

青白散	四二
齒縫出血方	四二
齒肉壅出	四二
鬚髮	四二
天寶單方	四三
巨勝丸	四三
旱蓮膏	四三
地黃膏	四四
雞峰雜興方	四四
六淫方	四四
陰淫上下厥逆中外寒慄	四四
附子理中湯	四四
四逆湯	四四
陽淫狂譫煩渴血泄浸淫	四四

白虎湯	四五
犀角地黃湯	四五
風淫肢廢毛落繫習瘕癰	四五
寶鑑醉仙散	四五
通天再造散	四六
雨淫腹滿腫脹腸鳴濡瀉	四六
平胃散	四六
五苓散	四六
晦淫百合狐惑熱中藏燥	四六
百合知母湯	四七
滑石代赭湯	四七
百合雞子湯	四七
百合地黃湯	四八
甘草瀉心湯	四八

苦參湯……………四八

雄黃熏法……………四八

赤小豆當歸散……………四九

金匱甘麥大棗湯……………四九

明淫恍惚動悸錯妄失神……………四九

金匱桂枝去芍藥加龍

骨牡蠣救逆湯……………四九

東垣硃砂安神丸……………五〇

卷十九 補遺

望診……………一

藏府部分……………二

五官……………二

診病新久……………二

面部圖……………三

藏府色見面部圖……………四

肢節色見面部圖……………五

統論色……………六

面……………七

目……………一〇

鼻……………一二

血脈……………一三

毛髮……………一三

形體……………一四

死證……………一六

五藏絕證……………一七

詐病……………一九

聲診……………一九

聲……………二〇

息……………二三

問診……………二三

人品起居……………二三

病證……………二三

嗜欲苦樂……………二三

附辨舌……………二四

卷二十一 附餘

醫範……………一

醫學源流張仲景……………一

醫學難精孫真人……………二

醫必讀書史崧……………二

醫貴博戴叔能……………二

醫燈續焰 目錄

臨機應變商輅……………二

立意弗偏醫說……………三

治病如操舟楊仁齋……………三

如救焚溺陸宣公……………四

施仁獲報張彥明……………四

勿畏難孫真人……………五

勿笑謔孫真人……………五

勿自安孫真人……………五

醫救人苦老君……………五

讓功錢乙……………六

妄斥朱李程篁墩……………六

謗譽譚景升……………六

誨子和衆朱丹溪……………六

劫謝伯宅編……………六

誤灸瞽報申志	七
貪財天杖已志	七
益病陰譴續醫說	八
下胎嘔腦報名醫錄	八
故投毒藥鬼打醫說	八
診有四失素問	九
診有五過素問	九
醫政周禮	〇
庸醫自信陶貞白	一四
用心精微張湛	一五
判證孫真人	一五
三繆	一六
偏執之誤王忠文公禕	一八
王道王文恪公	一九

藥性孔志約	一九
市藥陳嘉謨	一九
本草贖過陶貞白	二〇
藥貴專一許胤宗	二〇
太微仙君功過格	二〇
醫罪大明律	二一
醫殺人於法外樵談	二一
祝醫五則繆仲淳	二一
袁氏醫家十事袁菊泉	二三
為醫八要潘楫	二六
采芝八則蔣式金	二七
太素脈論吳鶴皋	二九
又	三〇
脈案式又三條吳鶴皋	三一

回頭歌	張顧存先生	三三
謗譽閑忙	潘楫	三三

卷二十一 附餘

病則	一	
病有六不治	史記	一
療病勿殺	秦觀	一
戒殺	沈蓮池	二
婦女習俗	自誤寇宗奭	二
試脈	自誤王海藏	三
禁忌	朱丹溪	三
易醫之弊	龔廷賢	三
治藥不擇人	王海藏	三
嫉醫誤事	孫真人	四

托市偽藥	陶貞白	四
速更醫誤	龔廷賢	四
病家六失	寇宗奭	五
先告所患	蘇東坡	五
任醫	褚澄	五
拘於鬼神	素問	六
病家須知五則	潘之祺	六
尊生十二鑑	潘楫	九
四徇五病	寇宗奭	一二
保養防患	寇宗奭	一三
預攝	朱丹溪	一三
飲食性情	食鑑	一三
擇醫	寇宗奭	一三
擇品	物理論	一四

書燈續焰目錄

四四

醫不在名陶貞白	一四
重名宜審吳球	一五
信任成功宋景濂	一五
議多誤事孫真人	一六
淫殺相仍見聞搜玉	一六
不攝損命徐春甫	一七
保養說本草衍義	一七
和氣湯方養生纂	一八
自致百病養生纂	一八
吳山里人日記鄭炳	一八
奉親養老書 <small>奉親養老書</small>	一九
老人藥餌同上	一九
老人事宜同上	二〇
老人起居同上	二〇

早漱不如暮漱	一一
交合有時千金要方	一一
生子定理同上	一一
患目忌同上	一二
謹抑陽事同上	一二
解惡夢同上	一二
救魔法 <small>巢氏病原</small>	一二
救不寤法 <small>肘後方</small>	一二
浴出帶衣睡 <small>瑣碎錄</small>	一二
患目勿浴 <small>泊宅編</small>	一二
沐浴五香 <small>沐浴身心經</small>	一二
甌水黑髮 <small>本艸</small>	一二
粳米反蒼耳同上	一三
食粥益人 <small>張文潛</small>	一三

食飲以時	食治通鑑	二二
飲酒消餐餌	瑣碎錄	二四
盛夏節食	食治通鑑	二四
勿食生冷炙燂	同上	二四
飲冷先溫	翰府名談	二四
飲食饑渴之先	千金要方	二四
飲食宜細	食治通鑑	二五
飲食後成疾	王叔和	二五
日宜取嚏	瑣碎錄	二五
野鴨宜食	食療本艸	二五
食物宜熟	本草	二五
湯水忌	瑣碎錄	二五
蓴菜毒	本艸拾遺	二五
秋蟹毒	博物志	二六

治產倒生	食療本草	二六
醒酒	瑣碎錄	二六
去韭氣	瑣碎錄	二六
雪行勿熱	瑣碎錄	二六
勿臥食	雲笈七籤	二六
藥食諸忌	本艸	二六
醫家難事	有三情 張介賓	二七
煮湯藥法	陶貞白	三二
又李時珍		三三
諸病男女不同	孫真人	三三
倩人合藥之弊	孫真人	三四
斷除因念	玉華子	三四
全生愈疾	筆談	三四

醫燈續焰

明 錢塘 王紹隆 著

明 錢塘 潘楫碩甫 註

明 錢塘 王佑賢聖翼 評

鄞縣 曹赤電炳章 校

卷一

血脈隧道第一

脈乃血派。氣血之先。血之隧道。氣息應焉。

人身十
二經脈
應地中
十二水
道分合
起伏無
不相符

水自源而分流曰派。合分起伏。道各井然。人身之血。猶夫水也。血中之脈。猶夫派也。派通則水源活。脈通則氣血行。氣也。血也。其在於人身。渾淪條析。非一非二。設經脈不先為流轉。則潛行默運之機礙矣。响濡守使。又安望其各盡乃職耶。難經二十二論曰。陰在內。陽在內。陽之守。陽在外。陰之

經隧猶
軍營之
分隊伍
井然不
亂者也

使隧道。即經脈也。言其在血中。精密隱隧。自成一。道。靈樞營氣篇云。營氣之道。內穀為寶。穀入於胃。乃傳之肺。流溢於中。布散於外。精專者行於經隧。營出了中焦。靈樞決氣篇云。中焦取汁。變化而赤。是謂血。壅遏營氣。令無所避。是謂脈。道而無別道。可避也。靈樞衛氣篇云。其精氣之行於經者。為營氣。靈樞營衛生會篇云。中焦亦並胃中。出上焦之後。此所受氣者。泌糟粕。蒸津液。化其精微。上注於肺脈。乃化而為血。以奉生身。莫貴於此。故獨得行於經隧。合諸篇論觀之。乃知血為總名。而脈則指營氣流行不息之道耳。若與血二。實無有二。然非呼吸。不能流行。故曰氣息應焉。仲景平脈篇云。呼吸者。脈之頭也。又靈樞動輸篇云。其行也以息往來。

法地合心第二

其象法地。血之府也。心之合也。皮之部也。

天陽地陰。氣陽血陰。人之脈。以血為體。固當配地。然觀其上下周匝。出入臟腑。聯絡貫通。起伏交會。一如大氣之行於地中。故地有脈。而山川

秀麗。人有脈而形體安全。象之脗合。莫有肖於此者。故曰其象法地。能再因其象而取法焉。則吾醫之識脈。與堪輿之尋龍。無二義也。府者藏也。聚也。隧道乃精專所注。故爲血之府。充徧人身。應夏火之氣。中焦燔赤。得正南之色。故爲心之合。肺主皮毛而朝百脈。如部落然。故爲皮之部。素問五藏生成篇云。心之合脈也。其榮色也。又六節藏象篇云。心者生之本。其充在血。肺者氣之本。其充在皮。又五藏生成篇云。諸血者皆屬於心。諸氣者皆屬於肺。又平人氣象論云。臟真高於肺。以行營衛。陰陽又經脈別論云。脈氣流經。經氣歸於肺。肺朝百脈。輸精於皮毛。毛脈合精。行氣於府。

資始於腎。資生於胃。陽中之陰。本乎營衛。營者陰血。衛者陽氣。營行脈中。衛行脈外。

腎爲十二經脈之根。故曰資始。胃乃生化之源。故曰資生。腎之與胃。蓋有先後天之分焉。靈樞經脈篇云。人始生。先成精。精成而腦髓生。骨爲幹。脈爲營。筋爲剛。肉爲墻。皮膚堅而毛髮長。穀入於胃。脈道以通。血氣

乃行。此即資始資生之註脚也。所謂陽中之陰者。蓋本乎營衛耳。營者營運於中。衛者護衛於外。營為陰血。行脈之中。入隧道也。衛為陽氣。行脈之外。不入隧道也。

氣動脈應第四

脈不自行。隨氣而至。氣動脈應。陰陽之誼。氣如橐籥。血如波瀾。血脈氣息。上下循環。

氣陽也。血陰也。陽主動。陰主靜。脈之行也。必氣為之先。氣行則血行。氣動則脈動。陰陽相應而不相失。如交誼然。橐籥也。無底之器。籥管籥也。有孔之物。夫陽氣之自頂至踵也。雖固護於外。無間隔於中。其遊行出入。谿谷募腠。又各有竅穴。故如橐籥。如籥。波微浪也。湧疊而前。瀾迴瀾也。旋渦而返。血之在氣中也。隴湧流行。亦復迴環灌溉。故如波如瀾。若合若分。互為體用。周流上下。無始無終。此則循環之義矣。

寸口大會男女定位第五

氣血以水喻之。水猶水。體氣猶水。用不可離。須臾離。者茲言。互為體。用更妙。

即經云
陽在外
陰之使
陰在內
陽之守
義

脈在人
身一呼
兩動一
吸兩動

十二經中。皆有動脈。惟手太陰。寸口取決。此經屬肺。上系吭嗑。脈之大會。息之出入。一呼一吸。四至為息。日夜一萬三千五百。一呼一吸。脈行六寸。日夜八百。十丈為準。初持脈時。令仰其掌。掌後高骨。是謂關上。關前為陽。關後為陰。陽寸陰尺。先後推尋。心肝居左。肺脾居右。腎與命門。居兩尺部。魂魄穀神。皆見寸口。左主司官。右主司府。左大順男。右大順女。本命扶命。男左女右。關前一分。人命之主。左為人迎。右為氣口。神門決斷。兩在關後。人無二脈。病死不愈。男女脈同。唯尺則異。陽弱陰盛。反此病至。

十二經者。即手足三陰三陽之經脈也。其始從中焦。注手太陰肺。手太陰肺。注手陽明大腸。手陽明大腸。注足陽明胃。足陽明胃。注足太陰脾。足太陰脾。注手少陰心。手少陰心。注手太陽小腸。手太陽小腸。注足太陽膀胱。足太陽膀胱。注足少陰腎。足少陰腎。注手厥陰心包。手厥陰心包。注手少陽三焦。手少陽三焦。注足少陽膽。足少陽膽。注足厥陰肝。足厥陰肝。還復注手太陰。是謂一周。其脈數。十二經共長十六丈二尺。各有長短。亦逐經各有動脈。如手太陰脈。動中府。雲門。天府。俠白。手陽明

伏行於內者多其顯於外而可候以指法止此數處以不動至不謂之動

四藏中有土人皆知之土中具有人所不曉試觀升降出入不離乎中則

脈動合谷。陽谿。足陽明脈。動衝陽。大迎。人迎。氣衝。足太陰脈。動箕門。衝門。手少陰脈。動極泉。手太陽脈。動天窓。足太陽脈。動委中。足少陰脈。動太谿。陰谷。手厥陰脈。動勞宮。手少陽脈。動禾宿。足少陽脈。動下關。聽會。足厥陰脈。動太衝。五里。陰廉之類。既皆有動脈。是皆可即其脈以診病。今惟取手太陰寸口動脈。決諸病之死生吉凶者。何耶。蓋手太陰一經。內屬肺藏。其經起於中府。終於少商。其肺系上連喉嚨。吭嗑以通呼吸。肺主一身之氣。氣非呼吸不行。脈非肺氣不布。故仲景云。呼吸者。脈之頭也。又寅初方升之氣。出於中焦。中焦指胃也。蓋胃為水穀之海。屬土居中。灌溉四臟。以及百骸。所謂灌溉者。無非一水穀之氣。四臟中固有土。而土中亦具四臟。即胃氣中要有弦鈎毛石。義脈之晝夜五十環周。始於此。亦終於此。始終循環。原無少間。但以一日夜分四時論之。必以寅初為更始也。故素問脈要精微論云。診法常以平旦。陰氣未動。陽氣未散。飲食未進。經脈未盛。絡脈調勻。氣血未亂。故乃可診。有過之脈。蓋以此時諸脈更始於胃。其大小虛實。躁靜疾徐。種種畢露。出於胃即注於

弦鈎毛石不外乎土矣失土便為真藏也無胃故

諸脈無時不始於胃蓋以平旦氣清病無不露

陰陽互交於一係分處關不

肺。最為切近。又必由肺之呼吸以行此所謂肺朝百脈也。呼出於陽。吸入於陰。一呼脈二至。一吸脈二至。總四至為一息。一日一夜約一萬三千五百息。即此一呼一吸。脈氣行去六寸。以一萬三千五百息算來。共得八百一十丈。以脈數之十六丈二尺折算。應得周行於身五十度。此晝夜脈行度數之準則也。任督越人二難云。脈數總長十六丈二尺。晝夜一萬三千五百息。共行八百一十丈。周於身者得五十度。後又云。其始從中焦。注手太陰。終於足厥陰。厥陰復還。注手太陰。所謂如環無端者。不知二躡。任督從何處接入。豈附行於足少陰。凡初持人之脈。先令太陽耶。附則不能在循環。注接之內。當俟知者。仰手。以腕之高骨對平處。謂之關上。關前為陽。後為陰。陽曰寸。陰曰尺。尺至寸。長一寸九分。即此一寸九分。三部分之。為寸關尺也。關居中。若為陰陽界限。而陰陽實互交於此。能先後細為推究。未有不得其病情者。三部中。又各有定位。木火居左。金土居右。水居其下。若以相生論之。則左關肝木。生左寸心火。左寸心火。生右關脾土。右關脾土。生右寸肺金。右寸肺金。生兩尺腎水。魂為肝神。魄為肺神。穀不可言脾神。然其變化資生。生死以之。更神乎神矣。穀神。一魂魄也。魂魄。一穀神也。而又總

左司官主出右司府主納即旋道左旋地道右轉義也此以升長降收說來更圓四司啓閉神氣往來故曰神門是以死生係焉

攝於心君。遊行出入。雖無處不到。而盛衰逆順。未有不從寸口驗焉。左肝心。爲木火。爲陽主升。主生長。職多發施。故曰司官。右肺脾。爲金土。爲陰主降。主收受。職多聚納。故曰司府。男子生於寅。以陽爲體。左陽也。左大則氣鍾於陽。故在男爲順。女子生於申。以陰爲體。右陰也。右大則氣鍾於陰。故在女爲順。是由男女之本命。分係於左右。順則雖病。而本命猶可扶持。關前一分人命之主者。指魂魄穀神也。左爲人迎。右爲氣口者。指司官司府也。決斷神門。關後有兩者。指兩腎也。卽應腎間動氣也。卽難經入難所謂三焦之原。守邪之神。故曰神門。關前穀神。關後神門。二脈卽生人之先後二天也。無二者。言無此二脈也。無則根本絕矣。故死。卽死無一仲景云。寸脈下不至。關爲陽絕。尺脈上不至。關爲陰絕。殆亦關前關後之謂乎。男女脈同。同於定位。唯尺則異。異於盛衰。男子鍾於陽。故陰弱。女子鍾於陰。故陰盛。獨驗於尺者。天一資生之始。陰陽卽判於此耳。色乃生人之根本。如草木之反此。則男得女盛。女得男弱。男女皆失其常。故當病至。

七診九候第六

脈有七診。曰浮中沉。上下左右。消息求尋。又有九候。舉按輕重。三部浮沉。各候五動。寸候胸上。關候膈下。尺候於臍。下至跟踝。左脈候左。右脈候右。病隨所在。不病者否。浮爲心肺。沉爲腎肝。脾胃中州。浮沉之間。心脈之浮。浮大而散。肺脈之浮。浮濇而短。肝脈之沉。沉而弦長。腎脈之沉。沉實而濡。脾胃屬土。脈宜和緩。命爲相火。左寸同斷。

與皮毛相得曰浮。按之至骨曰沉。中則在浮沉之間。上下卽寸與尺。此槩兩手六部而言也。左右左手右手也。是謂七診。言能消息細求。錯綜審別。則上下表裏之病。無遁情矣。一說上下左右。卽脈要精微論所云尺內兩傍。則季脅也。尺外以候腎。尺裏以候腹中。附上左外以候肝。內以候鬲。右外以候胃。內以候脾。上附上。右外以候肺。內以候胸中。左外以候心。內以候臍中。前以候前後。後以候後。上竟上者。胸喉中事也。下竟下者。少腹腰股膝脛足中事也。際下竟於尺末。魚又素問三部九候論

二說參
看庶能
搜索殆
盡

揭出効
象形容
四字包
括殆盡
此仲景
脈學真
傳
以五藏
位次定
浮沉以
四時法
象見形
狀可謂
深得藏
真妙用
此扁鵲

云。獨小者病。獨大者病。獨疾者病。獨遲者病。獨熱者病。獨寒者病。獨陷下者病。亦謂之七診。但與本文七診之義不同。當參看九候者。言脈分三部。三部中各有浮中沉。是謂九候。九候之情形。非舉按輕重不能得其候。以五動爲準。寸則候胸上至頭之疾。關候膈下至臍之疾。尺候臍下至足之疾。左脈候身之左。右脈候身之右。病隨脈之所在而見。不病則脈不應。與前七診大同小異。七診九候當參看總不外仲景所謂効象形容四字而已。心肺居上脈應浮。腎肝居下脈應沉。脾胃居心肺腎肝之間。謂之中州。脈亦應在浮沉之間。心肺同一浮也。但浮大而散者。象夏火。故屬心。浮濇而短者。象秋金。故屬肺。肝腎同一沉也。但沉而弦長者。象春水。故屬肝。沉實而濡者。象冬水。故屬腎。脈和而緩。不虛微。不實強。不疾不遲。自有一種舒徐冲融氣象。土之性也。脾胃宜之。命門右腎。固舍相火。然終不能離水位。故與左同斷。

四時胃氣第七

脈法也

以水起伏。之起伏。盛衰形。狀狀脈。之弦鈞。毛石真。如指掌。更要看。其春從。伏藏出。夏自升。後散秋。從散大。收冬因。收降實。自得一。機旋轉。藏真相。通之妙。

春弦夏洪。洪當秋毛冬石。四季和緩。是謂平脈。太過實強。病生於外。不及虛微。病生於內。春得秋脈。死在金日。五藏准此。推之不失。四時百病。胃氣為本。脈貴有神。不可不審。

天地之氣。東升屬木。位當寅卯。於時為春。萬物始生。其氣從伏藏中透。出如一縷之烟。一線之泉。在人則肝應之。而見弦脈。即素問玉機真藏論所謂其氣來軟弱輕虛而滑。端直以長。素問平人氣象論所謂軟弱招招。如揭長竿末梢者是也。氣轉而南。屬火。位當巳午。於時為夏。萬物盛長。其氣從升後散大於外。如騰湧之波。燎原之火。在人則心應之。而見鈞脈。即玉機真藏論所謂其氣來盛去衰。平人氣象論所謂脈來累累如連珠。如循環玕者是也。氣轉而西。屬金。位當申酉。於時為秋。萬物收成。其氣從散大之極。自表初收。如浪靜波恬。烟清焰熄。在人則肺應之。而見毛脈。即玉機真藏論所謂其氣來輕虛以浮。來急去散。平人氣象論所謂脈來厭厭聶聶。如落榆莢者是也。氣轉而北。屬水。位當亥子。於時為冬。萬物合藏。其氣從收降而斂實。如埋爐之火。匯潭之泉。在人

藏真真 藏迴乎 不同學 人大須 理會
形容如 畫一筆 描成光 景恍然 在目
脾主中 州和調 五藏善 則氣無 所偏百 病不見 偏則不 和病斯 見矣
不欲太 顯欲微 不欲似 顯欲微

則腎應之而見石脈。即玉機真藏論所謂其氣來沉以搏。平人氣象論所謂脈來喘喘累累如鉤。按之而堅者是也。玉機真藏論作冬脈營營者義鉤而按之堅乃有以上經論所云四時諸脈形狀雖因時變易其中石義不爾是夏脈矣。蓋和緩爲土。即是胃氣。有胃氣而合時。便是總不可少和柔平緩景象。平脈玉機真藏論云脾脈者土也。孤藏以灌四傍者也。今弦鉤毛石中有此一種和緩。即是灌溉四傍。即是土矣。亦即是脾脈矣。以其寓於四脈中。故又曰善者不可得見。平人氣象論云長夏屬脾。其脈和柔相離。如雞踐地。察此脈象。亦不過形容其和緩耳。辰戌丑未四季之月。各月土旺一十八日。即是灌溉四傍之義。故分而爲四。有土而不見土也。若論五行。則析而爲五。土居其中。是屬長夏。況長夏居金火之間。爲相生之過脈。較他季月不同。故獨得見主時之脈。二說雖殊。其義不悖。當參看。所謂太過不及者。言弦鉤毛石之脈。與時相應。俱宜和緩而適中。欲其微似不欲其太顯。欲其微見不欲其不見。今即以一弦脈論之。若過於微弦而太弦。是謂太過。太過則氣實強。氣實強則氣鼓於外。而病生

見不欲
不見四
句繪描
出和緩
適中之
神

病雖不
治得穀
者尙可
過期可
見穀之
於人大
矣哉

於外。若不及於微弦而不弦。是謂不及。不及則氣虛微。氣虛微則氣餒於內。而病生於內。其鈎毛石之太過不及。病亦猶是。今不但不見春弦之太過不及。而反見毛浮之秋脈。當升而反降。當生而反殺。氣機大逆。神轉不同。是謂尅賊。未有不病而死者。春水既爲金尅。金日邪旺。正河以堪。故死於此。五藏皆以此理推之。自無差失。四時有四時之脈。四時有四時之病。但土灌四傍。雖病變百出。必以之爲本。况胃氣乃水穀之精。諸脈有神。水穀之力也。不聞得穀者昌乎。誠不可不審。

平和遲數第八

調停自氣。呼吸定息。四至五至。平和之則。三至爲遲。遲則爲冷。六至爲數。數卽熱證。轉遲轉冷。轉數轉熱。遲數旣明。浮沉當別。

醫至病家。宜默坐片時。先調停自氣。令呼吸均勻。方診其脈。平人氣象論云。常以不病人調病人。平病人醫不病人。調病人以調之。大約以我呼吸一息。得彼脈四至五至爲準則。故爲病人。平人息以調之。大約以我呼吸一息。得彼脈四至五至爲準則。呼吸閏以太息。故此爲平和之脈。斷爲無病。雖病亦極微淺。以脈不爲在四至五至之間。故此爲平和之脈。斷爲無病。雖病亦極微淺。以脈不爲

浮為在表
沉為在裏

病變故也。病邪微不能變其脈若一息三至。不及四五。是名遲脈。遲則氣寒而行慢。故病主冷。若一息六至。過於四五。是名數脈。數則氣熱而行快。故病主熱。轉遲則更遲。在三至已下。而冷者愈冷矣。轉數則更數。在六至已上。而熱者愈熱矣。此遲數脈病之相應也。遲數既明。寒熱乃定。欲知寒熱之所屬。又當別乎浮沉耳。

內外因第九

六淫之邪屬天
氣之偏
斯從表
受為外

浮沉遲數。辨內外因。外因於天。內因於人。天有陰陽。風雨晦明。人喜怒憂思悲恐驚。外因之浮。則為表證。沉裏遲陰。數則陽盛。內因之浮。虛風所為。沉氣遲冷。數熱何疑。浮數表熱。沉數裏熱。浮遲表虛。沉遲冷結。表裏陰陽。風氣冷熱。辨內外因。脈證參別。脈理浩繁。總括於四。既為提綱。引申觸類。在表則浮。在裏則沉。遲則為寒。數則為熱。固一定不易之理。而因則有二焉。此內外之不可不辨也。外感六淫。因之於天。內傷七情。因之於人。六淫者。天之陰陽風雨晦明也。即左傳醫和所云。陰淫寒疾。陽淫熱疾。

所因也。六淫症。狀分疏。精詳千。古未發。但要知。陰淫由。陽不治。陽淫陰。不理風。動搖從。陽雨水。淫從陰。乃至晦。淫陽內。鬱明淫。陰不斂。此皆六。淫為病。之宗由。此而推。廣之雖。變症百。出自有。

風淫末疾。雨淫腹疾。晦淫惑疾。明淫心疾也。淫者。淫佚偏勝。久而不復之謂。故陰淫則過於清冷。而陽氣不治。寒疾從起。如上下厥逆。中外寒慄之類。陽淫則過於炎燠。而陰氣不治。熱疾從起。如狂譫煩渴。血泄浸淫之類。風淫則過於動搖。而疾生。如肢廢毛落。癢習痺之類。雨淫則過於水濕。而疾生。如腹滿腫脹。腸鳴濡瀉之類。晦淫則過於昏暗。陽光內鬱。而成惑疾。如百合狐惑。熱中臟燥之類。明淫則過於彰露。陽光外散。而成心疾。如恍惚動悸。錯妄失神之類。七情者。人之喜怒憂思悲恐驚也。即所謂七氣。而巢氏病源論。以勞氣易驚氣。又增寒熱二氣。廣為九氣。若配四時五臟。則又止言五氣。如素問陰陽應象大論云。天有四時五行。以生長收藏。以生寒暑燥濕風。人有五藏。化五氣。以生喜怒悲憂恐。是已。據巢氏言九氣之狀。謂怒則氣上。喜則氣緩。悲則氣消。恐則氣下。寒則氣收。聚。熱則腠理開。而氣泄。憂則氣亂。勞則氣耗。思則氣結。怒氣上者。怒則氣逆。甚則嘔血及食。故氣上矣。喜氣緩者。喜則氣和。營衛通利。故氣緩矣。悲氣消者。悲則心系急。肺布葉舉。使上焦

統屬矣
七情之
傷屬人
心之感
斯由藏
發為內
所因也

情生於
病者調
氣血為
治易病
生於情
者和神
志為治
難如此
錯綜明
辯古所
未及

醫燈續焰 卷一 內外因第九

一六

不通。榮衛不散。熱氣在內。故氣消矣。恐氣下者。恐則精却。精却則上焦閉。閉則氣還。還則下焦脹。故氣下矣。寒氣收聚者。寒則經絡凝滯。故氣收聚矣。熱氣泄者。熱則腠理開竅。榮衛通。故汗出而氣泄矣。憂氣亂者。憂則心無所寄。神無所歸。慮無所定。故氣亂矣。勞氣耗者。勞則喘且汗。內動外泄。故氣耗矣。思氣結者。思則身心有所止。氣留不行。故氣結矣。是謂九氣。而七氣即在其中。雖皆內因。而為病則有二種。一種因感觸情境。氣久不散。着而為病者。病生於情也。一種因五行之盛衰。五藏之虛實。互相勝復。病中見情者。情生於病也。病生於情者。如素問陰陽應象大論云。喜怒傷氣。寒暑傷形。暴怒傷陰。暴喜傷陽。厥氣上行。滿脈去形。喜怒不節。寒暑過度。生乃不固。又曰。東方生風。在聲為呼。在變動為握。在志為怒。怒傷肝。悲勝怒。南方生熱。在聲為笑。在變動為憂。在志為喜。喜傷心。恐勝喜。中央生濕。在聲為歌。在變動為噦。在志為思。思傷脾。怒勝思。西方生燥。在聲為哭。在變動為欬。在志為憂。憂傷肺。喜勝憂。北方生寒。在聲為呻。在變動為慄。在志為恐。恐傷腎。思勝恐。又靈樞口問

此即仲
景所謂
經絡受
邪入藏
府爲內
所困

篇云。夫百病之始生也。皆生於風雨寒暑。陰陽喜怒。飲食居處。大驚卒
恐。則血氣分離。陰陽破散。經絡厥絕。脈道不通。陰陽相逆。衛氣稽留。經
脈虛空。血氣不次。乃失其常。又素問玉機真藏論云。憂恐悲喜怒。令不
得以其次。故令人有大病矣。因而喜大虛。則腎氣乘矣。怒則肝氣乘矣。
悲則肺氣乘矣。恐則脾氣乘矣。憂則心氣乘矣。又靈樞本神篇云。怵惕
思慮者。則傷神。神傷則恐懼流淫而不止。悲哀動中者。竭絕而失生。喜
樂者。神憚散而不藏。愁憂者。氣閉塞而不行。盛怒者。迷惑而不治。恐懼
者。神蕩憚而不收。心怵惕思慮。則傷神。神傷則恐懼自失。破腠脫肉。脾
憂愁而不解。則傷意。意傷則悵亂。四肢不舉。肝悲哀動中。則傷魂。魂傷
則狂。忘不精。當人陰縮而筋攣。兩脅骨不舉。肺喜樂無極。則傷魄。魄傷
則狂。皮革焦。腎盛怒而不止。則傷志。志傷則善忘其前言。腰脊不可以
俛仰屈伸。恐懼而不解。則傷精。精傷則骨痠痿厥。精時自下。又素問調
經論云。喜怒不節。則陰氣上逆。上逆則下虛。下虛則陽氣走之。故曰實
矣。喜則氣下。悲則氣消。消則脈虛空。因寒飲食。寒氣熏滿。則血泣氣去。

故曰虛矣。又素問痿論。岐伯曰。悲哀太甚。則胞絡絕。胞絡絕。則陽氣內動。發則心下崩。數洩血也。又曰。思想無窮。所願不得。意淫於外。入房太甚。宗筋弛縱。發爲筋痿。及爲白淫。又素問遺篇云。人憂愁思慮。即傷心。患怒氣逆。上而不下。即傷肝。又靈樞邪氣藏府病形篇云。愁憂恐懼。則傷心。又靈樞口問篇云。口鼻者。氣之門戶也。故悲哀愁憂。則心動。心動則五藏六府皆搖。搖則宗脈感。宗脈感。則液道開。液道開。故涕泣出焉。又壽夭剛柔篇云。憂恐忿怒傷氣。氣傷藏。乃病藏。又素問血氣形志篇云。形樂志苦。病生於脈。形樂志樂。病生於肉。形苦志苦。病生於咽嗌。形數驚恐。經絡不通。病生於不仁。又素問疏五過論云。嘗貴後賤。雖不中邪。病從內生。名曰脫營。嘗富後貧。名曰失精。五氣流連。病有所并。又云。暴樂暴苦。始樂後苦。皆傷精氣。精氣竭絕。形體毀沮。暴怒傷陰。暴喜傷陽。厥逆上行。滿脈去形。愚醫治之。不知補瀉。不知病情。精華日脫。邪氣乃并。又曰。故貴脫勢。雖不中邪。精神內傷。身必敗亡。始富後貧。雖不傷邪。皮焦筋屈。痿躄爲攣。又素問生氣通天論云。陽氣者。大怒則形氣絕。

楚引證楚

而血菀於上。使人薄厥。又通評虛實論云。隔則閉絕。上下不通。則暴怒之病也。又靈樞刺節真邪篇曰。飲食不節。喜怒不時。津液內溢。乃下留於臍。又素問經脈別論曰。有所墮恐。喘出於肝。淫氣害脾。有所驚恐。喘出於肺。淫氣傷心。驚而奪精。汗出於心。疾走恐懼。汗出於肝。此皆病生於情也。情生於病者。如素問金匱真言論曰。東方色青。入通於肝。開竅於目。藏精於肝。其病發驚駭。又素問調經論曰。血并於陰。氣并於陽。故爲驚狂。又曰。血并於上。氣并於下。心煩惋。善怒。血并於下。氣并於上。亂而喜忘。又宣明五氣篇曰。胃爲氣逆。爲噦。爲恐。又云。膽爲怒。又云。精氣并於心。則喜。并於肺。則悲。并於肝。則憂。并於脾。則畏。并於腎。則恐。又云。陽入之陰。則靜。陰出之陽。則怒。又素問調經論曰。神有餘。則笑不休。神不足。則悲。又曰。血有餘。則怒。不足。則恐。又靈樞行鍼篇曰。多陽者多喜。多陰者多怒。又素問解精微論曰。水之精爲志。火之精爲神。水火相感。神志俱悲。是以目之水生也。故諺言曰。心悲名曰志悲。又靈樞本神篇曰。肝藏血。血舍魂。肝氣虛則恐。實則怒。又云。心藏脈。脈舍神。心氣虛則

悲。實則笑不休。又玉機真藏論曰。春脈太過。則令人善怒。又素問脈解篇云。陽明所謂甚則厥。惡人與火。聞木音則惕然而驚者。陽氣與陰氣相薄。水火相惡。故惕然而驚也。又曰。少陰所謂恐如人將捕之者。秋氣萬物未有畢去。陰氣少。陽氣入。陰陽相薄。故惡也。又曰。肝氣當治而未得。故善怒。善怒者。名曰煎厥。又靈樞根結篇曰。厥陰爲闔。闔折。卽氣絕而喜悲。又素問繆刺篇曰。邪客於足少陰之絡。令人無故善怒。氣上走貴上。又素問生氣通天論曰。俞氣化薄。傳爲善畏。及爲驚駭。又靈樞五變篇曰。此人薄皮膚而目堅固以深者。長衝直揚。其心剛。剛則多怒。怒則氣上逆。胸中蓄積。血氣逆留。臄皮充肌。血脈不行。轉而爲熱。熱則消肌膚。故爲消痺。此言其人暴剛而肌肉弱者也。又素問痺論曰。心痺者。脈不通。煩則心下鼓。暴上氣而喘。噤乾善噫。厥氣上則恐。又曰。肝痺。夜臥則驚。此皆情生於病也。故病生於情者。治其情。如喜勝悲。悲勝怒之類。情生於病者。治其病。如平肝怒解。溫膽悸寧之類。外因之邪。自表而入。當其在表。正氣應之。其脈必浮。若見沉脈。邪已去表而入裏矣。若脈

據病求
因乃張
子和識
子取本
標明
之法

理入神

諸病不離表裏
寒熱識裏
得表裏
寒熱便
可據症
求因
提綱析
目乃脈
學真傳
此扁鵲
家法也

不及四至。名曰遲。遲則邪在陰分。主冷。過於四至。名曰數。數則邪在陽分。主熱。內因之邪。自內而生。如暴喜。卒驚。暴怒。陽氣浮越。脈應之而浮。其中必虛。如今之暴怒。蹶仆。卒驚。暈倒。大喜。偃痛。如中風狀。而非外來之風。此即所謂虛風也。若憂思。悲恐。久積沉鬱。脈應之而沉。以無虛浮風象。故直指曰氣耳。遲則爲冷。若脈遲。不論因於何氣。皆主冷也。數則爲熱。若脈數。不論因於何氣。皆主熱也。數皆主熱。若浮而得之。不論何因。其熱在表。沉而得之。其熱在裏。遲既主冷。若浮而得之。不論何因。其冷在表而虛。沉而得之。其冷在裏而結。外因之表裏陰陽。內因之風氣冷熱。非參以脈。則不能分別。然而脈理浩繁。能提括其綱。自可條析其目。但以浮沉遲數四者而觸類焉。則引彼可以證此。申此可以例彼。而診家之精義。思過半矣。

浮脈第十

浮脈法天。輕手可得。汎汎在上。如水漂木。有力洪大。來盛去悠。無力虛大。

浮脈法
天言在
上也自
肌肉之
分而毛
之皮毛
血脈皆
是也欲
汎汎如
水上木
中漂木
曲盡浮
脈形狀
此在表
不在裏
之脈

遲而且柔。虛甚則散。渙漫不收。有邊無中。其名曰芤。浮小爲濡。綿浮水面。作帛濡甚則微。不任尋按。

天覆於上。陽也。浮脈似之。故曰法天。其脈應於皮毛。輕手可得。按之且有汎汎欲上之勢。如水中漂木。雖按之使沉。亦必隨手而起。脈經所謂舉之有餘。按之不足者是也。若浮脈中加以洪大。來盛去悠。是爲有力之浮脈。謂之浮大之脈亦可。若浮脈中加以虛大。遲而且柔。是爲無力之浮脈。謂之虛大之脈亦可。若浮而虛大之甚。則渙散彌漫。不斂不實。名曰散脈。脈經所謂氣實血虛。有表無裏者是也。若四邊有而中則無。名曰芤脈。芤者。中空之草。其狀如葱。脈經所謂浮大而軟。按之中央空。兩邊實者是也。若浮而小。名曰濡脈。如帛浮於水。按之軟薄。全無力也。若浮濡之甚。則極虛極小。名曰微脈。不勝重爲尋按。脈經所謂若有若無。或欲絕者是也。

沉脈第十一

重接乃得四字。盡沉脈。形狀矣。此在裏。不在表。之脈。輕手舉。之即得。曰浮重。手按之。乃得曰。沉以指。言法輕重。

沉脈法地。近於筋骨。深深在下。沉極爲伏。有力爲牢。實大弦長。牢甚則實。慤慤而強。無力爲弱。柔小如綿。弱甚則細如蛛絲然。

地載於下。陰也。沉脈似之。故曰法地。其脈近在筋骨。非重按不可得。更有深深下沉之勢。脈經所謂舉之不足。按之有餘者是也。若沉之極。似附着於筋骨。名曰伏脈。脈經所謂極重按之乃得者是也。若沉而有力。實大弦長。弦則強急。且大且實。堅牢之義。自可想見。脈經有革脈而無牢脈。要知牢即革也。革脈形如按鼓。亦即強急堅牢之義。皆有餘於外者。若牢之甚。則內外皆實。慤慤而強。如有根蒂也。沉而無力。既小且柔。是名爲弱。脈經所謂極軟而沉細。按之欲絕。指下者是也。弱之甚。則更柔更小。若有若無。縈縈如蜘蛛之絲。名曰細。與微脈固不相遠也。

遲脈第十二

遲脈屬陰。一息三至。小駛於遲。緩不及四。二損一敗。病不可治。兩息奪精。脈已無氣。浮大虛散。或見芤革。浮小濡微。沉小細弱。遲細爲逆。往來極難。

遲則為寒遲甚則寒甚矣此有陰無陽之脈形容妙盡

易散一止。止而復還。結則來緩。止而復來。代則來緩。止不能回。

一呼一吸為一息。脈應四至。是其常也。遲則一息三至。氣不振發。行不如度。故曰屬陰。緩則小駛於遲。猶未能及於四至。若一息二至。元氣已損。一息一至。元氣已敗。病則必不可治。兩息一至。真精奪去。雖一見脈。正氣已無。不過燼燈之餘焰耳。遲而浮大。或為虛散。或為芤革。遲而浮小。不為濡。則為微。遲而沉小。不為細。則為弱。遲而細。則力不足於往來。名曰澁。往來艱澁。則易於散。而或有一止。不止然非絕藏之脈。故止而復還也。結則緩中時或一止。止而復來。蓋氣有結滯。脈為阻礙。暫一止而復來。之阻塞與澁之易散。一止者。不相懸也。代則緩中一止。止不能回。脫根脈經所云。不能自還。因而復動。正如替代之代。有出無入。有去無來之象。

數脈第十三

數脈屬陽。六至一息。七疾八極。九至為脫。浮大者洪。沉大牢實。往來流利。

數則爲
熱數甚
則熱甚
矣此爲
有陽無
陰之脈

遲數以
脈之至
數言
動脈形
狀描寫
曲盡

是謂之滑。有力爲緊。彈如轉索。數見寸口。有止爲促。數見關中。動脈可候。厥厥動搖。狀如小豆。

脈以四至爲平。閏以太息。太約不出五至。若一息六至。是爲數脈。氣行速疾。踰于常度。故曰屬陽。一息七至。氣更速快。故曰疾。一息八至。陽熱已極。一息九至。則元神散脫。而與遲之奪精者。固無異也。數而浮大。其名曰洪。數而沉大。不爲牢。卽爲實。數而往來流利。是名曰滑。卽脈經所云展轉替替然。與數相似者。數而有力。是名曰緊。緊原以形狀言。不以至數言。但緊脈斂實似弦。弦則直急如弦。緊則脈經所云如轉索。如切繩。內有攪動彈搏之狀。似乎數也。若數中時見一止。失倫。名曰促脈。脈流數疾。勢如奔逸。偶不相繼。故一止耳。仲景云。陽盛則促。故當於寸口見焉。若數脈見於關上。名曰動脈。蓋關爲陰陽交互之處。陰陽不和。兩相抗激。勢不相下。故迸於上。而厥厥動搖也。然上下無頭尾。止在一分之關上。非圓實之小豆。不足以形容其狀也。

長脈第十四

長則氣治。過於本位。長而端直。弦脈應指。

脈位有三。寸關尺也。長則透出本位。唯其透出。乃見長象。非氣之充暢。不能有此。故曰治。若長而端直。應於指下。是為弦脈。即素問玉機真藏論曰。其氣來軟弱輕虛而滑。端直以長者。是也。

短脈第十五

短則氣病。不能滿部。不見於關。唯尺寸候。一脈一形。各有主病。數脈相兼。則見諸證。

短脈。則氣不充暢。無論在寸在尺。俱不能滿足本部。唯其不能滿部。乃見短象。氣不足。非病而何。然此唯尺寸見之。設若在關而不滿本部。則與尺寸不相接矣。理無是脈。蓋脈類多矣。有一脈。自有一脈之形。形有不同。故病亦各異。若脈數形兼見。而病亦數種兼成。仲景所謂此自經常。不失銖分者也。如下文云云。

短脈見於關亦即後之絕脈也
長短以脈之部位言

醫燈續焰

明 錢塘 王 紹 隆 著

明 錢塘 潘 楫 碩 甫 註

明 錢塘 王 佑 賢 聖 翼 評

鄞縣 曹 赤 電 炳 章 校

卷二

浮脈主病第十六

前一段
浮脈止
言脈狀
此一段
以浮脈
為宗而
以諸症
統屬自
得學脈
之要後

浮脈主表。裏必不足。有力風熱。無力血弱。浮遲風虛。浮數風熱。浮緊風寒。浮緩風濕。浮虛傷暑。浮芤失血。浮洪虛火。浮微勞極。浮濡陰虛。浮散虛極。浮弦痰飲。浮滑痰熱。

皮毛曰表。言在外也。浮脈與皮毛相得。亦有勢汎汎外浮者。皆主表。氣應於表。其裏必虛。故裏不足。浮亦主風。浮而有力。風熱所為。蓋風為陽邪。其性輕浮動蕩。加之以熱。勢必壅盛。故有力也。宜荆防羌活無

沉脈及
遲數等
做此

每症下
註以方
藥欲便
選刺施
治此不
過言其
大概在
人擴充
不可拘
執故曰
之類所
該甚廣
遲則至
數遲緩
為來勢
緩須細
心體會
邪為陰
邪故濡
漫緩懈

則浮而虛矣。血主裏。氣主表。血弱不能諧氣。故反浮。亦裏不足之義。宜參
者四物脈浮而遲。乃鼓動之不及也。為風虛。宜桂四君子湯或類脈浮而數
乃鼓動之太過也。為風熱。宜荆防膏薄芩脈浮而緊。緊則緊斂。寒之
性也。風中有寒。九味羌活湯麻黃湯或脈浮而緩。緩則緩漫。濕之性也。
風中有濕。宜羌防蒼附之類浮虛傷暑者。暑傷乎氣。氣主浮外。而暑性
張散。故傷暑者多汗。經曰。脈虛身熱。得之傷暑者是也。宜清暑益氣湯
類浮芤失血者。血去脈空耳。蓋衛行脈外。榮行脈中。血失則榮損。榮損
則脈中空。如芤草之狀也。宜黃耆歸芍或當歸脈浮而洪。充湧指下。火
之象也。但浮則有表無裏。故曰虛火。宜當歸補血湯四物湯浮微勞極。
陽氣欲絕也。素問生氣通天論曰。陽氣者。煩勞則張。精絕。辟積於夏。使
人煎厥。目盲不可以視。耳閉不可以聽。潰潰乎若壞都。汨汨乎不可止。
蓋言陽氣清淨。煩勞則陽精張散而竭絕。積於夏長之時。當振發而反
退陷。故變病如上。是名煎厥。煎厥者。氣應振而反靡。應出而反入。如煎
迫之自外及裏。煎熬之由多漸少。即難經十四難所謂自皮毛以及於

三焦宣
布描寫
曲盡蓋
人身穀
精運用
毋容停
滯三焦
宣布之
力也停
則為飲
滯則為
痰隨所

骨之五損。從上下者是也。今之五勞六極。虛怯損瘵。皆煎厥之類。陽主浮。以其因於耗陽。故脈浮微耳。宜十全大補湯生脈散大造丸四君子湯八珍湯之類脈浮而濡。衰薄之甚。僅有其上。若無其下。故主陰虛。味丸四物湯六。若浮而散。則又陰虛之極矣。陽在外。陰之使。陰在內。陽之守。陰虛極而不能為守。則陽無所依。浮越而散。略無陰凝內斂之象。故陰虛劇。然而孤精於內。氣耗於外。謂之陰陽兩虛亦可。宜腎氣丸大補湯金匱脈浮弦者。痰飲。痰飲何自而生乎。素問經脈別論曰。飲食入胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。又榮衛生會篇曰。上焦如霧。中焦如漚。下焦如瀆。二說雖殊。其理則一。方飲之。由胃遊溢而上輸於脾也。腐熟如酒醅之噴發。炊釜之沸騰。即中焦之如漚。由脾散精而上歸於肺也。拔粹升純。氤氲若嘆。即上焦之如霧。由肺之通調而下輸膀胱也。氣化開通。洩便注泄。即下焦之如瀆。名雖有三。實則一氣。若氣虛寒不運。則飲亦停留不行。隨不運之處停留。則隨停留之處見病矣。大約暴則為飲。久則成痰。清薄則為飲。濁厚則成痰。寒多則為飲。

在而見症非惟痰飲為然即噎膈反胃吐瀉閉癰之候其機亦相同此所謂知常始能達變始可復常若不難下手恐難下妙解

熱多則成痰。熬汁收膏。煮水結鹽之義也。弦乃陰脈。為陽不足。仲景云。弦為陽運。正言陽之不能運也。又云。沉潛水蓄。支飲急弦。俱言陽氣衰弱。不能運行其飲。故見此弦。斂不鼓之脈耳。宜小金匱苓桂朮甘草水飲應沉而言浮者。當在上焦。若浮而滑。則非弦斂不鼓之脈。寒當化熱。飲當成痰。此必然之理也。
宜二陳湯或梔芩花粉玄明粉之類

附方

參耆四物湯 治血虛。氣不能與之諧。反上氣喘促。自汗惡寒。面白脈浮。按之空澁。或曾經失血者。

人參 一錢 黃耆 二錢蜜炙 當歸 二錢 熟地黃 二錢

白芍藥 錢半酒炒 一芍 八分

右為粗末。水二盞。煎七分。溫服。

四君子湯 治真氣虛弱。及短氣脈弱。加陳皮。各異功散。加陳皮。半夏。名

六君子湯。

白朮 人參 茯苓 甘草各等分

耆曰白朮強扶健運茯苓滲溼

燥脾甘
草守氣
於中宮
人參益
氣於五
藏皆主
脾胃者
以人身
真氣即
水穀之
氣也四
藥冲和
平澹而
能補氣
維陽誠
君子哉
* 輯曰雖
是攔江
網然亦
平正可
用

* 右為粗末。每服五錢。水一盞。煎至七分。食遠溫服。
九味羌活湯

羌活 防風 蒼朮 各一錢
白芷 川芎 生地黄 黃芩 各一錢
細辛 四分

加生薑三片。大棗一枚。水二盞。煎八分。熱服取汗。陶節菴云。春夏秋感冒。頭疼發熱。惡寒無汗。脈浮緊。見太陽表證。宜服此。平正方也。其加減法。在人自變通耳。

仲景麻黃湯 治傷寒太陽脈浮。頭項強痛。腰脊疼。發熱惡寒。身體痛。無汗而喘者。

麻黃 一兩 桂枝 一兩 甘草 五錢 杏仁 五十粒
為粗末。每服五錢。水二盞。煎初沸。去上沫。再煎至七分。溫服取汗。汗出不必服盡劑。

清暑益氣湯

黃耆一錢半汗少減五分

蒼朮一錢 升麻一錢

人參去蘆 白朮

陳皮 神麴

澤瀉各五分 甘草炙

黃蘗酒浸 葛根

青皮去瓢 當歸身

麥門冬去心各 五味子九粒

水二大盞煎至一盞去滓食遠稍熱服劑之多少臨時斟酌此東垣所製以治長夏土令濕勝非獨暑也其論云暑濕蒸熾人感之則四肢困倦精神短少胸滿氣促肢節沉疼或氣高而喘身熱而煩小便黃數大便溏頻或痢如黃糜或如泔色或渴或不渴不思飲食自汗或汗少血先病而氣不病也其脈洪緩若血氣相搏必更加遲病雖互換少差其天暑濕令則一也宜以清燥之劑治之內經曰陽氣者衛外而為固也其則氣泄今暑邪干衛故身熱自汗以黃耆甘溫補之為君人參橘皮當歸甘草甘微溫補中益氣為臣蒼朮白朮澤瀉滲利而除濕升麻葛根甘苦平善解肌熱又以風勝濕也濕勝則食不消而作痞滿故炒麴甘辛青皮辛溫消食快氣腎惡燥急食辛以潤之故以黃蘗苦辛寒

借甘味瀉熱。補水虛者。滋其化源。以人參、五味子、麥門冬、酸甘微寒。救天暑之傷。於庚金為佐。名曰清暑益氣湯。

百一十味香薰飲 消暑氣和脾胃

香薰一兩 人參去蘆 陳皮去湯白 白朮

白茯苓 白扁豆殼炒去 黃耆去蘆 乾木瓜

厚朴薑汁製炙甘草兩各半 右為細末。每服二錢。不拘時。熱湯或冷水調下。

當歸補血湯 治氣血俱虛。肌熱惡寒。面目赤色。煩渴引飲。脈洪大而虛。

重按似無。此脈虛血虛也。此病多有得於饑飽勞役者。

黃耆炙一兩 當歸酒洗二錢

右以咀作一服。水三盞。煎至一盞。去滓溫服。食前。

瓊玉膏 治吐血欬嗽。

生地汁新鮮者取四斤 白茯苓耐十三 人參六兩

以參苓為極細末。以地黃汁和蜜拌入。用瓶貯。紙箬包其口。用桑柴火

輯曰熟地黃重潤色黑補腎水澤瀉於上液於淡扶苓於下參於水行皮瀉陰火而水不枯藥黃澁精氣而水自固乃山藥者又補土以防制其汎濫也佐賢曰此滋左腎化源內熟地

重湯煮三晝夜。取出水浸三日。白湯點服。

六味丸

一名地黃丸。治腎經不足。發熱作渴。小便淋閉。氣壅痰嗽。頭目

眩暈。眼花耳聾。咽燥舌痛。齒牙不固。腰腿委軟。自汗盜汗。便血。諸血失音。水泛為痰。血虛發熱等證。其功不能盡述。

熟地黃

入兩酒

山茱萸肉

乾山藥

各四兩

牡丹皮

去骨

白茯苓

去皮

澤瀉

去毛各三兩

右各另為末。和地黃膏加煉蜜。丸桐子大。每服七八十丸。空心滾湯下。

八味丸。治命門火衰。不能生土。以致脾胃虛弱。飲食少思。大便不實。臍

腹疼痛。夜多漩溺等證。即六味丸加肉桂。附子各一兩。

十全大補湯

治氣血俱虛。發熱惡寒。自汗盜汗。肢體倦怠。或頭痛眩暈。

口乾作渴。喉痛舌裂。及久病虛損。口乾食少。欬而下利。驚悸發熱。或寒

熱往來。晡熱內熱。遺精白濁。二便見血。小腹作痛。小便短少。大便乾澀。

或大便滑泄。肛門下墜。小便頻數。陰莖癢痛。或臍腹陰冷。便溺遺瀝。或

心神不寧。寤而不寐。或形容不充。肢體作痛。或鼻吸氣冷。急趨氣促等

宜九蒸曬蓋多蒸不滯多曬氣溫水裏陽生之義今人以水煮黑絕不見日此與煎劑用生地何異血不足當兩補之方以四君子補氣以四物補血蓋氣血者水穀之精微也

證皆是無根虛火。但服此藥。諸病悉除。凡元氣素弱起居失宜。飲食勞倦。用心太甚。以此為主。

肉桂

甘草

芍藥

黃耆

當歸

川芎

人參

白朮

茯苓

熟地黃各等分

右水煎服。

^{*}生脈散

治熱傷元氣。肢體倦怠。氣短懶言。口乾作渴。汗出不止。或濕熱

大行。金為火制。絕寒水生化之源。致肢體痿軟。脚軟眼黑。最宜服之。

人參

五錢

五味子

麥門冬

各三錢

右水煎服。

^{*}大造丸

治諸虛百損。精血兩虧。形體尪羸。筋骨痿弱。或七情傷感。以致

成勞。或外感失調。久成虛乏。凡一切不足之疾。服此漸復真元。功難盡

述。

紫河車

一具用米泔水浸。輕輕攤開。換洗令淨。白為度。勿動筋膜。用

遊溢精微權操脾胃蘊命門火若命門衰則中焦力亦薄氣血又何自而生乎所以加肉桂者釜底添薪義耳釜底添薪而釜無覆蓋則上中如霧如瀝者皆屬虛散了無實際况又

醫燈續焰 卷二 浮脈主病第十六

一〇

爛如糊取出先傾汁入藥內用石白木椎搗極均細為度入後藥

乾地黃一兩五錢

熟地黃二兩

麥門冬去心

天門冬去心各半

當歸一兩

枸杞子七錢

五味子

牛膝各七錢

杜仲半兩

小茴香

黃蘗

白朮各二兩

陳皮二錢

乾薑二錢

側柏葉

採向東嫩枝隔紙焙二兩

如氣虛。加人參、黃耆各一兩。血虛。倍當歸、地黃。腎虛。加覆盆子炒。巴戟

去心。山茱萸、肉各一兩。腰痛。加白朮、鹽水炒。草薢。瑣陽。酥炙。續斷。酒洗。

各一兩。骨蒸。加地骨皮、知母、丹皮各一兩。如婦人。去黃蘗。加川芎、香附。

條芩。俱酒炒。一兩共末。同河車為丸。如桐子大。每服三錢。清晨白湯下。

八珍湯 治肝脾傷損。氣血虛弱。惡寒發熱。煩躁作渴。或不時寒熱。眩暈

昏憤。或大便不實。小便淋赤。或飲食少思。小腹脹痛等證。

人參

白朮

白茯苓各三錢

甘草炙

芍藥各一錢

當歸

熟地黃各三錢

川芎五錢

右水煎服。

有自汗盜汗外泄之證。此黃耆覆蓋釜上之品。斷不可少者也。佑賢曰：此方妙在五味子以入肺。益氣能擁護營氣。令無散漫。而成脈。佑賢曰：以人治人。自有奇效。况根氣所

仲景苓桂朮甘湯。傷寒論云：治傷寒吐下後。心下逆滿。氣上衝胸。起則頭眩。脈沉緊。發汗則動經。身爲振振搖者。服此湯。又治停痰寒飲。中虛冷瀉等證。

茯苓四兩 桂枝三兩 白朮 甘草各二兩

右水六升。煮取三升。去滓。分溫三服。

仲景小青龍湯。傷寒論云：傷寒表不解。心下水氣。乾嘔發熱而欬。或渴。或利。或噎。或小便不利。少腹滿。或喘者。服此湯。又治停飲。久欬肺寒。

麻黃去節 芍藥 細辛 乾薑

甘草炙 桂枝三兩 五味子半升 半夏洗半升

右以水一斗。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。若渴。去半夏。加括蕒根三兩。若微利。去麻黃。加葶花如雞子大。熬令赤色。若噎者。去麻黃。加附子一枚。炮。若小便不利。少腹滿者。去麻黃。加茯苓四兩。若喘者。去麻黃。加杏仁半升。去皮尖。

二陳湯。治脾胃虛弱。中脘停痰。或嘔吐惡心。或頭目不清。飲食少思等

證。乃諸痰主藥。

陳皮五分

半夏五分

白茯苓二錢

甘草八分

加薑一錢煎服。

鍾必達 元海蒸 浸湯蒸 庶存真 性今人 酒煮火 焙者非 理也

沉脈主病第十七

佑賢曰 此治水 寒射肺 而欬者 緝曰龍 以行水 但於胸 故曰小 不似大 龍之出 汗作霖 雨也

*緝曰痰

沉脈主裏。主寒主積。有力痰食。無力氣鬱。沉遲虛寒。沉數熱伏。沉緊冷痛。沉緩水蓄。沉牢痼冷。沉實熱極。沉弱陰虛。沉細痺濕。沉弦飲痛。沉滑宿食。沉伏吐利。陰毒聚積。

脈按之至骨曰沉。對待浮表。是曰主裏。寒乃水寒。積乃藏積。總屬陰凝。故見沉脈。沉而有力。有物在裏。非痰即食。痰宜用仲景大承氣湯之類。食宜用仲景王隱君痰丸之類。沉而無力。裏原非實。但氣不伸。宜和劑四七湯河間。沉為在裏而復遲。虛寒可必。宜仲景理中湯之類。沉為在裏而加數。伏熱何疑。宜寶鑑既濟解毒湯導赤散黃連解毒湯之類。沉而緊。則寒為飲實。故冷痛也。宜金匱烏頭煎和。沉而緩。則陽不健行。故水蓄焉。宜仲景五苓散苓桂朮甘湯之類。沉而牢。乃陰寒之滯着。應當痼冷。

由飲結脾胃之乏
力布甘
韋助脾
胃治本
陳皮宣
穀氣於
上茯苓
參水飲
於下中
夏轉樞
機於中
痰散飲
行而諸
證自除
矣

宜和劑來復沉而實。是陽氣之聚搏。宜乎熱深。宜仲景大承氣湯沉為
丹大七香丸。沉而實。是陽氣之聚搏。宜乎熱深。宜仲景大承氣湯沉為
陰弱為虛。沉弱必主陰虛。宜金匱腎氣丸沉為裏細為濕沉細定成痺
濕。宜金匱桂枝附子湯和劑沉為陰。弦為飲。沈弦則飲停腹陰而時痛。
宜仲景小青龙湯沉為裏。滑為食。沉滑則食宿腸裏而難推。宜仲景大承
湯五苓散之類。沉為裏。滑為食。沉滑則食宿腸裏而難推。宜仲景大承
和丸之類。保沉已氣沉於骨。伏則至骨如無。勢甚篤危。須分久暴。暴則
既吐且利而暴脫。溫補可回。宜和劑大七香丸仲景理久則陰毒聚積
之久阻峻攻莫愈。宜枳實理

附方

王隱君滾痰丸養生主論痰之為病。成偏頭風。成雷頭風。成太陽頭痛。眩暈
如坐舟車。精神恍惚。或口眼瞤動。或眉稜耳輪俱癢。或頷腮四肢遊風
腫硬。似疼非疼。或渾身燥癢。搔之則癢疹隨生。皮毛烘熱。色如錦斑。或
齒頰似癢似痛。而疼無定所。滿口牙浮。痛癢不一。或噯氣吞酸。鼻聞焦
臭。喉間豆腥氣。心煩鼻塞。咽啞不利。咯之不出。咽之不下。或因噴嚏而
出。或因舉動而唾。其痰如墨。又如破絮。或如桃膠。或如蜆肉。或心下如

停冰鐵。閉滯妨悶。噯嚏連聲。狀如膈氣。或寢夢刑戮。刀兵劍戟。或夢入人家。四壁圍繞。暫得一竇。百計得出。則不知何所。或夢在燒人地上。四面烟火枯骨。焦氣撲鼻。無路可出。或不因觸發。忿怒悲啼。雨淚而寤。或時郊行。忽見天邊兩月交輝。或見金光數道。回頭無有。或足膝酸軟。或骨節腰腎疼痛。呼吸難任。或四肢肌骨間痛如擊。截乍起乍止。並無常所。或不時手臂麻疼。狀如風濕。或臥如芒刺不安。或如毛蟲所螫。或四肢不舉。或手足重滯。或眼如薑蜇。膠粘癢澀。開闔甚難。或陰晴交變之時。胸痞氣結。閉而不發。或齒癢咽痛。口糜舌爛。及其奮然而發。則噴嚏出聲。初則涕唾稠粘。次則清水如注。或眼前黑暗。腦後風聲。耳內蟬鳴。眼瞤肉惕。治之者。或曰腠理不密。風府受邪。或曰上盛下虛。或曰虛。或曰寒。或曰熱邪。唯洞虛子備此疾苦。乃能治療。病勢之來。則胸腹間如有一二氣交紐。噎塞煩鬱。有如烟火上衝。頭面烘熱。眼花耳鳴。痰涎涕淚。並從肺胃間涌起。凜然毛豎。噴嚏千百。然後遍身煩躁。則去衣凍體。稍止片時。或春秋乍涼之時。多加衣衾。亦得暫緩。或頓飲冰水而定。或痛

飲一醉而寧。終不能逐去病根。乃得神祕沉香丸方。屢獲大效。愈人數萬。但不欲輕傳匪人。故以隱語括之。詩曰。甌裏翻身甲帶金。於今頭戴草堂深。相逢二八求斤正。硝煨青礞倍若沉。十七兩中零半兩。水丸梧子意須斟。除驅怪病安心志。水瀉雙身却不任。

大

黃蒸少頃翻過再蒸少頃即取出不可過

黃

芩各八兩

青礞石

硝煨如金色

沉香

百藥煎

此用百藥煎乃能收飲周身頑涎聚於一處然後利下

甚有奇功。日倍若沉者。言五倍子與沉香。非礞倍於沉之謂也。以上各五錢。

右爲末。水丸如梧子大。白湯食後空心服。

一切新舊失心喪志。或癲或狂等證。每服一百丸。氣盛能食。狂甚者。加二十丸。臨時加減消息之。一切中風癱瘓。痰涎壅塞。大便或通或結者。每服八九十丸。或加至百丸。永無秘結之患。一切陽證風毒脚氣。遍身遊走疼痛。每服八九十丸。未效。加至百丸。一切無病之人。遍身筋骨疼痛。不能名者。或頭痛牙疼。或搖或癢。風蛀等證。風寒鼻塞。身體或疼或不疼。非傷寒證者。服八九十丸。痰涎氣實者加之。一切吞酸。

噯逆膈氣。及胸中疼悶。腹中氣塊衝上。嘔沫吐涎。狀如反胃。心下恍惚。如畏人捕。怵惕不安。陰陽關格。變生乖證。食饑傷飽。憂思過慮。心下嘈雜。或痛或噦。或晝夜虛飽。或饑不喜食。急慢喉閉。赤眼。每用加減服。一切新舊痰氣喘嗽。或嘔吐頭暈目眩。加減服之。一切顚頷腫硬若癰癰者。及口糜舌爛。咽喉生瘡者。每服六七十丸。加蜜少許。一處嚼碎噙化。睡時徐徐嚥之。曾有口瘡者。服二三十丸。依前法噙之。三二夜即瘥。凡一切男婦大小。虛實心疼連腹。身體羸瘦。發時必嘔綠水。黑汁冷涎。乃至氣絕。心下溫煖者。量虛實加減服之。若事屬不虞之際。至於百丸。即便回生。未至顚危者。虛弱疑似之間。只服三十丸。或五十丸。立見生意。然後續續進之。以瘥爲度。兼服生津化痰。溫中理氣之藥。一切荏苒疾病。凡男婦患非傷寒內外等證。或酒色過度。或吐血。或月事愆期。心煩志亂。或腹脹脇痛。勞倦痰眩。或暴行日中。因暑伏痰。口眼喎邪。目痛耳聾。鼻塞。骨節酸疼。乾嘔惡心。諸般內外疼痛。百藥無效。衆醫不識者。依前法加減服之。效。大抵服藥。須臨臥在牀。用熱水一口許。嚥下。

便臥。令藥在喉膈間。徐徐而下。如日間病出不測。疼痛不可忍。必欲急除者。須是一依前臥法服。大半日不可服湯水。及不可起身行坐言語。直候藥丸除逐下。焦痰滯惡物。遇膈入腹。然後動作。方能中病。每夜須連進二次。次日痰物既下。三五次者。仍服前數。下五七次。或直下二三次。而病勢頓已者。次夜減二十丸。頭夜所服。並不下惡物者。次夜加十丸。人壯病實者。多加至百丸。惟候虛實消息之。或服過仰睡。咽喉稠粘。壅塞不利者。痰氣泛上。乃藥病相攻之故也。少頃藥力既勝。自然寧帖。往往病久結實於肺胃之間。或則暴病全無泛濫者。服藥下咽。即仰臥。頓然百骸安靜。五藏清寧。次早先去大便一次。其餘遍數。皆是痰涕惡物。看甚麼糞。用水攪之。盡是痰片粘涎。或稍稍腹痛。腰腎拘急者。蓋有一種頑痰惡物。閉氣滯腸。裏急後重者。狀如痢疾。片餉即已。若有痰涎易下者。快利不可勝言。頓然滿口生津。百骸爽快。間有片時倦怠者。蓋因連日病苦不安。一時爲藥力所勝。氣體暫和。如醉得醒。如浴方出。如睡方起。此藥並不洞泄刮腸大瀉。但取痰積惡物。自腸胃次第而下。腹

中糟粕。並不相傷。其推下腸腹之糞。則藥力所到之處。是故先去其糞。其餘詳悉不能盡述。服者當自知之。

仲景大承氣湯 此仲景以之下邪熱入裏。成痞滿燥實堅者。後人用下

腹中一應有餘積聚食物皆效。但寒飲冷積不宜。

大黃酒洗 厚朴去皮炙 枳實五枚 芒硝三合

右以水一斗。先煮二物。取五升。去滓。內大黃。煮取二升。去滓。內芒硝。更

上微火一兩沸。分溫再服。得下。餘勿服。

仲景小承氣湯 功力稍次於大承氣。不甚堅便燥結者宜之。

大黃四兩 厚朴二兩 枳實三枚

右三味。以水四升。煮取一升二合。去滓。分溫二服。初服湯。當更衣。不爾

者。盡飲之。若更衣。勿再服。

大七氣湯即和劑 治喜怒不節。憂思兼并。多生悲恐。致藏氣不平。心腹

脹滿。

半夏 茯苓各四兩 厚朴三錢 紫蘇二錢

樺曰地 道閉塞 不能順 承乎天 下之所 以承之 也。證有 重輕故 大湯有 小

右剉入薑煎服。

河間正氣天香散

治九氣。

烏藥二兩

香附末八兩

陳皮

蘇葉

乾薑各一兩

右爲細末。每服一錢匕。鹽湯下。

仲景理中圓

加附子二錢。即名附子。今人用爲湯更捷。

治傷寒霍亂。下利清穀。感冒吐

瀉。一切脾胃虛寒。中冷不食等證。

乾薑炮

白朮炒

甘草炙

人參各二錢半

水二鍾。煎八分。食前溫服。

寶鑑既濟解毒湯

治上熱頭目赤腫而痛。胸膈煩悶。不得安臥。身半以

下皆寒。足脢尤甚。大便微秘。

大黃酒煨。用大便秘。

黃連酒炒。

黃芩酒炒。

甘草炙

桔梗各二錢。

柴胡

升麻

連翹

當歸身各一錢。

右咬咀作一服。水二鍾。煎至一鍾。去滓。食後溫服。忌醇酒濕麵。及生冷硬物。

錢氏導赤散 治小腸伏熱。小便赤澀。或痛。或手心熱。或心煩動悸。白濁等證。

生地黃

木通

甘

草各等分

右同爲末。每服三錢。水一盞。入竹葉七片。同煎至五分。食後溫服。一本用黃芩。不用甘草。

仲景黃連解毒湯 治下焦一切伏熱實熱。或小便赤色而痛。大便熱結。腹中熱。或大小便見血。

黃連七錢

黃蘗

梔子各半兩

黃芩一兩

每服五錢。水一盞半。煎至一盞。去滓熱服。未知再服。

金匱烏頭煎 治寒疝繞臍。疔痛欲死。及沉寒痼冷。一切溫煖藥不能取效者。宜此主之。

烏頭大者五枚熬去皮不咬咀

右以水三升。煮取一升。去滓。內蜜二升。煎令水氣盡。取二升。強人服七合。弱人服五合。不差。明日更服。不可日再服。

和劑來復丹 治上盛下虛。裏寒外熱。伏暑泄瀉嘔吐。心腹疼痛等證。

硝石一兩同硫黃為末入磁罐內以微火炒用柳篋

太陰玄精石研飛

舶上硫黃透明者各一兩

五靈脂水澄去青砂晒乾

皮去白

陳皮去白各二錢

右用五靈脂二橘皮為末。次入玄精石末。及前二氣末拌勻。好醋打糊為丸。豌豆大。每服三十丸。空心米飲下。印作錠子。磨服更佳。

仲景五苓散 傷寒論云。太陽病發汗後。大汗出。胃中乾。煩躁不得眠。欲

得飲水者。少少與飲之。令胃氣和則愈。若脈浮小便不利。微熱消渴者。

五苓散主之。此蓋治汗後表不盡解。渴多飲水。水液復停。服此解未盡

之表。一以行停中之水。今人用為行飲利小便之常藥。亦多效驗。

猪苓十八銖 澤瀉六銖 白朮十八銖 茯苓十八銖

桂枝半兩

右五味。搗爲末。以白飲和服方寸匕。日三服。多飲煖水。汗出愈。
和劑大七香丸 治脾胃虛冷。心膈噎塞。漸成膈氣。脾泄瀉利。反胃嘔吐。

香附子二兩 麥藥一兩 丁香皮半兩 縮砂仁

藿香 官桂 甘草 陳皮各半兩

甘松 烏藥各六錢半

右十味爲末。蜜丸彈子大。每服一九。鹽酒鹽湯任嚼下。忌生冷肥膩物。
和劑小七香丸 溫中快膈。化積和氣。治中酒嘔逆。氣膈食噎。茶酒食積。
小兒疳氣。

甘松八兩 益智仁六兩 香附子炒 丁香皮

甘草二兩 蓬朮煨 縮砂各二兩

右爲末。蒸餅爲丸。綠豆大。每服二十丸。溫酒薑湯熱水任下。
神芎導水丸

黃芩一兩 黃連 川芎 薄荷各半兩
大黃二兩 滑石 黑牽牛四兩末各

河間製。治一切熱證。其功不可盡述。設或久病熱鬱。無問瘦痿老弱。并一切證。可下者。始自十丸。以爲度。常服此藥。除腸胃積滯。不傷和氣。推陳致新。得利便快。並無藥燥搔擾。亦不困倦虛損。遂病人心意。或熱甚。必急須下者。使服四五十丸。未效再服。以意消息。常服二三十丸。不動藏府。有益無損。或婦人血病下惡物。加桂半兩。病微者常服。甚者取利。因而結滯。開通惡物自下也。凡老弱虛人。脾胃經虛。風熱所鬱。色黑齒稿。身瘦萎黃。或服甘熱過度。成三消等病。若熱甚於外。則肢體躁擾。病於內。則神志躁動。怫鬱不開。變生諸證。皆令服之。惟藏府滑泄者。或裏寒脈遲者。或婦人經病產後血下不止。及孕婦等。不宜服。

金匱腎氣丸見第六十六

六味丸見第六十六

金匱桂枝附子湯 傷寒論云。太陽病發汗。遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微急。難以屈伸者。此湯主之。蓋亡陽脫液。故見上證。是湯和榮衛以復陽。若風寒濕痺等證。用之亦妙。

桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩 生薑三兩

大棗十二枚 附子三枚

右咬咀。以水七升。微火煮取三升。去滓。適寒溫。服一升。服已。須臾啜熱稀粥一升餘。以助藥力。溫覆令一時許。半身熱熱微似有汗者益佳。不可令如水淋漓。病必不除。若一服汗出病差。後服不必盡劑。若不汗更服。依前法。又不汗。後服小促其間。半日許令三服盡。若病重。一日一夜服。周時觀之。服一劑盡。病證猶在者。更作服。若汗不出。乃服至二三劑。禁生冷粘滑。肉麵五辛。酒酪臭惡等物。

和劑滲濕湯 治寒濕所傷。身體重着。如坐水中。小便赤澀。大便溏泄。

蒼朮炒 白朮炒 甘草炙 茯苓去皮

乾薑炮 橘紅 丁香各二錢半

每服四錢。水一盞。棗一枚。薑三片。煎七分。食前去滓溫服。

胃苓湯 治濕鬱。小便不利。胸腹脹悶。或四肢沉重。或飲食停中。或濕鬱發黃。或傷食泄瀉。并一切山嵐瘴氣。侵乘而成瘧痢者。皆效。

佑賢曰
仲景枳
朮湯治
水氣成
痞易老
改而為
丸治食
物成積
一散一
消湯丸
別

蒼朮炒 厚朴薑汁炒 陳皮 白朮
茯苓各一錢半 澤瀉 猪苓各一錢 甘草六分
官桂五分

右水加生薑煎服。

仲景小青龍湯見第六

潔古枳朮丸 治痞積。消食強胃。每藏云本仲景枳朮湯也蓋易老改為丸治老幼虛弱飲食不化或藏府軟弱者

枳實去蘊一兩 白朮二兩

右為末。荷葉裹燒飯為丸。如桐子大。每服五十丸。白朮湯下。服白朮者。本意不取其食速化。但久服令人胃氣強實。不復傷也。

丹溪保和丸 治食積。酒積。

山楂肉二兩 半夏薑製 橘紅 神麴
麥芽炒 白茯苓各一兩 連翹 萊菔子炒
黃連各半兩

右爲末。滴水爲丸。加白朮二兩。名大安丸。

藿香正氣散。治外感風寒。內停飲食。頭痛寒熱。或感濕暑。霍亂泄瀉。脚轉筋。或作瘧疾。常服除山嵐瘴氣。

桔梗

大腹皮

紫蘇葉

茯苓

厚朴

製各一錢

甘草

炙五分

藿香

五錢

白芷

白朮

陳皮去白

半夏

各一錢半

右薑棗水煎熱服。加香薷、扁豆、黃連。名藿香湯。

枳實理中丸

治寒實結胸。

茯苓

人參

白朮

乾薑

甘草

各一兩

枳實

片十六

右爲細末。煉蜜丸如鷄子黃大。每服一丸。熱湯化下。連進二三服。

醫燈續焰

明 錢塘 王 紹 隆 著

明 錢塘 潘 楫 碩 甫 註

明 錢塘 王 佑 賢 聖 翼 評

鄞縣 曹 赤 電 炳 章 校

卷二

遲脈主病第十八

遲脈主藏。陽氣伏潛。有力爲痛。無力虛寒。

遲爲陰脈。五藏爲陰。故主藏。難經九難曰。遲者。藏也。又曰。遲則爲寒。傷寒論亦曰。遲爲在藏。以陽氣伏潛。不能健行。故至數遲耳。遲而有力。有壅實不通利之意。痛可想見。宜溫而補。四君子湯。薑桂附子之類。遲云陽伏。而又無力。爲虛寒必矣。宜溫而補。四君子湯。薑桂附子之類。

附方

梘曰氣
盛陽生
死陰自
選香竄
力猛閉
塞立通

和劑蘇合香丸

療傳屍。骨蒸。殭。肺痿。疰忤鬼氣。卒心痛。霍亂吐利。時

氣。鬼魅瘴瘧。赤白暴痢。瘀血月閉。痧癰。疔腫。驚癇。鬼忤中人。小兒吐乳。大人狐狸等病。又治中風卒仆。九竅閉塞。并百邪暴乘。腹痛下利。開關辟邪之藥也。

白朮炒

青木香

烏犀角屑

香附子炒去毛

朱砂研水飛

訶黎勒皮煨取

白檀香

安息香另末無灰酒一升熬膏

沉香

麝香研

丁香

華撥各二兩

龍腦研

薰陸香另研

蘇合香油內入安息香膏各一兩

右為細末。入研藥勻。用安息香膏。并煉白蜜和劑。每服旋丸如梧子大。早朝取井牽水。溫冷任意。化服四丸。老人小兒。化服一丸。溫酒化服亦得。並空心服之。用蠟紙裹一丸。如彈子大。緋絹袋當心帶之。一切邪神不敢近。今則俱用蠟殼。可久藏備用。

四七湯見第六

四君子湯見第六

數脈主病第十九

數脈主腑。主吐主狂。有力為熱。無力為瘡。

佑賢曰
膈氣虛
服乃數
也

虛熱主
吐實熱
主狂

數脈為陽。六府亦為陽。故主府。難經九難曰。數者府也。又曰。數則為熱。傷寒論亦曰。數為在府。此以遲數分陰陽。故即以配藏府。亦不過言其大概耳。至若錯綜互見。在府有遲。在藏有數。在表有遲。在裏有數。又安可以藏府二字拘定也。數脈主吐者。脈始於中焦。吐則胃氣逆。中焦擾亂。氣逆而動。故脈數。宜六君子湯生薑主狂者。狂則神志昏亂。氣無所御。氣無所御。則奔逸於四肢。而四肢實。四肢實。是以能登高行遠。跳躍異常。夫四肢為諸陽之本。陽邪實之。故力倍也。難經二十難曰。重陽者狂。又病能論曰。狂生於陽也。又曰。陽明者常動。巨陽少陽不動。不動而動大疾。此其候也。蓋言陽明之脈常動。巨陽少陽之脈不動。今無論常動者。即不動者亦動。動且大疾。是為狂病之候。觀此則狂病之見數脈明矣。宜東垣珠砂安神丸數而有力。聚熱所鼓。有外感證者宜桂枝湯

無汗者麻黃湯之類。無外感者。和劑涼膈散。岑連。梔。蘇。之類。數而無力。雖有熱而虛散。熱散於外。發瘡之候也。宜仲景黃連解毒湯消腫。傷當歸飲子之類。

附方

六君子湯見第六

東垣朱砂安神丸。治心亂煩熱怔忡。心神顛倒。兀兀欲吐。胸中氣亂而熱。有似懊懣之狀。皆膈上血中伏熱。蒸蒸不安。宜用權法以鎮陰火之浮行。以養上焦之元氣。用甘草之甘溫補之。當歸生地。又為長生陰血之聖藥。黃連去心煩。除濕熱。硃砂納浮游之火而安神。明。

硃砂一錢 黃連一錢 甘草五分 生地黃

當歸頭錢各一

右為極細末。蒸餅為丸。如黃米大。每服十丸。津唾嚥下。

集驗龍腦安神丸。治男婦小兒五積癩癩。無問遠年近日。發作無時。但服此藥。無不痊愈。

龍腦研

麝香研

牛黃研各錢

犀角屑

茯苓去木

人參去蘆

麥門冬去心

硃砂水飛各

金箔三十片

馬牙硝二錢

甘草炙

地骨皮

桑白皮各一兩

右爲細末。煉蜜和丸如彈子大。金箔爲衣。如有風癰病歲久。冬月用溫水化下。夏月用涼水化下。不拘時候。如病二三年。日進三服。小兒一九分作二服。又治男婦虛勞發熱喘嗽。新汲水一盞化開服。喘滿痰嗽立止。又治男子婦人語澀舌強。食後溫涼水化下。日進三服。

仲景桂枝湯 傷寒論云。太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者。熱自發。陰弱者。汗自出。嗇嗇惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔者。桂枝湯主之。此仲景治中風第一方也。雖云取微汗。實則和榮衛而助中氣。其藥即建中湯小變。近醫以中風自汗。竟認桂芍爲斂汗之藥。冤哉。

桂枝

芍藥炒

生薑各三兩

甘草炙二兩

大棗擘二枚

煎服法。同前第十七桂枝附子湯。

仲景麻黃湯見第十六

和劑涼膈散 治大人小兒積熱。煩躁多渴。面熱唇焦。咽燥舌腫。喉閉目赤。鼻衄。頰頰結硬。口舌生瘡。謔語狂妄。腸胃燥澀。便溺閉結。睡臥不安。一切風壅。

梔子仁 連翹 薄荷 黃芩

甘草各半 大黃 芒硝各半

右為粗末。每一兩。水二盞。竹葉七片。煎至一盞。去滓。入蜜少許。食後服。加薑煎亦得。去六經熱。減大黃。芒硝。加桔梗。甘草。人參。防風。治肺經邪熱。咳嗽有痰。加半夏。涼膈與四物各半服。能益血洩熱。名雙和散。錢氏去連翹。加藿香。石膏。為瀉黃散。寶鑑連翹四兩。確黃各二兩。餘各一兩。

仲景黃連解毒湯見第十七

消腫湯 治馬刀瘡。

柴胡二錢 連翹三錢 當歸尾 甘草各一錢

生黃芩 紅花少許 黃連 黍粘子炒各一錢

佑賢曰
結核連
續者為
瘰癧生
項腋之

間形長
如蜺蛤
者為馬
刀生胸
脇之處

瓜蒌根

黃耆各一錢半

右件每服五錢。或一兩。水煎熱服。食後。

當歸飲子 治瘡疥風癬濕毒燥癢瘡。

當歸

白芍藥

川芎

生地黄

白蒺藜

防風

荊芥各一兩

何首烏

黃耆

甘草各五錢

右咬咀。每服一兩。水煎。或為末。每服一二錢亦得。

滑脈主病第二十一

滑脈主痰。或傷於食。下為畜血。上為吐逆。

痰乃水飲所結。薄則稠粘。老則硃礪。滑脈。滑澤近於水象。如數疾而替

替然。形相似也。不腐不化之食。象亦如之。皆有物之脈也。痰宜丹陳湯

和丸。潔古枳朮丸。在下則見於尺。主畜血者。血亦類液。瘀凝類痰。以其

在尺。故以血斷。宜仲景桃仁承氣丸之類。若見於寸。必主吐逆。蓋因滑脈之

流利滑動。勢不安定。切近上焦。自當爲吐。宜六君子湯仲景大半夏湯。然然而所吐之物。非痰即食。設無痰食。是爲嘔逆。則脈不應見滑。而又當見澁矣。

附方

二陳湯見第六

丹溪保和丸見第七

潔古枳朮丸見第七

麵藥枳朮丸 治強食所致。心胸滿悶不快。

神 麵炒 麥 藥炒 枳 實去蘊熱炒

白 朮炒二

右製服如枳朮丸法。

仲景桃核承氣湯 傷寒論云。太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下。下者愈。其外不解者。尙未可攻。當先解外。外解已。但少腹急結者。乃可攻之。宜桃核承氣湯。此下熱與血結成瘀之劑也。今用下瘀血於腸腹。

臨下者。皆效。

桃仁五十個去皮

桂枝二兩去皮

大黃四兩 芒硝二兩

甘草二兩

右五味。以水七升。煮取二升半。去滓。內芒硝。更上火。微沸下火。先食溫服五合。日三服。當微利。

準繩代抵當丸 行瘀血 自製

大黃川產如錦紋者去

芒硝一兩如欲糞以

桃仁研如泥六十枚

當歸尾 生地黃

穿山甲蛤粉炒三錢或

右為極細末。煉蜜丸如桐子大。若畜血在上焦。丸如芥子大。臨臥去枕仰臥。以津嚥之。令停留喉下。搜逐膈上。中焦食遠。下焦空心。俱桐子大。以百沸水煎湯下之。用歸地者。欲下血而不損血耳。且引諸藥至血分也。諸藥皆獷悍。而欲以和濟之也。如血老成積。此藥攻之不動。宜去歸地。加廣茂醋浸透。焙乾。一兩。肉桂七錢。

六君子湯

見第十六

仲景大半夏湯 治反胃嘔吐。

半夏洗二升 人參三兩 白蜜一升

以水一斗三升。和蜜揚之二百四十遍。煮藥取三升。溫服一升。餘分再服。

溫膽湯三因 治心膽虛怯。觸事易驚。或夢寐不祥。遂致心驚膽懾。氣鬱

生涎。涎與氣搏。變生諸證。或短氣悸乏。或復自汗。

半夏湯洗 枳實 竹茹各一兩 橘皮去白

甘草炙四錢 白茯苓七錢

每服四錢。水一盞半。生薑七片。棗一枚。煎七分。食前熱服。

東垣藿香安胃散 治脾胃虛弱。不進飲食。嘔吐不待腐熟。

藿香半錢 丁香 人參各二錢 橘紅五錢

右爲細末。每服二錢。水二盞。生薑三片。同煎至一盞。去滓涼服。食前。和滓服亦可。

脈為血
府之言
少血理
固然矣
若寒溼
之滯氣
分滯也
汗厥之
液氣虛
至於腸
結反胃
之澁不
惟血枯
井津液
亦枯矣

瀦脈主病第二十一

瀦脈少血。或中寒濕。反胃結腸。自汗厥逆。

靈樞決氣篇曰。中焦取汁。變化而赤。是謂血。壅遏營氣。令無所避。是謂脈。脈之與血。同質異名。是二而一。况體為陰液。多則滑利。少則枯澁。理勢之必然者。宜枯澁虛澁之類。少寒濕襲人。肌腠痺着。氣道不利。脈安得不澁。一滯澁之澁。宜和劑參溼湯之類。反胃。則朝食暮吐。暮食朝吐。或隨食隨吐。胃無餘液。以致腸中枯燥。而大便秘結。脈安得不澁。六君子湯宜鑑人參利膈丸。統旨滋血潤腸。湯滋陰清膈。飲之類。自汗者。汗時時自出也。出則液耗。是謂脫液。漏而不止。衛氣散失。四肢厥寒。是謂亡陽。陽亡腋脫。脈又安得不澁。虛者附湯。宜十全大補湯。濟生一澁脈也。而有虛澁。滯澁。枯澁之分。是又在診之者。自為靈通耳。

附方

四物湯 治肝脾腎血虛發熱。或寒熱往來。或日晡熱甚。頭目不清。或煩

躁不寐。胸膈作脹。脇肋疼痛等症。凡血虛諸病。以此爲主治。若脾氣虛而不能生血。宜四君子。若脾氣鬱而血虛。宜歸脾湯。若腎水涸而不生肝血。宜六味丸。

當歸二錢

白芍藥一錢

熟地黃三錢

川芎錢半

右水煎服。

和劑滲濕湯見第七

百一除濕湯 治寒濕所傷。身體重着。腰脚酸疼。大便溏泄。小便或澁或利。

半夏炒

厚朴薑製

蒼朮

朮米泔製各二兩藿香葉

陳皮去白

白茯苓去皮各一兩

甘草

草錢七

白朮生用一兩

右咬咀。每服四錢。水一盞。薑七片。棗一枚。煎七分。食前溫服。

三因腎着湯 治腎虛傷濕。身重腰冷。如坐水中。不渴。小便自利。

乾薑炮

茯苓各四兩

甘草

草炙

白朮各二兩

每服四錢。水一盞。煎七分。空心溫服。

六君子湯見第六

寶鑑人參利膈丸

治胸中不利。大便結燥。痰嗽喘滿。脾胃壅滯。推陳致

新。治膈氣之聖藥也。

木香

檳榔錢各半七

人參

當歸酒洗

藿香

甘草

枳實各一兩

黃芩酒洗

厚朴薑製各二兩

右為細末。滴水為丸。如桐子大。每服三五十丸。食後諸飲下。

統旨滋血潤腸湯

治血枯及死血在膈。飲食不下。大便燥結。

當歸酒洗三錢

芍藥炒

生地黄錢各半

紅花酒洗

桃仁去皮尖炒

大黃酒煨

枳殼錢各

水一鍾半。煎七分。入韭菜汁半酒盞。食前服。

滋陰清膈飲統旨

治陰火上衝。或胃火太盛。食不入脈洪數者。

當歸

芍藥炒

黃蘗鹽水炒

黃連錢各半

黃芩

山梔

生地黄

甘草三分

水二鍾。煎七分。入童便、竹瀝各半酒盞。食前服。

十全大補湯

見第六

濟生耆附湯 治氣虛陽弱。虛汗不止。肢體倦怠。

黃耆

去蘆

附子

炮去皮臍各等分

右㕮咀。每服四錢。水一盞。生薑十片。煎八分。食前溫服。未應。更加之。

黃耆建中湯

治血氣不足。體常自汗。

黃耆

桂錢各半

白芍藥三錢

甘草一錢

每服五錢。水一鍾半。薑五片。棗二枚。煎八分。去滓。入稠餚一大匙。再煎服。舊有微瀉或嘔者。不用餚。

弦脈主病第二十二

弦脈主飲。病屬膽肝。弦數多熱。弦遲多寒。浮弦支飲。沉弦懸痛。陽弦頭痛。陰弦腹痛。

夫飲入於胃。必陽氣爲之遊溢。輸布。藏府受其灌溉。形體賴其濡滋。若

陽運之力薄。則不能遊溢輪布。停留於中。而飲之諸證起矣。其脈弦者。弦為陰脈。飲束急直。無抑揚鼓動之勢。正陽運之不足也。若非有飲而見弦脈。病又當在膽與肝耳。蓋膽為甲木。肝為乙木。自北而東。在肝為厥陰。而陰盡。在膽為少陽。而陽微。初春之象。逗氣尚少。升如一縷。有弦義焉。數則為熱。弦而兼數者。病亦兼熱。遲則為寒。弦而兼遲者。病亦兼寒。弦則為飲。弦而浮。則飲停在上。名曰支飲。支者。支分之義。不在胃而支留於心胸間也。宜仲景苓桂朮甘湯小青龙湯和劑倍朮丸破弦而飲丸六君子湯仲景澤瀉湯海藏五飲湯之類弦而沉。則飲停在下。當為懸痛。懸者。懸閣之義。不在胃而懸留於腹脇間也。以寒飲而留於陰分。故在內痛。宜濟生八神來復丹弦脈不但主飲。而又主痛者。以弦寒飲束。氣不舒之故耳。陽弦者。寸弦也。邪在三陽。三陽走頭。故頭痛。宜玄珠茶調散半夏白朮天陰弦者。尺弦也。邪在三陰。三陰走腹。故腹痛。宜仲景小建中湯香砂理中湯東垣厚朴湯仲景四逆湯之類

附方

仲景苓桂朮甘湯見第十六

小青龍湯見第六

和劑倍朮丸 治五飲。一曰留飲。停水在心下。二曰澀飲。水在兩脇。三曰痰飲。水在胃中。四曰溢飲。水溢在膈。五曰流飲。水在脇間。瀝瀝有聲。皆由飲水過多。或飲冷酒所致。

白朮二兩 桂心 乾薑各一

右爲末。蜜丸。每二十丸。溫米飲下。加至三十丸。食前服。

破飲丸 治五飲停蓄胸膈。呼吸之間。痛引兩脇。脹滿氣促。胸腹結爲癥癖。支滿胸膈。旁及兩脇。搶心疼痛。飲食不下。反胃吐逆。九種心疼。積年宿食不消。久瘧久痢。遁尸疰忤。顛癇厥運。心氣不足。憂愁思慮。婦人腹中諸病。並皆治之。

葶藶

丁香

香火不見

縮砂仁

蠟梢

胡椒

木香

香火不見

烏梅肉

青皮

巴豆

去皮膜各等分

右將青皮巴豆。以漿水同浸一宿。次日濾出同炒。青皮焦。去巴豆。水淹

烏梅肉蒸一炊久。細研爲膏。入藥末和勻。丸如綠豆大。每服五七丸。臨睡生薑湯下。

仲景六君子湯見第六

仲景澤瀉湯 治飲停心下。常苦眩冒。或胸中痞結。堅大如盤。下則小便不利。

澤瀉五兩 白朮二兩

水二升。煮一升。分溫再服。

海藏五飲湯 治五飲最效。

旋覆花 人參 陳皮去白 枳實

白朮 茯苓 厚朴製 半夏製

澤瀉 豬苓 前胡 桂心

白芍藥 炙甘草各等分

右每一兩分四服。薑十片。水二錢。煎至七分。去滓溫服。無時。因酒成飲。加葛根、葛花、砂仁。

濟生八神來復丹 治寒痰冷飲。久積心胸。或嘔逆喘促。或心腹攪疼。或

飲食不安。狀如反胃等證。

硝石一兩同硫黃為末。磁器內以微火炒。用柳篋攪。不可火太過。恐傷藥力。再研極細。名二氣末。

太陰玄精石飛研一兩

五靈脂砂水澄清。曬乾去

青皮去白 陳皮去白各二兩 舶上硫黃透明沉 香

木香堅實者 天南星粉白者各一兩

右為末。飛麵糊為丸。如桐子大。每服三十丸。空心米飲送下。

三因控涎丹 凡人忽患胸背手足頸項腰胯等。隱痛難忍。筋骨牽引釣痛。時時走易不定。乃是痰涎在心膈上下。變為此疾。或手足冷痺。氣脈不通。誤認癰瘻也。

甘遂去心 紫大戟去皮 真白芥子各等分

右為末。糊為丸。桐子大。曬乾。食後臥。淡薑湯。或熱水下五七丸。至十丸。痰猛加數丸。

玄珠茶調散 治風熱上攻頭目。及頭風熱痛不可忍。

片 芩 二兩 酒拌炒三

小川芎 一兩

細茶葉 三錢

白 芷 五錢 薄荷 三錢 荊芥穗 四錢

頭顱及腦痛。加細辛、藁本、蔓荊子各三錢。

右爲細末。每服二三錢。用茶清調下。

秘藏半夏白朮天麻湯。治素有脾胃之證。時顯煩躁。大便秘利。又出入爲寒氣所鬱。悶亂大作。火鬱不伸。故也。醫疑有熱。服疎風丸下之。原證不減。復添嘔逆。食不能停。痰唾稠粘。湧出不止。眼澁頭旋。惡心煩悶。氣短促上喘。無氣力。目不敢開。如在風雲中。頭苦痛如裂。身重如山。四肢厥冷。是胃氣已損。復下兩次。重虛脾胃。病名曰痰厥。頭痛厥者。痰之濁氣逆上。滑溜清陽。故旋暈。非有痰厥逆而上也。

半 夏 一錢 白 朮 炒 麴 各一 天 麻

黃 耆 人 參 蒼 朮 陳 皮

澤 瀉 扶 苓 各五 大麥麵 半一錢 乾 薑 三分

黃 藥 二分

仲景吳茱萸湯。傷寒論云。食穀欲嘔者。屬陽明也。吳茱萸湯主之。金匱云。嘔而胸滿者。茱萸湯主之。又云。乾嘔吐涎沫。頭痛。茱萸湯主之。觀此則凡胃虛寒不能納食。或吐冷飲酸水者。皆效。

吳茱萸洗一升

人參三兩

生薑六兩

大棗十二枚

右四味。以水七升。煮取二升。去滓溫服七合。日三服。

仲景小建中湯

加黃耆一兩半。人參二兩。名黃耆建中湯。

金匱要略云。虛勞裏急。悸衄。腹中

痛。失精。四肢酸疼。手足煩熱。咽乾口燥。小建中湯主之。又千金療男女因積冷氣滯。或大病後不復常。苦四肢沉重。骨肉酸疼。吸吸少氣。行動喘乏。胸滿氣急。腰背強痛。心中虛悸。咽乾唇燥。面體少色。或飲食無味。脇肋腹脹。頭重不舉。多臥少起。甚者積年。輕者百日。漸致瘦弱。五藏氣竭。則難可復常。六脈俱不足。虛寒乏氣。少腹拘急。羸瘦百病。黃耆建中湯主之。

桂枝三兩

甘草炙二兩

大棗十二枚

芍藥六兩

生薑三兩

膠飴一升

右六味。以水七升。煮取三升。去滓。內飴。更上微火消解。溫服一升。日三服。嘔家不可用建中湯。以甜故也。

香砂理中湯

即理中圓加木香砂仁服法亦同見第十七

治脾虛氣滯。或受外寒。泄瀉腹痛。

喜溫。或嘔吐。胸膈滿悶。腸腹雷鳴等證。

東垣厚朴湯

治胸腹脹痛。或腸鳴後重。或受寒及寒飲食作痛。脈沉遲。

而弦者宜之。

厚朴薑製

陳皮去白各

甘草炙

乾薑各五錢

茯苓去皮

右咬咀。每服一兩。水煎服。

仲景四逆湯

治中外皆寒。四肢逆冷。腹痛腸鳴。或汗多亡陽。或中寒瀉。

利清穀。舌滑氣冷。一切陰寒勝而陽虛。脈沉遲弦弱者。此方主之。

甘草炙

乾薑半兩

附子一枚生用去

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。強人大附子一枚。乾薑三兩。

緊脈主病第二十三

緊脈主寒。又主諸痛。浮緊表寒。沉緊裏痛。

緊與弦相似。但多裏動。天矯之勢。所謂如轉索者是也。陽爲寒束。崛強不平。故作是狀。爲諸病者。亦此義耳。浮以候表。浮而緊。寒在表也。宜溫沉以候裏。沉而緊。寒在裏也。宜溫裏爲陰分。以陰寒而襲陰分。陽困陰凝。故痛也。

長短細大主病第二十四

長脈氣平。短脈氣病。細則氣少。大則病進。

長脈氣暢。故曰平。短脈氣促。故曰病。細爲正不足。故氣少也。大爲邪有餘。故病進也。

浮沉主病第二十五

浮長風癰。沉短宿食。血虛脈虛。氣實脈實。

長類乎弦。亦肝木之象也。素問玉機真藏論曰。肝脈端直以長是也。浮則爲風。風木偏勝。癰證作矣。宜角丸。疎風豁痰。養榮如河間犀角丸。沉而短爲中氣局促。宿食停留之礙也。宜應龍紅丸。子之和劑。脈爲血府。脈虛者血虛。脈由氣行。氣實者脈實。

附方

河間犀角丸 治風癰癰。發作有時。揚手擲足。口吐痰涎。不省人事。暗倒屈伸。

犀角末半兩

赤石脂三兩

朴硝二兩

白殭蠶一兩

薄荷葉一兩

右爲末。麵糊丸。如梧子大。每服二三十丸。溫水下二三服。不拘時。如覺痰多。卽減數。忌油膩炙炒。

集驗龍腦安神丸

見第九

和劑感應丸 治中虛積冷。氣弱有傷。停積胃脘。不能傳化。或因氣傷冷。

或因饑飽食。飲酒過多。心下堅滿。兩脇脹痛。心腹大痛。霍亂吐瀉。大便頻數。後重遲澁。久痢赤白。膿血相雜。米穀不化。愈而復發。又治中酒嘔吐。痰逆惡心。喜睡頭旋。胸膈痞滿。四肢倦怠。不思飲食。不拘新舊冷積。並皆治之。

南木香

肉豆蔻

丁香

香

乾

薑

巴豆

七十粒去油

杏仁

一百粒去油

百草霜

二兩

右前四味爲末。外入百草霜研。與巴豆、杏仁七味同和勻。用好黃蠟六兩溶化成汁。以重絹濾去滓。更以好酒一升於銀石器內煮蠟數沸。傾出候酒冷。其蠟自浮於上。取蠟秤用丸。春夏修合。用清油一兩。銚內熬令香熟。次下酒煮蠟四兩同化成汁。就銚內乘熱拌和前項藥末。秋冬修合。用清油一兩半同煎煮熟成汁。和前藥末成劑。分作小錠。油紙裹放。旋丸服之。每三十丸。空心薑湯下。和劑紅丸子。壯脾胃。消宿食。去膨脹。

京三稜片

蓬莪朮煨

青皮去白

陳皮五斤各

乾薑炮

胡椒各三斤

右爲末。用醋麵糊丸。如梧桐子大。礬紅爲衣。每服三十丸。食後薑湯送下。小兒臨時加減與服。

洪細主病第二十六

洪脈爲熱。其陰則虛。細脈爲濕。其血則虛。

洪脈滿指。浮大兼備。陽有餘之象。故當爲熱。有餘於陽。則不足於陰。故爲陰虛。細爲陰脈。細藐不振。陰濕之候。細又爲血虛者。蓋脈以血爲體。細藐之甚。體於何有。故血虛。

緩類主病第二十七

緩大者風。緩細者濕。緩澁血少。緩滑內熱。

空疎緩大。風所致也。緩漫濡細。濕所侵也。緩而瀋滯。血必少也。緩而滑

疾。內有熱也。

濡弱小主病第二十八

濡小陰虛。弱小陽竭。陽竭惡寒。陰虛發熱。

濡小之脈。即所謂如帛浮水面。有上無下。陰虛之候也。弱小之脈。體不充。勢不鼓。陽竭之候也。陽竭則陰乘陽。故惡寒。陰虛則陽乘陰。故發熱。
陽竭者補陰宜六味丸四君者附之類
陰竭者補陽宜四君者附之類

附方

四君子湯 見第十六

六味丸 見第十六

四物湯 見第二十一

微脈主病第二十九

陽微惡寒。陰微發熱。男微虛損。女微瀉血。

濡為血
虛故屬
陰弱乃
氣弱故
屬陽一
在脈勢
體一在
在脈

脈經云。微脈不勝尋按。若有若無。言其虛極也。寸微爲陽微。陽微卽陽虛。而陰氣上入陽中。故惡寒也。尺微爲陰微。陰微卽陰虛。而陽氣下陷入陰中。故發熱也。男人得此。不惟惡寒發熱。而且爲虛損。女人得此。不惟惡寒發熱。而且爲瀉血。虛損者。未必不補其陽。女子補其陰。

動脈主病第三十

陽動汗出。陰動發熱。爲痛與驚。崩中失血。

傷寒論曰。陰陽相搏。名曰動。又曰。數脈見於關上。上下無頭尾。如豆大。厥厥動搖者。名曰動。旣云在關。是居尺寸之中。若不能分陰分陽者。然云陰陽相搏。又云陽動陰動。又似乎有勝有負。故陽虛者。爲陽動。陽負。負則外衛不密。而汗自出矣。陰虛者。爲陰動。陰負。負則內守不寧。而熱自發矣。爲痛爲驚者。陰陽不和。氣搏擊則痛。氣攢迸則驚。味厥厥動搖四字。情形宛然。陰陽相搏不和。則衛守兩失其職。而崩中失血之證。有自來矣。陽衛陰守

革脈主病第三十一

虛寒相搏。其名爲革。男子失精。女子失血。

傷寒論辨脈法云。脈弦而大。弦則爲減。大則爲芤。減則爲寒。芤則爲虛。

虛寒相搏。此名爲革。婦人則半產漏下。宜補男子則亡血失精。宜填此

節正革脈之註脚也。蓋革如皮革。急滿指下。今云脈弦而大。非革而何。

只此四字。可以盡革脈之形狀矣。弦則爲減以下。又發明所以爲革。并

革之所以爲病也。弦則脈體弦急細斂。是陽氣之減少也。弦而大。是改

細斂爲闊大。其弦急之體仍在。弦急爲陽減。改大則中芤。陽減爲寒。中

芤爲虛。既虛且寒。徒革於外。而中則空。在女則爲半產漏下。在男則爲

亡血失精。是皆中空之驗。

醫燈續焰

明 錢塘 王 紹 隆 著

明 錢塘 潘 楫 碩 甫 註

明 錢塘 王 佑 賢 聖 翼 評

鄞縣 曹 赤 電 炳 章 校

卷四

促結主病第三十二

陽盛則促。肺癰陽毒。陰盛則結。疝瘕積鬱。

數脈時見一止。名曰促。數則為熱。為陽盛。主上焦熱聚成毒。或熱聚肺

成癰。之陽毒宜清散。如黃芩花柳粉連翹枳殼荊防。脈氣流行。為其阻礙。故

一止也。不數而緩。時見一止。名曰結。為陰盛。主陰分或腹中聚疝瘕瘕。

宜元戎萬病紫苑丸。實久積成鬱。氣堅結不散。脈氣至此。亦為所礙。故

一止也。難經十八難曰。結甚則積甚。結微則積微。是又當審止歇之多

榮行脈中。衛行脈外。道不同。雖此相。彼今脈。將則知。數則知。為陽盛。矣時一。

止者榮
不將衛
故促脈
起則知
為陰盛
矣時一
止者衛
不將榮
故促脈

附方

仲景桔梗湯

金匱要略云。欬而胸滿。振寒脈數。咽乾不渴。時出濁唾腥

臭。久久吐膿如米粥者。為肺癰。又治心藏發咳。咳而喉中如梗狀。甚則咽腫喉痺。亦治血痺。

桔梗一兩 甘草二兩

右二味。以水三升。煮取一升。分溫再服。則吐膿血也。

元戎萬病紫苑丸 治臍腹久患疰癖如碗大。及諸黃病。每地氣起時。上

氣衝心。繞臍絞痛。一切蟲咬。十種水病。十種蟲病。及反胃吐食。嘔逆惡

心。飲食不消。天行時病。女人多年月露不通。或腹如懷孕多血。天陰即

發。又治十二種風。頑痺不知年歲。晝夜不安。夢與鬼交。頭多白屑。或哭

或笑。如鬼魅所著。腹中生瘡。腹痛服之皆效。

紫苑去苗

菖蒲

蒲九節者

吳茱萸次焙乾柴

胡去鬚

厚朴一兩

桔梗

梗去蘆

茯苓去皮

皂

莢子去皮弦

*佑賢曰 此方治肺癰如神但桔梗須北產味苦井多去蘆頭為妙

止者榮 不將衛 故促脈 起則知 為陰盛 矣時一 止者衛 不將榮 故促脈 亦此結 之義此 効象形 容於此 更覺顯 然

桂枝

乾薑

黃連去錢

巴豆去皮膜

人參去蘆

羌活

獨活

防風各半

蜀椒去目及閉口

川烏炮去皮臍半

右爲細末。入巴豆研勻。煉蜜丸如桐子大。每服三丸。漸加至五丸七丸。

生薑湯送下。食後臨臥服。孕者不宜服。此方分兩一依元板善本校定

川烏二兩乃云半兩加三錢不知何謂重考經白丸方惟之

痔漏腸風。酒下。赤白痢。訶子湯下。膿血痢。米飲湯下。墮傷血悶。

四肢不收。酒下。蛔蟲咬心。檳榔湯下。氣噎憂噎。荷葉湯下。打撲

損傷。酒下。中毒。蓼灰甘草湯下。一切風。升麻湯下。寸白蟲。檳榔

湯下。霍亂。乾薑湯下。咳嗽。杏仁湯下。腰腎痛。豆淋酒下。陰毒

傷寒。溫酒下。吐逆。生薑湯下。飲食氣塊。麵湯下。時氣。井花水下。

脾風。陳皮湯下。頭痛。水下。心痛。溫酒下。大小便不通。燈草湯

下。因物所傷。以本物湯下。吐水。梨湯下。氣病。乾薑湯下。小兒

天弔風。搐。防風湯下。防己亦可。小兒疳痢。葱白湯下。小兒乳食傷。

白湯下。月信不通。紅花酒下。婦人腹痛。川芎酒下。懷孕半年後
胎漏。艾湯下。有子氣衝心。酒下。產暈痛。溫酒下。血氣痛。當歸酒
下。產後心腹脹滿。豆淋酒下。難產。益智湯下。產後血痢。當歸湯
下。赤白帶下。酒煎艾湯下。解內外傷寒。粥飲下。室女血氣不通。
酒下。子死腹中。葵子湯下。又治小兒驚癇。大人顛狂。一切風。及無
孕婦人。身上頑麻。狀如蟲行。四肢俱腫。呻吟走痛等疾。楊駙馬患風
氣衝心。飲食吐逆。遍身枯瘦。日服五丸。至七丸。至二十日。瀉出肉塊如
蝦蟆五六枚。白膿二升愈。趙侍郎先食後吐。目無所見。耳無所聞。服
至五十日。瀉青蛇五七條。長四寸許。惡膿三升愈。王氏患大風病。眉
髮墮落。手掌生瘡。服之半月。瀉出癩蟲二升。如馬尾。長寸許。後愈。李
靈患肥氣。日服五丸。經一月。瀉出肉鼈三枚愈。茹黃門。卒中風。病發
時服藥。瀉出惡膿四升。赤黃水一升。一肉蟲如亂髮愈。李知府妻楊
氏。帶下病七年。月崩不止。骨痿着床。日服五丸。至十丸。十五丸。取下膿
血五升。黃水一升。肉塊如雞子狀愈。此藥治一切萬病如神。唯初有孕

內有所礙之結
促與氣
衰之代
脈乃虛
實生大
之分
要着意

者不宜服。

寶鑑沈香桂附丸 治中氣虛弱甚。脾胃虛寒。藏府積冷。心腹疼痛。手足

厥逆冷。便利無度。七疝引痛不可忍。喜熱熨少緩者。

沉香

附子炮

川烏炮

乾薑炮

良薑

官桂

吳茱萸湯炮去苦水

茴香炒各

右末。好醋煮糊丸。梧子大。每服五十丸至七八十丸。空心米飲下。

代脈主病第二十三

代則氣衰。或泄膿血。傷寒心悸。女胎三月。

代亦歇止之脈。但促結之止。內有所礙。雖止而不全斷。中有還意。代則

大止不還。下復至。如更代者。非元氣衰微之甚。不至此也。泄膿血者。則

榮血耗竭。隧道空虛。故見此欲脫不續之狀。素問脈要精微論云數動

及便膿血傷寒心悸。有中氣虛者。有汗下後者。中氣虛。則陽陷。陽

受氣於胸中。陽氣陷。則不能上充於胸中。故悸。宜黃耆建停飲者。飲水

悸者心氣不甯而動也
余每見半產者多在三月
按三月心五月脾七月肺蓋婦人於此三經不調者多至期當養不養則胎孕為之不而墮今按月依經視其氣血虛

多而停於心下也。水停心下。水氣上凌。心不自安。故悸。宜小龍汗後則裏虛矣。况汗乃心液。心液耗則心虛。心虛故悸。宜炙甘草湯之類諸悸者未必皆脈代。今脈代者正指汗後之悸。以汗為心液。脈為心之合耳。女胎十月而產。府藏各輸真氣。資次培養。一月之時。足厥陰脈養之。足厥陰者。肝也。二月。足少陽脈養之。足少陽者。膽也。三月。手厥陰脈養之。手厥陰者。心包絡也。四月。手少陽脈養之。手少陽者。三焦也。五月。足太陰脈養之。足太陰者。脾也。六月。足陽明脈養之。足陽明者。胃也。七月。手太陰脈養之。手太陰者。肺也。八月。手陽明脈養之。手陽明者。大腸也。九月。足少陰脈養之。足少陰者。腎也。十月。足太陽脈養之。足太陽者。膀胱也。是以諸經脈各養三十日也。若至期當養之經。虛實不調。則胎孕為之不安。甚則下血而墮矣。十二經中。獨心與小腸不養胎者何歟。夫心為牡藏。小腸為之府。主生血而合脈。素問平人氣象論曰。藏真通於心。心藏血脈之氣也。有孕則經血不通。許學士所謂妊娠閉經。遂以養胎者是也。平人氣象論又曰。婦人手少陰脈動甚者。姙子也。歷觀經論。是

實而調之自能保全足月其或外感內傷等症各宜按法調治
 確論
 輯曰心主脈其液汗心後心虛故心悸而脈歇麥冬生液本經主胃絡脈絕生地養血本經主折跌絕筋皆續

知胎以血為體。而始^{*}終十月。皆賴乎心。自不當在輪養中又分次第矣。三月之時。心胞絡養胎。靈樞經脈篇云。心包主脈。若分氣及胎。脈必虛代。在五藏生成篇又云。心合脈。蓋心與心胞。雖分二經。原屬一藏故耳。

附方

黃耆建中湯^{見第二}

仲景小青龍湯^{見第六}

仲景炙甘草湯 傷寒論云。傷寒脈結代。心動悸。炙甘草湯主之。

甘草^{炙四兩}

生薑^{切三兩}

桂枝^{去皮三兩}

人參^{二兩}

生地黄^{一斤}

阿膠^{二兩}

麥門冬^{半升}

麻子仁^{半升}

大棗^{擘十枚}

右九味。以清酒七升。水八升。先煮八味。取三升。去滓。內膠烱消盡。溫服一升。日三服。一名復脈湯。聖濟經曰。津耗散為枯。五藏痿弱。榮衛涸流。濕劑所以潤之。麻仁阿膠麥門冬地黃之甘。潤經益血。復脈通心也。

脈病順逆第二十四

絕聖藥 阿膠乃 驢皮濟 水煮成 經水篇 云心合 濟水五 藏生成 篇云肺 合皮毛 所謂毛 脈合精 而成寸 者不巧 似乎况 人參補 藏真而 生脈大 棗脾果 甘草脾 藥為胃 行津液 而通脈 生薑溫 中而出

脈之主病。有宜不宜。陰陽順逆。吉凶可推。
*有是病。則有是脈。如影之隨形也。與病相宜則順。不相宜則逆。逆之與順。何從區別。是又在陰陽耳。如表病見表脈。裏病見裏脈。實病見實脈。虛病見虛脈。陽病見陽脈。陰病見陰脈之類。皆順而相宜者也。反此則逆。逆順一分。而病之吉凶。從可推矣。

中風脈證第三十五

中風浮緩。急實則忌。浮滑中痰。沉遲中氣。尸厥沉滑。卒不知人。入藏身冷。入府身溫。

*風性空疎。中之於表。浮緩是其宜也。仲景千金小續命湯輕則急強而實。略無柔和。邪氣太甚。正氣何堪。故忌。若浮而滑。帶有物象。非浮緩比。此則中痰之如中風者。宜二陳湯防風竹瀝若沉而遲。則不在表而在裏。亦非中風。名曰中氣。七情之所為也。宜和劑四七湯易簡星尸厥亦類中風。卒然僵仆。昏不知人。其脈沉滑者。沉為裏。滑為邪。邪入於裏。與血

脈桂枝
行臂而
達脈麻
仁潤燥
而利脈
一名復
脈湯不
虛矣

*又人病
脈不病
曰生脈
病人不
病曰死
故曰脈
者元氣
也

*中風一
證與風
寒暑濕
之風不
同乃仲
景所謂

氣相并。邪入正虛。搏入藏府。入藏則邪干神舍。氣陷從陰。故身冷。藏不
受邪。僅入於府。氣出從陽。故身溫。即金匱要略所謂唇口青。身冷。為入
藏即死。如身和汗自出。為入府即愈者是也。宜蘇合香丸。仲景備急丸。
之類并萬氏
灸百會法

附方

金匱千金小續命湯 通治八風五痺痿厥等疾。以一歲為總。六經為別。
春夏加石膏、知母、黃芩。秋冬加官桂、附子、芍藥。又於六經別藥內隨證
細分加減。自古名醫不能越此。

麻黃去節 人參去蘆 黃芩去腐 芍藥

甘草 川芎 杏仁去尖炒 防風兩半

防己 官桂各一 附子炮半兩

右除附子、杏仁外。為麤末。後入二味和勻。每服五錢。水一盞半。生薑五
片。煎至一盞。去滓。稍熱食前服。

附雲岐子加減法

衛緩則為中風者是由也皆由元陽虧損以致衛氣懈緩而為入邪卒之邪入吾身故名曰中其入有經絡府藏左右淺深之不同治宜培元鼓衛乃為善法非若風寒汗吐下攻邪之比也

如精神恍惚。加茯苓、遠志。心煩多熱者。加犀角屑半兩。骨節間煩痛有熱者。去附子。倍芍藥。骨節冷痛。倍用桂枝。附子。燥悶小便澀者。去附子。倍芍藥。入竹瀝一合煎。藏寒下痢者。去防己。黃芩倍附子。加白朮一兩。熱痢不可用附子。脚弱。加牛膝、石斛各一兩。身疼痛。加秦艽一兩。腰痛。加桃仁、杜仲各半兩。失音。加杏仁一兩。如或歌或笑。無所不至者。用麻黃三兩。人參、桂枝、白朮各二兩。去附子。防風、生薑。加當歸一兩。自汗者。去麻黃。杏仁加白朮一兩。春加麻黃一兩。夏加黃芩七錢。秋加當歸四兩。冬加附子半兩。

仲景桂枝湯見第九

二陳湯見第六

和劑四七湯見第七

易簡星香湯 治中風痰盛。服熱藥不得者。

南星八錢 木香一錢

每服四錢。水一盞。薑十片。煎七分。不拘時溫服。

蘇合香丸見第十八

仲景三物備急丸

大黃一兩

乾薑一兩

巴豆

一兩外研如脂

右藥各須精新。先搗大黃、乾薑爲末。研巴豆內末中。合搗一千杵。用爲散。蜜和丸亦佳。密器中貯之。莫令泄。主心腹諸卒暴百病。苦中惡客忤。心腹脹滿。卒痛如錐刺。氣急口噤。停尸卒死。以煖水若酒服大豆許三四丸。或不下。捧頭起灌。令下咽。須臾當差。如未差。更與三丸。當腹中鳴。卽吐下便差。若口噤。亦須折齒灌之。

本事勝金丸 治中風忽然昏倒若醉。形體昏悶。四肢不收。風涎潮於上膈。氣閉不通。

生薄荷半兩

猪牙皂角二兩槌碎。水一升。浸取汁。研成膏。

瓜蒂末一兩

藜蘆二兩

硃砂半兩

右將硃砂末二分。與二味末研勻。用膏子搜和。丸如龍眼大。以硃砂爲衣。溫酒化下一丸。甚者二丸。以吐爲度。得吐卽醒。不醒不可治。必用方

此治風痰壅盛而湯藥難進者暫用開關則可

佑賢曰 奄忽氣 絕心失 神明經 所謂主 不明則 十二官 危使道 閉塞而 不通者 也救之 法張火 用為急 杏為心 果利氣 麻黃心 藥發汗 皆自內 達表臣 以桂心

論中風無吐法。引金虎碧霞為戒。且如卒暴誕生。聲如引踞。牙關緊急。氣閉不行。湯藥不能入。命在須臾者。執以無吐法可乎。但不當用銀粉藥。恐損脾。壞人四肢爾。羅甫方有粉

千金返魂湯 治卒感忤。鬼擊飛尸。諸奄忽氣絕。無復覺。或已死。絞口。口噤不開。去齒下湯。湯入口不下者。分病人髮。左右捉踏肩引之。藥下復增取盡一升。須臾立醒。

麻黃三兩 桂心二兩 甘草一兩 杏仁七十

右㕮咀。水八升。煮取三升。分三服。肘後方云張仲景方無桂心只三味

灸法

灸風池、百會、曲池、合谷、風市、絕骨、環跳、肩髃、三里等穴。皆灸之以鑿竅疎風。

風寒脈證第三十六

風傷於衛。浮緩有汗。寒傷於榮。浮緊無汗。

利關節 佐以甘 草助子 氣火壯 陰消氣 通竅豁 邪當退 舍*風性 疎令衛 散懈故 有汗寒 性淒滄 令榮斂 束故無 汗 暑傷元 氣濕流 關節性 使然也

風為陽邪。衛為陽氣。風陽空疎。衛陽浮越。寒為陰邪。營為陰血。寒陰斂束。血陰凝泣。故風必傷衛。寒必傷營者。皆類同而象似也。空疎浮越。自當有汗而脈緩矣。仲景桂枝湯證。斂束凝泣。自當無汗而脈緊矣。仲景麻黃湯證。

附方

仲景桂枝湯

見第九

仲景麻黃湯

見第十六

暑濕脈證第三十七

暑傷於氣。脈虛身熱。濕傷於血。脈緩細澁。

暑亦陽邪。性熱而散。傷於氣分。從其類耳。陽邪傷氣。氣必煩蒸。故身熱。氣散不斂。故脈虛。宜清暑益氣湯加濕為水濕。血液相近。傷血亦從其類。脈緩細澁。流行滲着之象也。宜敗毒散和劑

附方

清暑益氣湯

見第十六

十味香薷飲見第六

敗毒散活人

羌活

獨活

前胡

柴胡

芎藭

枳殼

白茯苓

桔梗

人參

已上各

甘草半兩

佑賢曰
風寒溫
疫為害
最毒此
方能使
毒氣敗
去故耳

右為細末。每服二錢。水一盞。入生薑二片。煎七分。溫服。或沸湯點亦得。

治傷寒溫疫。風溼風眩。拘蹇。風痰頭疼目眩。四肢痛。增寒壯熱。項強睛

疼。及老人小兒皆可服。或瘴煙之地。或瘟疫時行。或胸多風痰。或處卑

濕脚弱。此藥不可缺也。日二三服。以知為度。煩熱口乾。加黃芩。

和劑五積散 治感冒寒邪。頭疼身痛。項背拘急。惡寒嘔吐。或腹痛。又治

傷寒發熱。頭疼惡風。無問內傷生冷。外感風寒。及寒濕客於經絡。腰脚

痠疼。及婦人經血不調。或難產並治。

白芷

茯苓

半夏

湯洗

當歸

芎藭

甘草

肉桂

芍藥

各三

此種係熱病涉經乃傷寒之類非冬時正傷寒之病氣化者比汗法雖

枳殼去麩炒 麻黃去節 陳皮去白各 桔梗去蘆十
厚朴去粗皮 乾薑各四兩 蒼朮去皮
右咬咀。每服四錢。水一盞。薑三片。葱白三根。煎七分。熱服。冒寒用煨薑。
挾氣加茱萸。婦人調經催產加艾醋。

傷寒脈證第三十八

傷寒熱病。脈喜浮洪。沉微瀦小。證反必凶。汗後脈靜。身涼則安。汗後脈躁。熱甚必難。陽病見陰。病必危殆。陰病見陽。雖困無害。上不至關。陰氣已絕。下不至關。陽氣已竭。代脈止歇。藏絕傾危。散脈無根。形損難醫。

素問熱論曰。今夫熱病者。皆傷寒之類也。又曰。人之傷於寒也。則為病熱。熱雖甚不死。觀此。則知傷寒雖是陰寒之邪。襲人生氣中。正氣與之抗拒。鬱蒸成熱。亦理勢之必然者。抗拒在表。故脈浮。鬱蒸成熱。故脈洪。熱病得此陽脈。知正氣不陷縮。而能鼓發。勝邪必矣。故喜焉。若沉微瀦小。是皆陰類。證陽脈陰。表病見裏。證與脈反。邪盛正衰。凶之兆也。至若

同用藥
大異熟
讀全文
自得之

義暢

關前一
分人命
之主合
此參看
自是了
然
脈者元
氣也元
氣則生

汗後邪解正復。此時脈躁盛者。亦應寧靜。身體自然涼和。設脈仍躁而熱加甚。是正氣已衰。邪氣更進。必難乎其為生矣。即素問評熱論所謂有病溫者。汗出輒復熱。而脈躁疾。不為汗衰。狂言不能食。病名陰陽交者是也。為一派陽邪陰不能復若與陽交并陽病見陰者。見陰脈也。即上文所云熱病而得沉微澁小之類。言證與脈反。故亦危殆。陰病見陽者。見陽脈也。亦似與證相反。惟傷寒則不然。傷寒自表入裏。從陽之陰。刻刻侵傳。層層漸入。今陰病得陽脈。是轉寒凜而變溫和。起深沈而出浮淺。死陰忽作生陽。病雖困篤。自當無害。故仲景云。陰病見陽脈者。生。陽病見陰脈者。死。尺為陰。尺脈上不至關。是陰已絕於下。寸為陽。寸脈下不至關。是陽已竭於上。脈經曰。陽生於寸。動於尺。陰生於尺。動於寸。言陰陽互相生動。今兩不至關。是陰陽離異矣。素問生氣通天論曰。陰陽離決。精氣乃絕。非此之謂歟。代脈止歇者。乃藏真不能接續。其傾危可立見也。散脈無根者。謂脈外散而不斂。內無根蒂之候。若形見損傷。必難醫治。仲景平脈篇云。傷寒欬逆上氣。其脈散者死。謂其形損故也。其

生不已
豈容止
歇乎見
此脈者
人雖不
病當與
死期

飲食分
言之飲
傷脾宜
分利食
傷胃宜
消導

脾主四
肢四肢
稟氣於
脾議論

義謂欬逆屬肺。散脈屬心。肺金心火。火刑其金。故主死。形刑二義俱通。姑兩存之。

飲食勞倦第三十九

飲食內傷。氣口急滑。勞倦內傷。脾脈大弱。

飲食有節。五內受益。何言傷乎。傷則過於飲食。甚至停蓄不消。而氣口

急滑之脈見矣。急則不運不輸。滑則有水有物。胃中停滯。而急滑應於

氣口者。以氣口正在右關脾胃之前故也。宜推之如東垣枳朮導

丸鞠葉枳朮丸東垣動而生陽。身固不宜久逸。東垣先生論升陽益胃

湯方後云。小役形體。使胃氣與藥。得以轉運升發。此即動而生陽之義。

又上古天真論云。不妄作勞。皆不言不勞。但令小役。不令過役。并不要

勞耳。若煩擾而過於勞。外則體倦。內則脾傷。蓋脾土合肌肉而主四肢。

配陽明胃腑。受納水穀。醞釀精微。以灌溉四藏。為人身陽氣生化之源。

過勞則肢體轉旋。四肢舉動。陽氣張亂。無往非脾氣之應。則無往非脾

甚好

氣之傷矣。脾脈反大弱者。氣張則大。氣耗則弱也。宜補中益

附方

枳朮導滯丸 東垣

治傷溼熱之物。不得旋化而作痞。滿悶不安。

黃芩

茯苓

白朮

黃連 各三錢

澤瀉 一錢

枳實 去穢炒

神麴 五錢 各

大黃 兩煨一

右為末。湯浸蒸餅為丸。食遠白湯下五十丸。

丹溪保和丸 見第十七

潔古枳朮丸 見第十七

鞠槩枳朮丸 見第二十

東垣葛花解醒湯

治飲酒太過。嘔吐痰逆。心神煩亂。胸膈痞塞。手足顫

搖。飲食減少。小便不利。

青皮 三錢 去蘊

木香 五分

橘紅

人參

猪苓 去皮

白茯苓 各一錢半

神麴 炒

澤瀉

乾薑

白朮 各二錢

白豆蔻

葛花

佑賢曰 病苦痞 塞故重 用青皮 餘則醒 胃溫中 和脾利 水而已 中氣虛

服者勿妄

佑賢曰人身肢體運用力於脾過勞於則生化之而中氣虧矣此方用參朮歸耆滋培化源升柴從胃生陽橘皮開發上焦甘草和中薑棗助衛所以生

砂仁錢五

右爲極細末。每服三錢。白湯調服。但得微汗。則酒病去矣。此蓋不得已而用之。豈可恃此酣飲成病。自損元氣。惟病酒者思之。

東垣補中益氣湯。治勞役過度。飲食失節。四肢倦怠。口乾身熱。手心蒸熱。手背不熱。時或頭痛。微惡風寒。自常汗出。或氣高而喘。身熱而煩。其脈洪大無力。或脈微細軟弱。或唯右脈虛大。凡中氣虛弱而不能攝血。或中氣不足而誤用剋伐。或飲食勞倦而患瘧痢。脾胃氣虛而久不能愈。或腠理不密。易傷風寒。微邪湊肺而咳嗽不已。或病久元氣下陷。或傷恐元氣不升。或元氣虛弱。感冒風寒。不勝發表。或入房之後。勞役感冒。或勞役感冒而後入房。或陽氣不升而頭暈作眩。額上喜溫而漸愈等證。不論內外病候。審是因於勞役者。以之爲主治之法。能生長身中胃氣。而行春夏之令。亦能使脾土以生肺金。爲肝心脾肺滋化源之劑。

黃耆病甚熱甚

人參三分有甘草炙五

當歸酒製橘皮升麻柴胡各三

長身中
胃氣而
行春夏
之令乃
東垣立
方之本
意也

白朮五分

薛新甫常用方。耆、參、朮各一錢半。歸一錢。橘七分。柴、升各五分。水二盞。棗一枚。薑一片。煎至一盞。量氣弱氣盛。臨病斟酌水盞大小。去滓。食遠稍熱服。如傷重者。不過二服而愈。

氣病脈證第四十

欲知是氣。下手脈沉。沉極則伏。瀆弱久深。氣者。七氣也。七氣為內因。故脈沉。沉之極。雖按之至骨。猶不顯露。是為伏脈。再或見澁之往來不利。弱之無力衰微。非七氣內傷之久。不如是也。

六鬱脈證第四十一

六鬱多沉。滑痰緊食。氣滯血乳。數火細濕。鬱有六種。亦為內因。鬱則不復浮暢。故脈多沉。多沉者。不盡沉也。沉而

滑則有水有物。痰停之鬱也。沉而緊。則寒實有物。食積之鬱也。沉而澁。則往來滯滯。氣虛不呵之鬱也。沉而芤。則沉下中空。血虛不濡之鬱也。沉而數。則不能炎上。火伏之鬱也。沉而細。則附骨流行。濕着之鬱也。沉而大。以越鞠丸為主。最妙如欲分治痰宜瀉生導痰湯。重則後痰丸。食宜丹溪保和丸。氣宜準繩氣鬱湯。血宜血鬱湯。火宜熱鬱湯。濕宜濕鬱湯。之類。

越鞠丸丹溪

越鞠丸丹溪
也。

治六鬱胸膈痞滿。或吞酸嘔吐。飲食不化。此治鬱之聖藥。

蒼朮米泔浸炒神

猫炒

撫芎

山
梔
炒

香附妙

山查淨肉

麥芽等炒分各

右末水調神麴麥芽作糊丸。如梧子大。每七八十丸。白湯下。

濟生導痰湯 治痰涎壅盛。胸膈留飲。痞塞不通。

半
夏
次湯洗七
四兩南

星炮去

枳實
去麩炒

赤茯苓去皮

橘紅雨各一

甘草
兩炙半

枳實
去麩炒

赤茯苓去皮

鬱撫芎 治血鬱 山梔治 火鬱香 附治氣 鬱若肉 食之鬱 用山查 穀食之 鬱用麥 芽無非 所以助 胃中生 氣而使 上焦自 開也發 越鞠鬱 旨哉言 乎血鬱 則脈未 必若

右咬咀。每服四錢。水一盞。薑十片。煎八分。食遠溫服。

滾痰丸見第七

丹溪保和丸見第七

準繩氣鬱湯 治因求謀不遂。或橫逆之來。或貧窘所迫。或暴怒所傷。或

悲哀所致。或思念太過。皆為氣鬱。其狀胸滿脇痛。脈沉而濇者是也。

香附童便浸一宿焙乾杵

蒼朮炒

橘紅

製半夏錢各半貝母去心

白茯苓去皮

撫芎

紫蘇葉用自汗則山梔仁炒共

甘草

木香

檳榔各五生薑五片

煎服。如胸脇作痛。此有血滯也。宜參血鬱湯治之。

血鬱湯 凡七情鬱結。盛怒叫呼。或起居失宜。或挫閃致瘀。一應饑飽勞

役。皆能致血鬱。其脈沉濇而乳。其體胸脇常有痛如針刺者是也。

香附童便製

牡丹皮

赤芍炒

川通草

穿山甲炒

降真香

蘇木

山查肉

大麥芽一錢研各紅花七分

水酒各一半煎去滓入桃仁去皮泥七分。韭汁半盞。和勻通口服。

熱鬱湯 有陰虛而得之者。有胃虛食冷物。抑遏陽氣於脾土中而得之者。其治法皆見發熱條中。此則治夫非陰虛。非陽陷。亦不發熱。而常自蒸蒸不解者也。

連翹四錢 薄荷葉

芩各一錢 山梔仁錢二

麥門冬三錢

甘草五分

鬱金一錢

瓜蒌皮穰二錢

竹葉七片煎服。問何不用蒼朮、香附、撫芎。曰火就燥。燥藥皆能助火。故不用也。

濕鬱湯 治因雨露所襲。或嵐氣所侵。或坐臥濕地。或汗出衣衫。皆為濕鬱。其狀身重而痛。倦怠嗜臥。遇陰寒則發。脈沉而細緩者是也。

蒼朮三錢

白朮炒

香附炒

橘紅

厚朴薑汁炒

半夏製

白茯苓去皮

撫芎

羌活

獨活各一錢

甘草五分

生薑五片。水煎。

虞搏云。一男子年二十九。三月間房事後。騎馬渡溪。過深淵沉沒。幸得馬健無事。連濕衣行十五里抵家。次日增寒壯熱。肢節煩疼。似瘧非瘧之狀。一醫作虛證治。而用補氣血藥。服之月餘不效。又易一醫。作勞瘵治。用四物湯。加知藥。地骨皮之類。及丹溪大補陰丸。倍加紫河車。服至九月。反加滿悶不食。乃顧倩有乳婦人在家。止喫人乳汁四五杯。不喫米粒。召余診視。六脈皆洪緩。重按若牢。右手爲甚。余作濕鬱處治。用平胃散。倍蒼朮。加半夏、茯苓、白朮、川芎、香附、木通、砂仁、防風、羌活。加薑煎服。黃昏服一貼。一更時又進一貼。至半夜。遍身發紅。丹如癰疹。片時隨沒而大汗。索粥。與稀粥二碗。由是前病除減。能食。仍與前方服三貼。後以茯苓滲濕湯。倍加白朮。服二十貼平安。

醫燈續焰

明 錢塘 王 紹 隆 著

明 錢塘 潘 楫 碩 甫 註

明 錢塘 王 佑 賢 聖 翼 評

鄧縣 曹 赤 電 炳 章 校

卷五

痰病脈證第四十二

滑主多痰。弦主留飲。熱則滑數。寒則弦緊。浮滑兼風。沉滑兼氣。食傷短疾。濕留濡細。

滑為水物兼有之象。主多痰者。以痰為飲。結成形故也。弦則弦直而飲。不能抑揚鼓蕩。是陽運之力薄。故飲留焉。宜和劑倍朮丸苓以飲較痰。尚未結聚。所以弦不似滑之累累替替有物形也。大約氣機鼓動屬熱。滑數是已。斂束屬寒。弦緊是已。鼓動浮越。風之象也。故浮滑者兼風。宜

病有氣
機脈有
氣機識

得個中
妙理未
來證狀
自可逆
料

沉州白丸子法製半夏清氣化痰丸之類動疾沉下。氣之鬱也。故動滑者兼氣。停食於中。則氣為食礙。不能透達。脈為之短。短則氣遏於內。勢反成疾。短疾之脈。與滑近似。故滑亦主食也。宜丹之類保濕為陰邪。留必緩滲。非若陽邪之變動迅疾。故脈亦濡細耳。宜仲景之類

附方

和劑倍朮丸見第二

仲景苓桂朮甘湯見第六

和劑青州白丸子 治男婦手足癱瘓。風痰壅盛。嘔吐涎沫。及小兒驚風。

婦人血風。

半夏生七兩

星生三

白附子生二

川

烏生半兩

右為末。以生絹袋盛。於井花水內擺出。如未出者。更以手揉出。如有滓。更研再入絹袋。擺盡為度。置磁盆中。日晒夜露。至曉撇去舊水。別用井水攪。又晒至來日早。再換新水。攪如此法。春五日。夏三日。秋七日。冬十日。去水晒乾。後如玉片。研細。以糯米粉煎粥清丸。綠豆大。薑湯下二十

佐賢曰
 人身運
 用全在
 脾肺宣
 布倘氣
 不前通
 便為痰
 滯半夏
 為轉樞
 之要藥
 假令痰
 氣自清
 則嘔酸
 足慮也
 此丸為
 世所重
 然必藥
 品精新
 修製如
 法方效

丸。無時。如癰瘕風。溫酒下。小兒驚風。薄荷湯下五丸。
 法製半夏。治一切痰嗽。或嘔吐冷飲酸水。風痰痰癖。胸膈痞悶。喘促等
 證。

半夏棟大者明礬一斤四生薑一斤四

右三味。用泉水共浸七日。擦去半夏皮。加朴硝二斤八兩。換水浸七日。
 加猪牙皂角切片一斤四兩。浸七日。此後用泉水。每日一換。至四十九
 日。撈起晒乾為末。每用二錢。煎蘿蔔湯調下。小兒量減之。

和劑清心牛黃丸。治諸風緩縱不隨。語言蹇澁。心怔健忘。恍惚去來。頭
 目眩冒。胸中煩鬱。痰涎壅塞。精神昏憤。又治心氣不足。神志不定。驚恐
 悲憂。虛煩少睡。喜怒無時。或發狂顛。神情昏亂。

白芍藥 麥門冬去心 黃芩 當歸去苗

防風去苗 白朮各半 柴胡 桔梗

芎藭 白茯苓去皮 杏仁去皮尖雙仁熬炒黃

神麴研 蒲黃炒 人參去蘆各半 羚羊角屑

麝香研

龍腦研各一兩

肉桂去粗皮

大豆黃卷碎炒

阿膠碎炒各一兩七錢半

白斂乾薑炮各七錢半

牛黃研一兩二錢

犀角屑二兩雄黃研飛八錢

乾山藥七兩

甘草剉炒五兩

金箔一千二百片為衣

大棗皮一百枚核研成膏蒸熟去

右除棗、杏仁、金箔、二角屑及牛黃、雄黃、腦、麝外。共為細末。入餘藥和勻。

用煉蜜與棗膏為丸。每兩作十丸。金箔為衣。每服一丸。溫水化下。食後

服。小兒驚癇。酌量多少。竹葉湯化下。

沉香墮痰丸 治宿食不消。咽膈不利。欬嗽痰涎。頭目昏暈。嘔逆惡心。胸

膈不快。

沉香

木香各二錢

青皮去白半兩半夏麴二兩

檳榔大者三枚用麵裹煨熟

右為細末。用生薑汁浸。蒸餅為丸。如小綠豆大。每服二十丸。不拘時。薑

湯下。

清氣化痰丸 順氣快脾。化痰消食。

半夏 南星去皮 皂角切 白礬
乾薑各四兩

右先將白礬等三味。用清水五碗。煎取水三碗。却入半夏二味。浸兩日。再煮至半夏南星無白點爲度。晒乾。

青皮去穰 陳皮 真蘇子炒 蘿蔔子炒另

杏仁去皮尖 葛根 神麴炒 麥蘖炒焦

山查去核 香附各二兩

右爲末。蒸餅丸桐子大。每服五七十丸。臨臥食後茶湯下。

丹溪保和丸見第十七

仲景澤瀉湯見第二十二

瘧疾脈證第四十三

瘧脈自弦。弦數者熱。弦遲者寒。代散者折。

瘧病機故開闔互見久則樞廢元氣致泄代散兼見立至危敗矣

佑賢曰邪在表則陽虛邪在裏則陰虛而發熱今半表

素問瘧論曰。夫瘧瘧皆生於風。蓋風屬木而應春。弦是其本脈。生於風。則象風。故脈自弦。又瘧之作也。邪正交爭。或寒而熱。熱而寒。寒熱往來。正邪出入。樞主於中。經云少陽為樞。少陽亦應乎春。故脈亦當弦。弦而兼數。數為熱。是知瘧之多熱也。多熱多汗宜小柴胡湯或加知母石膏白虎湯弦而兼遲遲為寒是知瘧之多寒也。宜二陳薑桂柴胡白朮草果之類雖附子亦不妨用但若代止而又散乃正氣虛脫不續不斂之宜細審其證則百發百中矣。此屬危殆之證若欲用藥非大補氣血如參象邪盛正衰定主凶折。耆炙甘朮附薑桂之類不能挽回于萬一者。

附方

仲景小柴胡湯 傷寒論云。傷寒五六日。中風往來寒熱。胸脇苦滿。默默不欲飲食。心煩喜嘔。或胸中煩而不嘔。或渴。或腹中痛。或脇下痞鞭。或心下悸。小便不利。或不渴。身有微熱。或欬者。小柴胡湯主之。此半表半裏寒熱往來之藥也。今用治瘧之寒熱往來者皆效。

柴胡半斤 黃芩 人參 甘草炙
生薑各三兩 半夏半斤 大棗十二枚

半裏故寒熱往來乃少陽之樞象也故用柴胡引入少陽引清氣而為君用芩薑解寒熱而為臣參艸養正大棗助經為佐也半夏之使何以倍之蓋以半夏為樞機之要藥耳觀後種之以加減以樞無

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。若胸中煩而不嘔者。去半夏。人參加栝蒌實一枚。若渴者。去半夏。加人參合前成四兩半。加栝蒌根四兩。若腹中痛者。去黃芩。加芍藥三兩。若脇下痞鞭。去大棗加牡蠣四兩。若心下悸。小便不利者。去黃芩。加茯苓四兩。若不渴。外有微熱者。去人參。加桂枝三兩。溫覆取微汗愈。若欬者。去人參。大棗。生薑。加五味子半升。乾薑三兩。

仲景白虎湯

加人參名傷寒論云

傷寒論云。傷寒脈浮滑。此表有熱。裏有寒。白

虎湯主之。又云。吐下後。七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升者。白虎加人參湯主之。大抵表裏皆熱。在表多汗。非閉鬱之熱。在裏渴煩。非入府堅實之熱。轉夏為秋之劑也。知母六兩。石膏一斤。甘草兩。粳米六合。右四味。以水一斗。煮米熟湯成。去滓。溫服一升。日三。

洩瀉脈證第四十四

定象出入難憑也
治亦相法

瀉痢為裏證經云出則為虛脈宜沉弱即前所謂脈證相宜反是則惡

佑賢曰聞此方出自龍宮有白朮丹參白朮藜各一兩隨症

洩瀉下利。沉小滑弱。實大浮洪。發熱則惡。

瀉痢見於下部。時時唯出。無論因之內外。總屬傷陰耗裏之虛證。沉小滑弱。乃為相宜。耳大約宜五苓散。平胃散。東垣升陽除濕湯。理中湯。五苓散。黃芩湯。神丸。七味白朮散。痢則芍藥湯。香連丸。益元散。敗毒散。東垣芍藥黃芩湯。和劑真人養藏湯。金匱桃花湯。白頭翁湯。和劑參苓白朮散。俱當審寒熱。若實大浮洪。則惡矣。實大與虛反。浮洪與裏反。邪盛正衰。不言可喻。再加發熱。則陰氣彌傷。而裏氣彌耗。不至躁亡不已也。

附方

五苓散 見第七

平胃散 治脾胃不和。不思飲食。心腹脇肋脹滿刺痛。口苦無味。胸滿短

氣。嘔噦噫氣吞酸。面黃肌瘦。體倦節痛。常自利。常發霍亂。反胃等證。

蒼朮 去粗皮米泔浸五斤 陳皮 三斤去白 甘草 十兩炒三

厚朴 去粗皮薑製 炒三斤二兩

右為細末。每服二錢。水一盞。薑三片。棗二枚。同煎七分。去滓溫服。或去

薑棗帶熱服。空心食前。入鹽一捻。沸湯點服亦得。常服調氣煖胃。化宿

用引所
治甚廣
同志者
當多方
修合以
濟貧人

食。消痰飲。辟風寒冷濕不正之氣。

東垣升陽除濕湯 治脾胃虛弱。不思飲食。腸鳴腹痛。世瀉無度。小便黃。

四肢困弱。

甘草

大麥蘖如胃寒腹

陳皮

猪苓已上各

澤瀉

益智仁

半夏

防風

神麴

升麻

柴胡

羌活已上各 蒼朮一錢

右咬咀。作一服。水三大盞。生薑三片。棗二枚。同煎一盞。去滓。空心服。

理中湯見第七

二神丸

治脾腎虛弱。侵晨五更作瀉。全不思食。或食而不化。大便不實。

神效。

破故紙炒四兩

肉豆蔻生二兩

用紅棗四十九枚。生薑四兩。同煮熟。去薑及皮核。取肉和藥丸如梧子。

每服五七十丸。空心鹽湯下。

五味子散 治腎泄。在侵晨五更作瀉。或大便不實。不時去後。

五味子兩二 吳茱萸錢五

為末。每服二錢。白湯調服。為丸更妙。

四神丸 治脾腎虛弱。大便不實。飲食少思。

即二神丸、五味子散合丸。空心食前服。

錢氏七味白朮散 治中氣虧損。津液短少。口舌乾渴。或口舌生瘡。不喜

冷飲。或吐瀉後口乾。最宜服。

人參 白朮 木香 白茯苓

甘草 藿香各五 乾葛一錢

右水煎服。

芍藥湯 治便血後重。經曰。溲而便膿血。知氣行而血止也。行血則便膿自愈。調氣則後重自除。

白芍藥二兩 當歸 黃連 黃芩各五

檳榔 木香 甘草錢二 桂枝錢半

右吹咀。每服五錢。水煎服。痢不減。加大黃。

香連丸 治痢疾。并水瀉。暑瀉。甚效。

黃連十二兩另用吳茱萸十兩為末。二味熱水拌和入礞石。置熱湯中。頓一日同炒至黃。連紫色去。茱用連。

為末。每四兩。配木香一兩。醋打米糊為丸。如梧子大。每服三十丸。白湯

下。久痢中氣下陷。以補中益氣湯下。中氣虛者。四君子加薑桂湯下。

益元散一名天水散 治傷寒表裏俱熱。煩渴口乾。小便不通。及霍亂吐

瀉。下利腸辟。五淋。及婦人產難。催生下乳。

桂府滑石賦白者水 粉 草去皮一兩研爛

右為極細末。每服三錢。白湯調下。新水亦得。加薄荷末少許。名雞蘇散。

加青黛末少許。名碧玉散。治療並同。

敗毒散見第三十七

東垣芍藥黃芩湯 治洩痢腹痛。或後重。身熱。久不愈。脈洪疾者。及下痢

膿血稠粘。

黃芩 白芍藥各一兩 甘草五錢

右咬咀。每服一兩。水一盞半。煎一盞。溫服無時。如痛。加桂少許。
和劑真人養藏湯 治大人小兒冷熱不調。下痢赤白。或便膿血。有如魚
腦。裏急後重。臍腹疔痛。及脫肛墜下。酒毒濕毒便血。並宜服。

人參

白朮

當歸各六兩

白芍藥

木香

各一兩六錢

甘草

肉桂各八錢

肉果半兩裏煨

御米殼

蜜炙三兩六錢

訶子肉二錢

右咬咀。每服四錢。水一盞半。煎八分。去滓。食前溫服。忌酒麵生冷腥膩
之物。滑泄夜起。久不差者。加附子四片。

金匱桃花湯

治下痢膿血。

赤石脂

一升半升半剉

乾薑一兩

粳米一升

右先以水七升。煮米薑令熟。去滓。溫七合。內石脂末方寸匕。日三服。若
一服愈。勿服。

金匱白頭翁湯

治熱痢膿血。

白頭翁二兩

黃連

黃蘗

秦皮各三兩

胃之上
口為貴
門言飲
食至此
貴趨而
進以上
焦主納

右以水七升。煮二升。去滓。溫服一升。不愈更服。

和劑參苓白朮散

治久瀉痢。或大病後調理。消渴者尤宜。

人參

乾山藥

蓮肉去心

白扁豆去皮薑汁浸炒各一斤半

於白朮二斤

桔梗炒黃

砂仁

白茯苓去皮

薏苡仁

炙甘草各一斤

右為細末。每服二錢。米湯調下。或加薑棗煎服。或棗肉和丸。如桐子大。每服七十丸。空心米飲下。或煉蜜丸如彈子大。湯化下。

嘔吐反胃脈證第四十五

嘔吐反胃。浮滑者昌。弦數緊瀆。結腸者亡。

嘔吐有聲有物。反出于胃。上焦之病也。宜仲景大半夏湯二陳湯之類。上焦。則

脈應浮。有物。則脈應滑。浮滑為陽。飲食之能納能運而不反者。陽之力

也。故云浮滑者昌。若得弦數緊瀆之脈。則逆矣。蓋弦狀陰斂。陽運衰微。

又弦為肝木之脈。嘔吐屬胃。胃者土也。木來乘土。土將奪矣。金匱要略

也胃之
下口為
曲門至
飲食至
此已腐
而下幽
隱處以
下焦主
出也若
上無陽
氣運化
以主納
下無陰
氣傳送
以主出
便屬胃
海乾枯
氣血兩
衰所由
來者漸
矣故弦
瀦耗損
之脈見
急用養
胃生津

云。脈弦者虛也。胃氣無餘。亦懼胃土虛而見肝木之脈也。如四君子湯。六君子湯。加防。數則為熱。熱當消穀。而反吐穀者。乃知數為虛數。虛則不運。數則氣促。嘔吐不止。胃將由此而敗。金匱要略云。陽氣微。膈氣虛。脈乃數。宜竹茹生薑黃連之類。緊則為寒。寒則無陽以運。故上出而嘔吐。宜藿香安胃散之類。瀦脈枯澀。吐亡津液。所致也。金匱要略所謂朝食暮吐。暮食朝吐。宿穀不化。名曰胃反。脈緊而澀。其病難治。者是也。宜補氣而生津。如四君子。夫胃為水穀之海。若再加大腸秘結。是全無陰液。而水穀之海枯矣。水穀之海枯而能生者。未之有也。翻胃不詳治者。

附方

仲景大半夏湯見第二十

仲景生薑半夏湯。要略云。病人胸中似喘不喘。似嘔不嘔。似噦不噦。胸

中憤憤然無奈者。生薑半夏湯主之。

半夏升 生薑汁一升

然而十難一者矣。若暴發者，或因飲食過多，胃中一食，則難運。時難運，則上焦受納，故卒然反出。脈亦有餘而浮滑，此為暴證。治以理氣豁痰，胸寬自愈。暴脫者，後天穀氣，穀氣可續，故生漸絕。

右以水三升。煮半夏取二升。內生薑汁。煮取一升半。小冷。分四服。日三夜一服。止。停後服。

二陳湯

見第六

四君子湯

見第六

六君子湯

見第六

仲景理中湯

見第七

藿香安胃散

見第十

霍亂脈證第四十六

霍亂之候。脈代勿訝。厥逆遲微。是則可怕。

仲景云。嘔吐而復下利。名曰霍亂。宜仲景通脈四逆湯之類。霍亂者。揮

霍撩亂。不能自持。陰陽乖離。上下亟奪。是時脈或代止。勿驚訝也。乃卒

吐暴下。穀神頓委。暫不接續故耳。若手足厥冷。脈復遲微。是則大為可

怕。蓋手足為諸陽之本。遲微為純陰之脈。陽衰陰盛。真元漸絕之象也。

者先天真元不
死日漸
墜猶真
元暴昏
猶穀氣
喻亦切

佑賢曰
四肢為
諸陽之
本故以
四肢厥
逆微陽
氣之淺
深然亦

是故暴脫者能漸生而漸絕者又何能暴起哉。暴脫者如日中風雨風如日漸西墜墜則終此日矣九死之證也設欲用藥救治非附子理中湯四逆加入人參湯之類不可

附方

仲景通脈四逆湯 傷寒論云。少陰病。下利清穀。裏寒外熱。手足厥逆。脈微欲絕。身反不惡寒。其人面赤色。或腹痛。或乾嘔。或咽痛。或利止脈不出者。通脈四逆湯主之。今用治霍亂吐利脈不出者亦宜。

甘草 兩二

附子 大者一枚生用

乾薑 四兩強人

右以水三升。煮一升二合。去滓分溫再服。其脈漸出者愈。

仲景理中圓見第七

仲景四逆加入人參湯 治一切虛寒亡陽。下利。四肢厥逆等證。

甘草 兩二

乾薑 半兩

人參 一兩

附子 一枚生用去

右以水三升。煮一升二合。去滓分溫再服。強人可大附子一枚。乾薑三兩。

附子理中湯見第七

有因熱而厥者此似非是而生死關頭大須關照

此症危在脈外若沉緊尚可溫補小則正氣衰微補不能當攻不能受故難治

佑賢曰邪湊虛入乃虛

欬嗽脈證第四十七

欬嗽多浮。聚胃關肺。沉緊小危。浮濡易治。

欬嗽不一。強半為風寒痰飲。風寒則傷於皮毛。宜參蘇飲如麻黃湯痰飲則停於胸胃。宜二陳湯仲景小青龙湯皮毛者肺之合也。邪襲其合。肺氣應之。故上逆而為欬。胃居肺下。寒痰冷飲。停滯於中。上射於肺。肺氣迎之。故亦上逆而為欬。經云。形寒飲冷則傷肺。痰飲寒濁之氣上熏於形寒固傷於外。而冷飲寒痰。則皆聚於胃也。肺居最上。皮毛最表。故脈多浮耳。沉緊小危者。沉則邪入裏。緊則寒不散。小則正氣衰。均主病危。若浮而濡。浮則在表。濡受邪輕。故云易治。

附方

麻黃湯

見第六

參蘇飲 治痰積中脘。暈眩嘈雜。怔忡噦逆。或痰停關節。手足譫曳。口眼喎斜。半身不遂。嘔吐惡心。頭疼發熱。及感冒風邪。鼻塞增寒。欬嗽等證。

中之實
攻補兼
施大為
善法

人參

紫蘇葉

前胡

半夏製

葛根錢各一

茯苓

枳殼

桔梗

陳皮各八分

木香磨四分

加葱白、生薑煎服。

二陳湯見第六

仲景小青龍湯見第六

拔粹半夏溫肺湯 治心腹中脘痰水冷氣。心下汪洋嘈雜。常多涎唾。口

中清水自出。脇肋急脹痛。不欲食。此胃氣虛冷所致。其脈沉弦細遲。

旋覆花

人參

細辛

桂心

甘草

陳皮

桔梗

芍藥

半夏製各半 赤茯苓七錢

右㕮咀。每服四錢。生薑三片。水煎食後服。

喘急脈證第四十八

形所以載氣者。肩息為氣動形。若無餘。則不足。為形不。能載氣。仲景云。欬逆上。氣脈散。者死。為損其形。故也。

喘急息肩。浮滑者順。沉濇肢寒。散脈逆證。

呼吸疾速曰喘。氣息短促曰急。息肩者。肩隨息動。吸則提氣。呼則舒氣。出入不利。故肩亦為之聳動耳。脈浮滑者。浮為陽。為表。為風。宜汗解。仲或香蘇散及枳滑為陽。為痰。為食。痰宜枳桔二陳湯。養親湯之類。食宜丹溪保和丸。平胃散。和劑小七香丸。蓋因外邪閉遏。或為內阻物撓。致令機關壅滯。胸膈否塞。而為喘急息肩者有矣。苟能散其邪。則機關可利。推其物。則否塞可通。故曰順。脈沉濇者。沉為陰。為裏。為下部。濇為陰。為虛。乃元氣不能接續。不能舒徐。以達上焦。不能達上。又豈能充四肢乎。是以喘急息肩而四肢又寒也。若更見散脈。則元真將隨喘而散。死亡必矣。故曰逆。脈肢寒。陽退陷而不達。喘息脈散。陽散越而脫根。

附方

仲景麻黃湯見第六

香蘇散寶鑑 治水氣虛腫。小便赤濇。

陳皮去白 防己 木通

紫蘇葉各半

右爲末。每服二錢。水二盞。生薑三片。煎至一盞。去滓食前溫服。

枳桔二陳湯枳即二陳加枳殼桔梗

三子養親湯 治年高痰盛氣實。并氣壅哮喘等證。

紫蘇子沉水

白芥子

蘿蔔子各三錢

右水二鍾。薑二片。煎七分。食後服。

丹溪保和丸見第十七

平胃散見第四十四

和劑小七香丸見第十七

仲景瓜蒂散

瓜蒂二十個

右剉。以水一升。煮取五合。去滓頓服。

火病脈證第四十九

病熱有火。洪數可醫。沉微無火。無根者危。

沉微尙
可溫補
若無火
即王太
僕所云
熱之不
熱矣

病熱而有火證。是火病也。火則脈應洪數。脈證相宜。故可醫治。若得沉微之陰脈。是無火矣。無火而仍病熱。則知爲無根之陽。虛見熱象也。故主危殆。

清心蓮子飲

和劑

治心虛有熱。小便赤濁。

黃芩

麥門冬去心

地骨皮

車前子

甘草

炙各一錢半

石蓮肉

白茯苓

黃耆蜜炙

人參

各七分

水二盞。煎一盞。水中沉冷。空心溫服。發熱加柴胡、薄荷。

導赤散

錢氏

丹溪云。導赤散。正小腸藥也。

生地黃

木通

甘草

各等分

右同爲末。每服三錢。水一盞。入竹葉七片。同煎五分。食後溫服。

錢氏瀉黃散

治脾家鬱熱。口甜口瘡。喜飲煩躁。

蘆香

七錢

山梔仁

一兩

石膏

半斤

甘草二兩

防風

四兩

右剉同蜜酒微炒香。爲細末。每服二錢。水一盞。煎清汁飲。

瀉青丸

當歸去蘆 焙稱

草龍膽焙稱

川芎

梔子

川大黃煨

羌活

防風去蘆

右各等分爲末。煉蜜爲丸。雞頭大。每服一丸。煎竹葉湯。同砂糖溫水化下。

局方八正散 治大人小兒。心經邪熱。一切蘊毒。咽乾口燥。大渴引飲。心忪面赤。煩躁不寧。目赤睛疼。唇焦鼻衄。口舌生瘡。咽喉腫痛。又治小便赤澀。或癃閉不通。及熱淋血淋。並宜服之。亦氣分藥也。

瞿麥

篇蓄

車前子

滑石

甘草炙

山梔子仁

木通

大黃

右爲散。每服二錢。水一盞。入燈心廿莖。煎七分。去滓。食後臨臥溫服。小兒量與之。

左金丸 治肝火脇肋刺痛。或發邪熱。或頭目作痛。或大便不實。小便淋

秘。或小腹疼痛。一切肝火之症。以此主治。

黃連六兩 吳茱萸湯煮片

粥和丸。陳皮白朮湯送服。

河間防風通聖散 表裏氣血總清之藥。

防風 川芎 當歸 芍藥

大黃 薄荷葉 麻黃 連翹

芒硝盆硝是已 上各半兩 石膏 黃芩

桔梗各一兩 滑石三兩 甘草二兩 荆芥

白朮 梔子各二錢半

為末。每服五錢。水煎食遠服。

升陽散火湯 治男婦四肢發熱。肌熱。筋痺熱。骨髓中熱發如火。燎於肌

膚。捫之烙手。此證多因血虛而得。或胃虛過食冷物。抑遏陽氣於脾土。

火鬱發之。此方是也。

升麻 葛根 獨活 羌活各五錢

防風半二錢

柴胡八錢

甘草三錢炙人

參

白芍藥錢各五

右咬咀。每服半兩。或一兩。水煎稍熱服。

陽毒升麻湯 治傷寒雜病。汗吐下後。變成陽毒。發狂譫妄。喉痛下利。

升麻五錢

犀角

射干

黃芩

人參

甘草五錢各二分

右咬咀。水煎服。

清胃湯 治醇酒厚味。唇齒作痛。或齒齦潰爛。或連頭面頸項作痛。

黃連一錢五分

當歸

生地黃

牡丹皮錢各一

升麻二錢

右水煎服。

千金黑奴丸 治大熱陽毒。發狂發斑。煩躁大渴。

黃芩

釜底煤

芒硝

竈突墨

梁上塵

小麥奴

麻黃

大黃兩各一

右爲末。煉蜜丸如彈大。新汲水化服。不定再服半丸。飲水盡。足當發寒。寒已汗出乃差。未汗再服半丸。不大渴者不可與。

瀉白散 治肺火欬喘。面紅。喉咽不清。

地骨皮二錢 桑白皮二錢 甘草五分

爲末。水一盞。煎六分服。

當歸龍薈丸 治肝經實火。大便秘結。小便澀滯。或胸膈作痛。陰囊腫脹。

凡屬肝膽實熱。並宜用之。

當歸 龍膽草 梔子仁 黃連

黃芩各一兩 大黃 蘆薈 青黛各五錢

木香二錢五分 麝香另研五分

爲末。炒神麴糊丸。每服二十九丸。薑湯下。

骨蒸脈證第五十

骨蒸發熱。脈數而虛。熱而瀉小。必殞其軀。

此種症
為虛不
受補

骨蒸發熱者。熱自骨起。蒸發於外。內傷虛勞之熱也。脈數而虛。是其本然。蓋以數為熱。虛為勞耳。若蒸熱而見濇小之脈。濇則精血少。小則元氣衰。真陰日損。邪火日增。不至於殞軀不已也。勞方極參門

醫燈續焰

明 錢塘 王 紹 隆 著

明 錢塘 潘 楫 碩 甫 註

明 錢塘 王 佑 賢 聖 翼 評

鄞縣 曹 赤 電 炳 章 校

卷六

勞極脈證第五十一

勞極諸虛。浮裏微弱。土敗雙弦。火炎急數。

五勞五
藏疲勞
也

勞極者。五勞六極也。巢氏病原云。五勞者。一曰志勞。二曰思勞。三曰心

勞。四曰憂勞。五曰瘦勞。瘦當是肝勞又云。肺勞者。短氣而面腫。鼻不聞香臭。

肝勞者。面目乾黑。口苦。精神不守。恐懼不能獨臥。目視不明。心勞者。忽

忽喜忘。大便苦難。或時鴨澹。口內生瘡。脾勞者。舌苦直。不得咽唾。腎勞

者。背難以俛仰。小便不利。色赤黃而有餘瀝。莖內痛。陰濕囊生瘡。小腹

皮毛血 脈肌肉 筋骨為 五藏所 合藏足 則氣充 於所合 藏虛則 氣窮於 所合窮 極也腎 兼有二 故云六 極

七傷與 五勞不 同勞則 由內疲 勞傷則 因外傷 感

滿急。此五勞各見五藏氣化。及經絡諸證。亦甚明顯。但與前五勞不甚符合。姑存此。俟再考也。六極者。一曰氣極。令人內虛。五藏不足。邪氣多。正氣少。不欲言。宜四君子湯補中益氣湯參朮膏之類二曰血極。令人無顏色。眉髮墮落。忽忽喜忘。宜四物湯六味丸八珍湯聖愈湯之類三曰筋極。令人數轉筋。十指爪甲皆痛。苦倦。不能久立。宜四物湯木瓜散之類四曰骨極。令人痠削。齒苦痛。手足煩疼。不可以立。不欲行動。宜六味丸虎骨丸鹿角丸保命金剛丸丹溪丸五曰肌極。令人羸瘦無潤澤。飲食不生肌膚。宜四君子湯保命金剛丸丹溪丸六曰精極。令人少氣。噲噲然內虛。五藏氣不足。髮毛落。悲傷喜忘。宜六味丸還少丹龜鹿膠之類是即五藏所合之病。虛損而至於極處者也。腎則多一精極。故為六極。其證與五藏配合。甚為有理。此巢氏之三昧論也。諸虛者。言一切虛損不足。即五勞六極。更有七傷。俱該在內。巢氏云。七傷者。一曰陰寒。二曰陰萎。三曰裏急。四曰精連連。五曰精少。陰下濕。六曰精清。七曰小便苦數。臨事不卒。又云。七傷者。一曰大飽傷脾。脾傷善噫。欲臥面黃。宜資生丸保和丸二曰大怒氣逆傷肝。肝傷少血目闇。宜四物湯元戎散之類三曰強力舉重。久坐

病虛脈弱治可從補若
雙弦急數則正衰邪實
補劑難施故云不治

濕地傷腎。腎傷少精。腰背痛。厥逆下冷。宜黑地黃丸。寶鑑天眞丹之類。四曰形寒寒飲傷肺。肺傷少氣。欬嗽鼻鳴。宜小、青、龍湯之類。五曰憂愁思慮傷心。心傷苦驚。喜忘善怒。宜天王補心丸。朱砂之類。六曰風雨寒暑傷形。形傷髮膚枯夭。宜人參養榮湯之類。七曰大恐懼不節傷志。言大恐懼而志傷恍惚不樂。宜王補心丸。安神丸之類。是云七傷亦合於五藏。但多一形志。故云七傷較前所云七傷此爲得理。蓋前七傷大抵俱屬腎證。人身感疾。觸處可傷。豈獨一腎若云腎有七傷則可。正文不言七傷而註錄者欲其便於查考耳。夫勞極損傷。氣血日耗。形體漸衰。所見之脈。隨病呈象。如空虛之浮。不鼓之奕。欲絕之微。無力之弱。雖云病脈。然與病猶相宜也。至若雙弦。乃知土敗。急數定爲火炎。蓋弦爲肝木。雙弦則木太盛。久病之土。何堪其侮。故知其必敗也。數已爲熱。急數則躁疾直強。略無半點和柔。邪火炎炎。真陰自絕。兩皆不治之證。

附方

四君子湯

見第六

醫燈續焰

卷六

勞極脈證第五十一

補中益氣湯見第三十九

參朮膏 治中風虛弱。諸藥不應。或因用藥失宜。耗散元氣。虛證蜂起。俱

用此藥。補其中氣。諸證自愈。

人參 白朮各等分

右水煎稠收膏。湯化服之。

四物湯見第二十一

六味丸見第十六

八珍湯見第十六

聖愈湯 治一切失血。或血虛煩渴躁熱。睡臥不寧。或瘡證膿水出多。五

心煩熱。作渴等證。

熟地黃生者自製 生地黃 當歸酒拌各一錢 人參

黃耆炒 川芎各二錢

右水煎服。

濟生續斷湯 治肝勞虛寒。脇痛脹滿。攣縮煩悶。眼昏不食。

川續斷酒浸

川芎

當

歸酒浸

陳皮去白

半夏製

乾薑炮各一兩

肉桂不見火

炙甘草各半兩

咬咀每服四錢。水一盞。薑五片。煎服無時。

木瓜散 治筋虛極。脚手拘攣。十指甲痛。數轉筋。甚則舌卷卵縮。脣青面

黑。

木瓜去子

虎脰骨酥炙

五加皮洗

當歸酒浸

桑寄生

酸棗仁炒

人參

柏子仁

黃耆各一兩

炙甘草一兩

煎服法前同。

鹿角丸 治骨虛極。面腫垢黑。脊痛不能久立。血氣衰憊。髮落齒枯。甚則

喜唾。

鹿角二兩

牛膝酒浸焙去

右爲細末。煉蜜丸如梧子大。每服七十丸。空心鹽湯下。

保命金剛丸 治腎損骨痿。不能起於床。宜服此益精。

草薺

杜仲絲去

菴蓉酒浸

兔絲子酒浸各等分

右爲細末。酒煮猪腰子。搗和丸。如桐子大。每服五七十丸。空心用溫酒

送下。

丹溪虎潛丸

龜板

黃蘗各四兩

知母

熟地黃各二兩

牛膝三兩

芍藥一兩

瑣陽

虎骨酥炙

當歸各一兩

陳皮七錢

乾薑半兩

右爲末。酒糊丸。加附子。治痿厥如神。

保命黑地黃丸爲加五味子治陽盛陰衰。脾胃不足。房室虛損。形瘦無力。

面多青黃。而無常色。此補氣益胃之劑也。

蒼朮一斤

熟地黃一斤酒蒸

五味子半斤

乾薑半兩

右爲細末。棗肉丸。如桐子大。食前米飲。或酒服百丸。治血虛久痔甚妙。

經云。腎苦燥。急食辛以潤之。此藥開腠理。生津液。通氣。又五味子酸以

佑賢曰
 東垣云
 胃壯元
 氣盛則
 不能食
 而過
 不時而
 傷此丸
 能令饑
 者飽饑
 者飽饑
 胃故也
 觀劑中
 消食止
 瀉洵神
 方爾

收之。此雖陽盛而不燥熱。乃是五藏虛損於內。故可益血收氣。此藥類
 象神品方也。

資生丸 健脾開胃。消食止瀉。調和藏府。滋養榮衛。王肯堂先生曰。余初
 識繆仲淳時。見袖中出彈丸咀嚼。問之曰。此得之祕傳。饑者服之即飽。
 飽者服之即饑。因疏其方。余大善之。而頗不信其消食之功。已於饑飽
 後。頓服二丸。徑投枕臥。夙興了無停滯。始信此方之神也。先恭簡年高
 脾弱。食少痰多。餘齡葆攝。全賴此方。因特附著於此。與世共之。

白朮 米泔水浸用山黃土拌蒸九次
 人參 去蘆人乳浸透飯
 白茯苓 飯鍋上蒸熟。晒乾。一兩五錢

橘紅 山查肉炒 神麴 二兩各 川黃連 薑汁

白荳蔻仁 微炒澤 瀉 三錢半 各 桔梗 米泔

真藿香 洗 甘草 蜜炙去皮 白扁豆 炒去殼

蓮肉 去心皮 薏苡仁 三兩 淨炒 乾山藥 炒 麥芽 麵炒

芡實 一兩五錢

末之。煉蜜丸。每丸二錢重。每服一丸。醉飽後二丸。細嚼。淡薑湯下。

楊氏還少丹 大補心腎脾胃。一切虛損。神志俱耗。筋力頓衰。腰脚沉重。肢體倦怠。血氣羸乏。小便渾濁。

乾山藥 牛膝酒浸 遠志去心 山茱萸去核

白茯苓去皮 五味子 巴戟酒浸 肉蓯蓉酒浸

石菖蒲 楮實 杜仲去粗皮薑汁酒拌同炒斷絲

舶茴香各一兩 枸杞子 熟地黃各二兩

此據寶鑑所定。攷楊氏原方。山藥、牛膝各一兩半。茯苓、茱萸、楮實、杜仲、五味、巴戟、蓯蓉、遠志、茴香各一兩。菖蒲、地黃、枸杞各半兩。右爲細末。煉蜜同棗肉爲丸。如桐子大。每服三十丸。食前溫酒。或鹽湯下。日三服。五日覺有力。十日精神爽。半月氣壯。二十日目明。一月夜思飲食。冬月手足常暖。久服令人身體輕健。筋骨壯盛。悅澤難老。更看體厚加減。如熱加山梔一兩。心氣不寧加麥門冬一兩。少精神加五味子一兩。陽弱加續斷一兩。常服固齒。無瘡瘻。婦人服之。容顏悅澤。煖子宮。

佐賢曰龜腹北能運任脈故取膏只取腹前之殼并去兩側以精其專在任也用人補身真陰虧損為治最切
* 佑賢曰鹿為陽獸氣通於督生無兩月角可廿斤陽氣

去一切病。

龜膠 治諸虛百損。精少髓枯。腎衰水道竭乏。血液乾涸。一切陰不足之證。

龜殼十斤。或數十斤。水浸五七日。視上黑皮浮起。即取刮淨純白。如灼過。以刀剝去焦跡。再洗淨。石臼中搗碎。入磁罈中包固。再坐大鍋中。隔水煮。水乾。旋以溫水添足。不斷火。一二晝夜。視板酥爛。汁稠。濾法板滓。將汁入錫鍋中。或磁鍋。桑火緩緩熬收。不住攪動。至滴水不散。用銅杓兜入磁器中。冷即成餅。每服不拘多少。滾水溫酒任化下。

鹿膠 治陽衰。形羸體瘦。少氣困乏。力減神疲。或精冷無子。及一切虛寒陽不足之證。

嫩鹿角不拘多少。寸截浸水數日。去粗皮。隔水煮如龜板法。服法亦同。但角堅硬。必煮一日。方搗碎。再入罈煮收如上。俱宜臘月水煮。庶膠經久不臭。若二膠合服。陰陽兩補。更妙也。

丹溪保和丸 見第七

固聚於頭此何速也且其易故凡真陽不足者用之為效頗捷若龜鹿合用名二仙膠

平胃散見第四

元戎逍遙散 治血虛勞倦。五心煩熱。肢體疼痛。頭目昏重。心怔煩赤。口

燥咽乾。發熱盜汗。減食嗜臥。及血熱相搏。月水不調。臍腹脹痛。寒熱如

瘧。又療室女榮衛不和。痰嗽潮熱。肢體羸瘦。漸成骨蒸。加山梔牡丹皮

白茯苓去皮 白朮炒 當歸 白芍藥炒

柴胡各一 甘草半兩

右咬咀。每服四錢。水一鍾。煨生薑一塊切片。煎至六分。去滓。熱服無時。

腎着湯。見第二

金匱腎氣丸見第六

寶鑑天真丹 治上焦陽虛。

沉香 穿心巴戟酒浸 藁 香炒 草 薢酒浸

葫蘆巴炒香 破故紙炒香 杜仲去絲 琥珀

黑牽牛鹽炒去鹽 官桂半兩

右十味為末。用清酒打糊為丸。如桐子大。每服五十丸。空心溫酒送下。

鹽湯亦可。

仲景小青龍湯見第六

仲景麻黃湯見第六

天王補心丸。寧心保神。益血固精。壯力強老。令人不忘。除怔忡。定驚悸。

清三焦。化痰涎。祛煩熱。療咽乾。育養心神。

人參去蘆五錢 當歸酒浸 五味子 麥門冬去心

天門冬去心 柏子仁 酸棗仁各一兩 白茯苓去皮

玄參 丹參 桔梗 遠志各五錢

生地黃四兩 黃連酒洗炒二兩

右爲末。煉蜜丸如桐子大。硃砂爲衣。每服二三十丸。臨臥燈草、竹葉煎湯下。

硃砂安神丸見第九

朱雀丸百一 治心腎不交。心神不定。事多健忘。

沉香半兩 茯神二兩

右爲細末。蜜丸如小豆大。飛硃砂爲衣。每服二十丸。食後用人參湯下。和劑人參養榮湯。治脾肺俱虛。發熱惡寒。肢體瘦倦。食少作瀉等證。若氣血虛而變見諸證。勿論其病。勿論其脈。但服此湯。其病悉退。

白芍藥

陳皮

人參

黃耆蜜炙

桂心

當歸

白朮

甘草炙各一錢

熟地黄

五味子炒杵

白茯苓去皮半兩

志去心五分

右薑棗水煎服。

失血脈證第五十二

諸病失血。脈必見芤。緩小可喜。數大可憂。

衛行脈外。榮行脈中。凡失血之病。脈中必空。故見芤象。若緩小不足。與病相宜。是可喜也。脈數而大。邪盛正衰。且爲火象。必燂真陰。誠爲大可憂者。

瘀血脈證第五十三

訖脈自來註家無所確指今以營衛中
外分疏
了然明
白

因病呈象四字
妙極脈
不應病
是真氣
不能動
病呈象
也其死
必矣

瘀血內畜。却宜牢大。沉小瀯微。反成其害。

血畜於內。瘀凝不行。瘀凝則脈大。不行則脈牢。亦因病呈象也。逐之使小。巢穴一空。而致新不難矣。宜桃仁承氣湯或丹皮紅花之類。設脈沉小瀯微。是病有餘而脈反不足。病有物而脈若無物。雖云瘀血。亦不過着於經絡。如仲景所云。榮衛氣傷。內有乾血之類。似非瘀畜於一處者。故脈見如斯。補之有礙。逐之不能。是反成其害也。宜大黃蟪蟲丸。

附方

仲景桃仁承氣湯見第二十

仲景大黃蟪蟲丸 結在內者。手足脈必相失。宜此方。然必兼大補劑瓊

玉膏之類服之。

- | | | | | | | | |
|----|----|-----------------------|----|----|----|----|----|
| 大黃 | 十分 | 當古以二錢半為 | 黃芩 | 二兩 | 甘草 | 三兩 | |
| 桃仁 | 一升 | 杏仁 <small>去皮尖</small> | 黃芩 | 十兩 | 芍藥 | 四兩 | |
| 乾漆 | 一兩 | 蟪蟲 | 一升 | 水蛭 | 百枚 | 蟬蟪 | 一升 |
| 蟪蟲 | 半升 | | | | | | |

右十二味。末之。煉蜜爲丸。小豆大。酒飲服五丸。日三服。

精濁脈證第五十四

遺精白濁。微瀼而弱。火盛陰虛。乳濡洪數。

腎主藏精。慾後方爲施泄。今或念動卽出。或無慾自遺。此皆腎虛不能藏攝故耳。宜知柏八味丸。河間白濁者。小便色白而濁。亦爲腎虛。胞冷不能分清所致。宜分清飲蓮子飲。革形屬精液。證屬脫亡。脈安得不微瀼而弱也。設見乳濡洪數之脈。乳濡固爲陰虛。而洪數實因火盛。火盛則精遺。火盛則便濁。似與腎之虛。胞之寒而不能藏。不能別者。大徑庭矣。臨診可忽乎哉。宜六味丸導赤散六一散之類。

附方

知柏八味丸。卽六味丸加知母黃柏。

河間秘真丸。治白淫。小便不止。精氣不固。或有餘瀝。及夢寐陰人通泄。

龍骨一兩。大訶子皮五枚。縮砂仁半兩。硃砂一分。研細留。

遺精白濁。固屬下焦。症候然由中焦脾土不運。以致脾精下陷。濕溜膀胱者。爲多臨症亦宜參看。精出精道。濁由窮道。二者有分別。

佑賢曰 治遺精 之方甚 多大概 不出於 三如有 夢而遺 者由思 想所致 乃心虛 不足也 無夢而 遺者由 多慾所 致腎精 不固也 醉飽勞 倦而遺 者乃清 氣不升 脾精不 運也從 此推之 則保真 自有要

右爲末。麵糊丸綠豆大。每服一二十丸。空心溫酒熱水任下。不可多服。

猪肚丸 治醉飽後遺精神效。

牡蠣極細另研白朮各四 苦參三兩

猪肚一具 膜煑極爛去油

右前三味。搗篩極細。同猪肚搗數百杵。令極勻。燥略增肚汁。丸如桐子大。每服五十丸。空心米飲送下。不但治遺精。即勞瘦者亦能肥也。

清心蓮子飲 見第四

草薢分清飲 治真元不固。不時白濁。或小便頻數。凝如膏糊等證。

益智仁 川草薢 石菖蒲 烏藥 各等

右咬咀。每服四錢。水一盞。入鹽一捻。煎七分。食前溫服。一方加茯苓甘

草。

六味丸 見第六

錢氏導赤散 見第四

六一散 見第四

法矣

三消脈證第五十五

三消之脈。浮大者生。細小微瀋。形脫可驚。

三消者。上中下也。渴而多飲為上消。素問氣厥論謂之膈消。宜金匱人參

白虎湯子加減三黃丸涼膈散酒黃連丸六一散之類消穀善饑為中消。素問脈要精微論謂

之消中。宜酒黃連丸大黃黃連渴而便數有膏為下消。素問氣厥論

謂之肺消。飲一溲二。後人又謂之腎消。宜六味丸固本丸婁全善亦云。

腎消者。飲一溲二。其溲如膏油。即膈消消中之傳變。總不外火燥真陰。

津液燥竭。自古論之者多矣。唯劉河間張戴人二論。辭義暢達。最為中

緊。茲錄於左。河間曰。五藏六府四肢。皆稟氣於脾胃。行其津液。以濡潤

養之。然消渴之病。本濕寒之陰氣極衰。燥熱之陽氣太盛故也。治當補

腎水陰寒之虛。而瀉心火陽熱之實。除腸胃燥熱之甚。濟身中津液之

衰。使道路散而不結。津液生而不枯。氣血和而不澁。則病自已矣。况消

渴者。因飲食服餌之失宜。腸胃乾涸。而氣不得宣平。或精神過違其度

消渴乃腎氣不周於胸也。始萌可療。久則腎水乾枯。虛陽獨治。十難一生者矣。

而耗亂之。或因大病。陰氣損而血液衰。虛陽慄悍。而燥熱鬱甚之所成也。若飲水多而小便多。名曰消渴。若飲食多不甚渴。小便數而消瘦者。名曰消中。若渴而飲水不絕。腿消瘦而小便有脂液者。名曰腎消。一皆以燥熱太甚。三焦腸胃之腠理。拂鬱結滯。緻密壅滯。復多飲於中。終不能浸潤於外。榮養百骸。故渴不止。小便多出。或數洩也。戴人之論。則曰火能消物。燔木則爲炭。燔金則爲液。燔石則爲灰。煎海水則爲鹽。鼎水則乾。人之心腎爲君火。三焦膽爲相火。得其平。則烹煉飲食。糟粕去焉。不得其平。則燔灼藏府。而津液耗焉。夫心火甚於上。爲膈膜之消。甚於中。爲腸胃之消。甚於下。爲膏液之消。甚於外。爲肌肉之消。上甚不已。則消及於肺。中甚不已。則消及於脾。下甚不已。則消及於肝腎。外甚不已。則消及於筋骨。四藏皆消盡。則心始自焚而死矣。故知消渴一證。調之而不下。則小潤小濡。固不能殺炎上之勢。下之而不調。亦旋飲旋消。終不能沃膈膜之乾。下之調之。而不減滋味。不戒嗜慾。不節喜怒。則病已而復作。能從此三者。消渴亦不足憂矣。二公此論。消渴之因證。可謂既

明且悉。不煩再解。但其脈浮大者。尙屬彌漫寬散。前河間云。使道路散而不結。津液生而不枯。氣血和而不澁。則病自已矣。然非彌漫寬散之氣機。不能得此不結不枯不澁之病機耳。故云浮大者生。若脈細小浮濇。則氣血之虛衰枯槁。不言可知。再加身體瘦悴。是謂形脫。卽戴人所云木爲炭。金爲液。石爲灰。水爲鹽。鼎水乾之義。形氣兩敗。豈直可驚已哉。

附方

金匱猪苓湯 治發熱渴欲飲水。小便不利。

猪苓

茯苓

阿膠

滑石

澤瀉各一兩

右五味。以水四升。先煮四味。取二升。去滓。內膠烱消。溫服七合。日三服。

仲景人參白虎湯見第四十三

子和加減三黃丸 治丹石毒。及熱渴。以意測度。須大實者方用。

黃芩春四兩夏秋六兩冬三兩

大黃春三兩夏一兩秋二兩冬四兩

黃連春四兩夏七兩
秋三兩冬二兩

右爲末。煉蜜丸如桐子大。每服十丸。服一月病愈。

和劑涼膈散見第十卷

和劑酒煮黃連丸 治伏暑發熱。嘔吐惡心。并治膈熱。解酒毒。厚腸胃。

黃連去鬚十斤
二兩好酒五斤

石將黃連以酒煮乾。研爲末。滴水丸如桐子大。每服三五十丸。空心熱

水送下。

六一散見第十四卷

大黃黃連瀉心湯 治太陽病。發汗。遂發熱惡寒。因復下之。心下痞。表裏

俱虛。陰陽血氣並竭。無陽則陰獨。復加燒針。因胸煩。面色青黃。膚瞶者。

難治。若色微黃。手足溫者。易愈。心下痞。按之濡。其脈關上浮者。

大黃二兩 黃連爲一兩
伊尹三黃湯

右剉如麻豆。沸湯二升漬之。須臾絞去滓。分溫再服。

六味丸見第十六卷

固本丸

葉氏加人參名

夫心生血。血生氣。氣生精。精盛則鬚髮不白。容

貌不衰。今人滋補血氣。多用性熱之藥。殊非其治。此方蓋用生地黃能生精血。用天門冬引入所生之地。熟地黃能補精血。用麥門冬引入所補之地。又以人參能通心氣。使五味併歸於心。

生地黃洗

熟地黃

洗再

天門冬去心

麥門冬

去心各

右爲末。煉蜜丸如桐子大。空心溫酒或鹽湯下三十丸。

知藥八味丸

見第五十四

小便淋閼脈證第五十六

小便淋閼。鼻頭色黃。濇小無血。數大何妨。

淋者。淋瀝不淨。閼者。閉塞不通。其證小便少而數。少腹弦急。痛引於臍。病原論皆謂腎虛膀胱熱之所成也。分有五種。曰石淋、勞淋、血淋、氣淋、膏淋。石淋者。淋而出石也。腎主水。水結則化爲石。腎虛爲熱所乘。熱則成淋。其病狀。小便則莖裏痛。尿不能卒出。痛引少腹。傍臍裏急。少石足

經云膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化焉。則能出矣。則知

小便出。甚者塞痛。令人悶絕。宜局方石燕丸之類。三氣淋者。腎虛膀胱熱。氣脹所爲也。膀胱合與腎爲表裏。膀胱熱。熱氣流入於胞。熱則生實。令胞內氣脹。則小腹滿。腎虛不能制其小便。故成淋。其狀膀胱小便皆滿。尿澁。常有餘瀝是也。亦曰氣癰。宜聖散之類。膏淋者。淋而有肥。狀似膏。故謂之膏淋。亦曰肉淋。此腎虛不能制肥液。故與小便俱出也。宜鹿角霜丸之類。勞淋者。謂勞傷腎氣。而生熱成淋也。腎氣通於前陰。其狀尿留莖內。數起不出。引小腹痛。小便不利。勞倦即發也。宜黃耆湯之類。血淋是熱淋之甚者。則尿血。謂之血淋。心主血。血之行身。通遍經絡。循環府藏。熱甚。則散失其常經。溢滲入胞。而成血淋也。宜立效散之類。五種之外。復有寒熱二種。寒淋者。其病狀先寒戰。然後尿是也。由腎氣虛弱。下焦受冷氣。入胞與正氣交爭。寒氣勝。則戰寒而成淋。正氣勝。則戰寒解。方得小便也。宜肉蓯蓉丸之類。熱淋者。三焦有熱。氣搏於腎。流入於胞。而成淋也。其狀小便赤澁。亦有宿病淋。今得熱而發者。其熱甚。則變尿血。亦有小便後。如小豆羹汁狀者。蓄作有時也。宜六一散。本事火府丹。導巢氏。

三焦膀胱合論
其義始
完此古
所未發

之說如此。恐未必盡然。大抵皆三焦氣化不及。熱迫膀胱。令水道涸滯之所成也。勞氣血膏石。雖分五種。其病機必因勞動火。火盛搏氣。甚及於血。血轉爲膏。膏轉爲石。自清而濁。自薄而厚。自柔而堅。自無形而漸有形。亦熬汁成膏。煮水結鹽之義。豈真有砂石出水藏哉。至若腎虛不能制肥液。更可笑也。歷考內經。并運氣等篇。肝心脾肺腎。小腸督脈。亦皆有此證。三焦膀胱病此者。爲獨多耳。夫三焦膀胱者。素問靈蘭秘典。雖列爲二。在三焦。則曰決瀆之官。水道出焉。在膀胱。則曰州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。三焦之下。卽接膀胱。一主藏。一主決。相爲依倚。故靈樞本藏篇云。腎合三焦。三焦膀胱者。腠理毫毛其應。又四時氣篇云。小腹痛腫。不得小便。邪在三焦約。取之太陽大絡。又五癃津液篇云。三焦閉不瀉。津液不化。不得滲膀胱。則下焦脹。又本輸篇云。膀胱者。津液之府也。少陽屬腎。腎上連肺。故將兩藏。三焦者。中瀆之府也。水道出焉。屬膀胱。是孤之府也。觀此。則知三焦膀胱。名雖二而實一。故古人刺灸之法。多取三焦穴。而不取膀胱。義可想矣。所謂少陽屬腎者。少陽正

內經云。飲入於胃。遊溢於脾。輪氣於上。脾氣散於肺。通於水道。調於肺。下觀此。則上中。有之一不。化則施。泄為難。觀此。論則微。底了。然矣。

指三焦手少陽。非足少陽也。即腎合三焦之變文。腎上連肺者。言以最下之腎。而相將於最上之肺。凡在兩藏之中者。俱在相將之內。此所以成一三焦也。况肺主氣而通調水道。三焦亦主氣而上下遊行。如是。則淋秘又不獨下焦為然。上中下之氣。有一不化。則不得如決瀆之水而出矣。熱乘津液。則水道不利。水道不利而有熱。必鬱蒸而外發黃色。見於鼻者。以鼻為肺竅耳。脈瀦小者。瀦滯微小而不滑利也。徵其正衰而無血。數大為火象。火證見之。又何妨乎。較之無血者。是為易治。

附方

局方石葦散。治腎氣不足。膀胱有熱。水道不通。淋瀝不宣。出少起數。臍腹急痛。蓄作有時。勞倦即發。或尿如豆汁。或便出砂石。

芍藥

白朮

滑石

葵子

瞿麥

石葦去毛

木通各二

當歸去蘆

甘草

王不留行各一

右為細末。每服二錢。空心煎小麥湯調下。日二三服。

三因石燕丸 治石淋。因憂鬱氣注下焦。結如食鹽。小便痛不可忍。或出砂石而後小便通。

石 燕火燒令通赤水中淬三石 葦去毛 瞿麥穗

滑石各一兩

右爲細末。麵糊丸桐子大。每服十丸。用瞿麥、燈心煎湯。食前送下。日二三服。甚卽以石葦去毛。瞿麥穗、木通各四錢。陳皮、茯苓各三錢爲末。每服三錢。以水一盞。煎七分。去滓服。

瞿麥湯 治心經蘊熱。小便赤澀痛。

瞿麥穗七錢 冬瓜子 茅根各半兩 黃芩去黑心六錢

木通二錢 竹葉一把 滑石二兩分作三帖

葵子二合

右除滑石外。粗搗篩。分作三劑。每劑用水三盞。煎二盞。去滓。入滑石末一貼。攪勻。食前溫服。

沉香散 治氣淋。多因五內鬱結。氣不舒行。陰滯於陽。而致壅滯。小腹脹

滿。便尿不通。大便分泄。小便方利。

沉香

石葦去毛

滑石

王不留行

當歸各半

葵子

白芍藥各半

甘草

橘皮各半

右為末。每服二錢。煎大麥湯下。

鹿角霜丸三因

治膏淋。

鹿角霜用嫩角連頂骨者。鋸作挺子。長三寸。洗了。用水桶內。浸夏三候。角酥。糜為度。輕瀉出。用清刀刮去皮。如雪白。放在篩子上。候自乾。微火焙之。其汁慢火煎膏。凝即角膠。候角極乾。為細末。即鹿角霜。

白茯苓

秋石各等分

右為細末。糊丸如桐子大。每服五十丸。米飲下。

兔絲子丸

兔絲子

去塵土。水淘淨。酒浸。控乾。蒸搗焙。

桑螵蛸炙。各半兩。

澤

瀉二錢

右為細末。煉蜜丸如桐子大。每服二十丸。空心清米湯送下。

黃耆湯

治腎虛癆勞淋。結澀不利。

黃耆二兩

人參

五味子

白茯苓去皮

旱蓮子

磁石火煨
醋淬

滑石各一
兩

桑白皮七錢

枳殼去瓢
炒

黃芩各半
兩

右搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。服無時。

補中益氣湯見第三十九

立效散 治小便淋閉作痛。有時尿血。下焦結熱。

瞿麥穗

山梔子炒

甘草各三
錢

右作一服。水二鍾。煎一鍾。食前服。

濟生小蘗飲子 治下焦結熱。尿血成淋。

生地黄四兩

小蘗根

滑石

通草

蒲黃炒

藕節

淡竹葉

當歸去蘆酒浸

山梔仁

甘草各半
兩

右咬咀。每服四錢。水一盞。煎八分。空心溫服。

肉蓯蓉丸 治冷淋

肉苁蓉酒浸切焙

熟地黄

山藥

石

斛去根

牛膝酒浸切焙

官桂去粗皮

檳榔各半兩

附

子炮去皮

黃耆各一兩

黃連去鬚七錢半

辛葉去苗

甘

草炙各二錢半

右爲末。蜜丸桐子大。每服二十丸。鹽酒下。

八味丸見第十六

六一散見第四

本事火府丹 治心經蘊熱。小便赤少。五淋瀝痛。

黃芩一兩 生乾地黄二兩 木通三兩

右爲末。煉蜜丸如桐子大。每服五十丸。木通煎湯下。

導赤散見第五

局方八正散見第四

醫燈續焰 卷六 小便淋瀝脈證第五十六

醫燈續焰

明 錢塘 王 紹 隆 著

明 錢塘 潘 楫 碩 甫 註

明 錢塘 王 佑 賢 聖 翼 評

鄞縣 曹 赤 電 炳 章 校

卷七

大便燥結脈證第五十七

大便燥結。須分氣血。陽數而實。陰遲而澁。

燥結一證。稍有分別。大抵血液少者多燥澁。氣火盛者多結滯。然而燥則必結。結則必燥。又似難為分別。但以脈合證。而屬氣屬血。自井然矣。氣火盛者。為陽脈。必有餘。故數實也。宜局方麻血。液少者為陰。脈必不足。故遲澁也。宜四物湯。東垣導氣血一判。而再審其因。有風燥。宜得五仁。皂莢丸。搜風火燥。宜大承氣湯。亡血燥。宜四物產後脫血燥。宜加人。諸藥出。

血出自各經產後脫血屬衝任脈虛二者大有分別

*今人但知有熱結而不知有寒結即仲景所謂陰結也選方亦妙若結而實不藥下之

參黃耆嘔吐傷液燥。宜四君子加麥冬五味之類汗後亡液燥。宜八珍湯之類腎虛液少燥。宜六味丸之類老年血衰燥。宜四物湯麻仁丸之類氣實壅盛結。宜六磨湯得效橘杏丸蘇麻粥之類氣虛不能傳送亦結。宜局方半硫丸枳散之類氣寒凝滯不行亦結。宜理中湯之類但宜以脈辨證以證求因而用藥擬方無餘蘊矣。

附方

和劑麻仁丸 治腸胃熱燥。大便秘結。

厚朴去皮薑炙 白芍藥 枳實熬炒各半斤 大黃蒸焙一斤

麻仁別研五兩 杏仁去皮尖炒五兩半

右為末。煉蜜丸如桐子大。每服二十丸。臨臥溫水下。大便通利則止。

四物湯見第二十一

東垣導滯通幽湯 治幽門不通。上衝吸門不開。噎塞氣不得上下。大便

難。脾胃初受熱中。多有此證。治在幽門。以辛潤之。

當歸身

升麻梢

桃仁泥

甘草各一錢

佑賢曰
津液雖
枯傳道
屬氣故
陳皮分
兩浮於
五仁

紅花少許 熟地黄 生地黄各五

水二盞煎一盞調檳榔末五分稍熱服。

得效五仁丸 治津液枯竭大腸祕澀傳道艱難。

桃仁 杏仁炒去尖 柏子仁半兩

松子仁分半錢二 郁李仁錢炒一 陳皮四兩另

右將五仁另研如膏入陳皮末研勻煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心米飲下。

得效皂角丸 專治有風人藏府祕塞大效。

猪牙皂角 枳殼去瓢 羌活 桑白皮

檳榔 杏仁去尖 麻仁另研 防風

川白芷 陳皮去白各

右爲末蜜丸如桐子大每服三五十丸白湯下蜜湯亦可。

聖惠搜風順氣丸 治三十六種風七十二種水去上熱下冷腰脚疼痛四肢無力多睡少食羸瘦顏色不完黃赤惡瘡下疳口苦無味增寒毛

佑賢曰

風因氣而見諸症者乃宜此方故云搜風順氣若無風何必搜氣不逆何必順今人則不審虛實一概用之也

聾。積年癰瘕氣塊。丈夫陽事斷絕。女子久無子嗣。久患寒瘧。吐逆瀉痢。變成勞疾。百節酸疼。小兒老人皆可服。補精駐顏。疎風順氣。

車前子二兩

白檳榔

火麻子微炒去殼另研郁李仁湯泡去皮研

兔絲子酒浸焙乾牛膝酒浸一宿

乾山藥各三兩

枳殼去穢炒

防風去叉獨活各一兩

錦紋大黃生半錢半熟

右爲末。煉蜜丸如桐子大。每服二十丸。酒茶米飲任下。百無所忌。早晨

臨臥各一服。服一月消食。二月去腸內宿滯。三月無倦少睡。四月精神

強勝。五月耳目聰明。六月腰脚輕健。一年百病皆除。老者返少。如服藥

覺藏府微動。以羊肚肺羹補之。久患腸風便血。服之除根。如顫語寒澁

及癰瘕。服之隨即平復。酒後一服。宿醒消盡。百病不生。孕婦勿服。

濟生菴蓉潤腸丸 治發汗利小便。亡津液。大腸秘。老人虛人皆可服。

肉苁蓉酒浸焙沉香另研一兩

右爲末。麻子仁汁打糊。丸如桐子大。每服七十丸。空心米飲下。

大承氣湯見第七

小承氣湯見第七

四君子湯見第六

八珍湯見第六

十全大補湯見第六

六味丸見第六

八味丸見第六

六磨湯 治氣滯腹急。大便秘澀。

沉香

木香

檳榔

烏藥

枳殼

大黃各等分

右各件熱湯磨服。

得效橘杏丸 氣秘老人。虛弱人。皆可服。

橘紅取末 杏仁去皮尖另各等分

右和勻。煉蜜丸如桐子大。每服七十丸。空心米飲下。

蘇麻粥 順氣。滑大便。

紫蘇子

麻子仁不拘多少

二味研爛。水濾取汁。煮粥食之。

黃耆湯 年高便秘宜服。

綿黃耆

陳皮去白各半兩

爲末。每服三錢。用大麻仁一合爛研。以水投取漿水一盞。濾去滓。於銀石器內煎。候有乳起。卽入白蜜一大匙。再煎令沸。調藥末空心服。此藥不冷不燥。其效如神。

六一散

見第四十四

局方半硫丸 年高冷秘虛秘。及痲痺冷氣。

半

夏錫洗七次焙乾爲細末

硫

黃明淨者研極細用柳木槌殺過

右以生薑自然汁同熬。入乾蒸餅末攪和勻。入臼內杵數百下。丸如桐子大。每服十五丸至二十丸。無灰溫酒。或生薑湯任下。婦人醋湯下。俱空心服。

枳實理中湯見第七

癲狂脈證第五十八

癲乃重陰。狂乃重陽。浮洪吉兆。沉急凶殃。

癲者顛也。謂發時顛倒。異於平日。語言錯亂。喜怒無因。或笑或歌。或悲或泣。神迷意惑。穢潔妄知。平日能言。發反沉默。平日沉默。發反多言。甚或行步不休。或復僵仆不起。俗呼為失心風。狂者剛暴猖狂。叫號罵詈。甚則踰垣上屋。蹈火赴湯。不避死生。不知飢飽。倍常勇力。若邪所憑。俗呼為發狂。二者證既不同。因當各異。古人多以顛狂混稱。亦疎略矣。蓋人身氣為陽。血為陰。府為陽。藏為陰。府之手足六經為陽。藏之手足六經為陰。形質可見者為陽。神志不可見者為陰。身半已上為陽。身半已下為陰。表為陽。裏為陰。凡此陰陽。俱各兩相依倚。互為交通。而後氣血和平。府藏安靜。經脈調勻。形神合一。上下無厥逆之虞。表裏無盛虛之變。如是則微疴小疾。亦無自而生。况癲狂乎。今癲云重陰者。謂偏重於陰也。邪入於陰。而陰實也。五藏為陰。神志舍於五藏。亦為陰。設或抑鬱

分陰陽之所屬
見之依倚
之交通
後發重
陰重陽
參以脈
症癲狂
殆無偏
義

不伸。謀思不遂。悲哀不置。佗僚無聊。久久藏神凝結。情識昏迷。靈明何有。此癲之成於神志者也。宜靈苑人參琥珀丸散歸脾一種因陽虛不能衛外。反下陷而附并於陰。附并於陰。則陰氣實。下而不上。則升降紊而癲疾作矣。即脈經所謂陽附陰則癲者是也。宜四逆散之類如補中益氣一種因三陽經從頭下行。三陰經不得從足上行而逆下。下則陰經實。亦似陽附陰之義。但此直指經脈之逆。經所謂癲疾厥狂。久逆之所生者是也。宜調其升降正其逆順如交感一種因內有畜血。令人如狂。或善忘。或如見鬼。如狂者。如狂而非狂。即癲狀也。血者。神明之府。血蓄不行。神機大礙。故見上證。血為陰。是亦重陰陰實之義。謂之邪入於陰亦可。宜抵當丸之類狂則反是。乃重陽陽實之證也。素問宣明五氣篇云。邪入於陽則狂。邪入陽。則陽實。陽實則熱盛。陽性主動。以盛熱而加以動性。猖狂剛暴。不言可知。又生氣通天論云。陰不勝其陽。則脈流薄疾。并乃動。巨陽少陽不動。不動而動大疾。此其候也。蓋言陽明之經脈常動。以

陽明爲水穀之海。其氣充盛。故常動。巨陽少陽之脈不動。言二經之氣。不如陽明之盛。故不動。不動者。非不動也。不如陽明之常動也。今無論常動者。卽不動者。亦常動而動。且大疾。是爲狂病之候。觀此。則狂病之爲重陽陽實明矣。與上文脈流薄疾。并乃狂。若出一義。又靈樞通天篇亦云。陽重脫。易狂。脫非陽脫。言重并於陽分。而若與陰脫離也。又靈樞本神篇云。肝悲哀動中。則傷魂。魂傷則狂。忘不精。肺喜樂無極。則傷魄。魄傷則狂。狂者意不存人。夫肝屬木。性上達而藏魂。故魂主升。陽也。悲哀而至於動中。則神情消沮。恍成秋金而剋木。木受剋。則肝氣傷。肝氣傷。則魂無所歸。而欲其精明不忘。不可得矣。宜升達如道遙散加鬱金。香附達志。扶神。木香之類。肺屬金。性收降而藏魄。故魄主降。陰也。喜樂而至於無極。則神情渙散。恍成夏火而剋金。金受剋。則肺氣傷。肺氣傷。則魄無所歸。一派浮陽。動成狂妄。又安能內照而意存人事哉。宜收斂如天王補心丹。朱雀丸。龍骨牡蠣。棗仁。扶神之類。又靈樞經脈篇云。陽明病至。則惡人與火。聞木聲。則惕然而驚。心欲動。獨閉戶塞牖而處。甚則欲上高而歌。棄衣而走。夫邪客陽明。則陽盛熱甚。

子和云
不知十
二經絡
開首動
手便錯
茲以經
絡如此
分疏精
詳極矣

人則增煩。火則助熱。故惡也。聞木聲而驚者。驚其相剋。故惕然心動也。閉戶塞牖。即惡人火之義。甚則欲上高而歌。棄衣而走者。以四肢為諸陽之本。熱實四肢。健於登躍。故能上高而歌。身表為諸陽之署。熱盛於身。意求涼爽。故欲棄衣而走。宜白虎湯承氣湯又靈樞大惑論云。衛氣不得入於陰。常留於陽。留於陽。則陽氣滿。陽氣滿。則陽蹻盛。不得入於陰。則陰氣虛。故目不瞑。又曰。衛氣留於陰。不得行於陽。留於陰。則陰氣盛。陰氣盛。則陰蹻滿。不得入於陽。則陽氣虛。故目閉也。其中言及二蹻者。以二蹻之脈。皆上會於目內眥。陽脈交於陰。則陰蹻盛。故目閉。陰脈交於陽。則陽蹻盛。故目開。靈樞癲狂篇。首敘目之內外及上下眥者。亦以癲則目閉。狂則目開。而明陰陽之所以不同也。是皆不易之理。然而兼痰兼火兼風者。當十之五。以三種兼證而較審之。則癲必多痰。而狂必多火多風也。痰則多滯九竅。九竅從陰從藏。九竅不利。故多癲。風火多淫四肢。四肢從府。從陽。四肢盛實。故多狂。陰陽分屬。二說覺更了然。痰宜養痰丸。星丸。火宜養火丸。青丸之類。其脈浮洪者。是為陽脈。陽狂得之。與證相宜。即陰

癲得之。亦從陰轉陽。自裏達表之象。故均爲吉兆。若沉而急。沉則入陰。迫裏。急則強急不柔。是無胃氣之脈也。不論狂癲。凶殃立至。又不獨脈爲然。而證亦不可忽者。故癲狂篇言嘔多沃沫。氣下泄者不治。又言癲發如狂者不治。蓋嘔多沃沫。脾敗。氣下泄。腎敗。脾腎二藏。爲人之先後二天。二藏已敗。自無生理。發如狂者。陰竭於內。陽散於外。脫根外越。燈滅忽明之象。亦主死。如是。則脈與證。又不可不參看也。

附方

靈苑辰砂散 治風痰諸癇。狂言妄走。精神恍惚。思慮迷亂。乍歌乍哭。飲食失常。疾發仆地。吐沫戴目。魂魄不守。

辰

砂一兩須光明者

酸棗仁半兩微炒

乳

香半兩光瑩者

右量所患人飲酒幾何。先令恣飲沉醉。但勿令吐。至靜室中。以前藥都作一服。溫酒調之。令頓飲。如飲酒素少人。但以隨量取醉。服藥訖。便安置床枕令臥。病淺者半日至一日。病深者至三兩日。令家人潛伺之。鼻息勻調。但勿喚覺。亦不可驚觸使覺。待其自醒。卽神魂定矣。萬一驚寤。

不可復治。吳正肅公少時心病。服此一劑。五日方寤。遂瘥。

歸脾湯 治因思氣結。因憂抑鬱。以致脾傷而心下痞悶。寤不得寐。右關脈結而大。或思慮傷脾。不能統血。而血衄妄行。或健忘怔忡。驚悸盜汗。或心脾作痛。嗜臥少食。大便不調。或肢體重痛。月經不調。赤白帶下。或思傷脾而患瘧痢等證。

人參

白朮

白茯苓

黃耆

龍眼肉

酸棗仁

遠志

當歸

木香

甘草

右加薑棗煎服。

人參琥珀丸 治失神狂亂。哀樂無由。驚悸不時。夜不能寐。一切恍惚不寧等證。

人參

琥珀

茯苓

白茯苓

石菖蒲

遠志

乳香

硃砂

酸棗仁

炒令香熟

各二錢半

小節密者

各半兩酒浸

另研

另研

溫酒浸半日去殼紙上

各二錢半

佑賢曰
心腎交
通黃婆
爲之媒
合也此
方巧在
用蒼朮
以運中
樞更巧
在服法

右爲細末。煉蜜丸桐子大。每服二十丸。食後溫酒下。日再服。如不能飲。棗湯下。

補中益氣湯見第三十九

仲景四逆散。寒熱論云。少陰病四逆。其人或欬或悸。或小便不利。或腹中痛。或泄利下重者。四逆散主之。

甘草炙 枳實炙乾 柴胡 芍藥

右四味各十分。搗篩。白飲和服方寸匕。日三服。

申先生交感丹。補虛損。固精氣。烏鬚髮。此鐵甕城申先生方也。久服令人有子。

蒼朮刮淨一斤分作四分用酒醋

川椒紅炒研

小茴香各四兩

又交感丹。凡人中年精耗神衰。蓋由心血少。火不下降。腎氣憊。水不上升。致心腎隔絕。榮衛不和。上則多驚。中則塞痞。飲食不下。下則虛冷遺精。愚醫徒知峻補下田。非惟不能生水。滋陰而反見衰悴。但服此方半

* 禡曰中
痞則上
下不交
痞塞通
而水得
升火得
降與運
樞而能
開闔之
義同

年。屏去一切暖藥。絕嗜慾。然後習秘固并流之術。其效不可殫述。俞通奉年五十一。遇鐵甕城申先生。授此服之。老猶如少。年至八十五乃終也。因普示羣生。同登壽域。

茯 神去皮木 香附子石一斤新水浸一宿擦去毛炒黃

為末。煉蜜丸。彈子大。每服一丸。侵晨細嚼。以降氣湯下。

降氣湯

香附子如上法 茯 神二兩 炙甘草半兩

為末。點沸湯服。前藥。

仲景桃仁承氣湯見第二十

代抵當丸見第二十

逍遙散見第五

天王補心丸見第五

朱雀丸見第五

仲景白虎湯見第四

仲景大承氣湯見第七

小承氣湯見第七

涼膈散見第九

紫雪 治發斑咽痛。及暑中三陽。脚氣煩躁。

升麻六錢 黃金十兩 寒水石 石膏各四兩

犀角 羚羊角各一兩 玄參六錢 沉香

木香 丁香各五錢 甘草八錢

用水五盞。先煮黃金至三盞。入諸藥。再煎至一盞。去滓。入芒硝三兩。二錢。慢火煎。以柳木攪不停手。候欲凝。入磁盆中。更下硃砂、麝香末。各三分。急攪令勻。候冷凝結成雪。每一錢。細細嚥之。

滾痰丸見第七

琥珀壽星丸局方用南星一斤。珠砂二兩。琥珀一兩。無猪心血。

天南星用一斤。細坑深二尺。用炭火五斤。於坑內燒熱。紅取出。炭掃淨。經一宿取出。再焙乾為末。 琥 珀 另研 硃 砂 一兩。研飛以

右和勻。猪心血三個。生薑汁打麵糊。攪令稠粘。將心血和入藥末。丸如桐子大。每服五十丸。用人參湯空心送下。日三服。

瀉青丸見第四十九

痼病脈證第五十九

痼病宜虛。實急者惡。浮陽沉陰。滑痰數熱。

狂乃氣并於陽。癲則氣并於陰。癲亦屬藏。因驚而得。非若癲之由鬱而成也。見症并然。義自無疑。

痼之始發。卒然跌仆。手足牽掣。口噤作聲。或吐沫痰涎。一飯頃。氣平甦醒。與癲瘖二證。似是而非。癲證則如上文所云。瘖證則多身強直。如弓反張。亦無痼證之作聲也。然有陰陽二種。正如小兒之急驚慢驚。陽痼先身熱。瘖瘖驚啼而後發。其脈浮洪。病屬六府。外在肌膚。輕淺易治。宜集驗龍腦安神丸。陰痼身冷。不驚掣。不啼叫。卒然而發。略無先兆。其河間犀角丸之類。陰痼身冷。不驚掣。不啼叫。卒然而發。略無先兆。其脈沉搏。病屬五藏。內在骨髓。深重難治。宜清心牛黃丸。昔賢皆謂有痰有熱。客於心胃之間。因聞大驚而作。若熱盛。雖不聞驚。亦作。是謂先有痰熱而後發痼也。恐未必然。總不如三因之論為的。其論以驚動藏氣。

不平。鬱而生涎。閉塞諸經。癰病乃成。或在母腹受驚。或感六氣。或飲食不節。逆於藏氣而成。蓋忤氣得之外。驚恐得之內。飲食得之屬不內外。所因不同。治法亦異。如驚者。安神丸以平之。挾痰者。三聖散以吐之。挾火者。清神湯以涼之。可下者。即以承氣湯下之。其脈總宜虛而不可實。實則邪盛。若實而急。是無胃氣。唯強急而不柔和。凶惡之徵也。浮則癰發于陽。沈則癰發於陰。滑則癰發多痰。數則癰發多熱。因病見脈。因脈知病。亦理之自然耳。

附方

龍腦安神丸

見第十九

河間犀角丸

見第二十五

清心牛黃丸

見第四十二

神應丹

治諸癰。

好辰砂

不拘多少

右細研猪心血和勻。以蒸餅裹劑蒸熟。就熱取出。丸如桐子大。每服一

丸。人參湯下。食後臨臥俱可。

三聖散

瓜

蒂揀淨炒

防

風去蘆各

藜

蘆聖惠方減用之或一

右爲麤末。每服約半兩。以薑汁三茶盞。先用二盞煎三五沸。去薑汁。次入水一盞。煎至三沸。却將先二盞同一處熬二沸。去滓澄清放溫。徐徐服之。以吐爲度。不必盡劑。

大承氣湯見第七

喉痺脈證第六十

喉痺之脈。數熱遲寒。纏喉走馬。微伏則難。

喉痺之症。須與咽痛並舉。二症相類。而治各異。喉嚨

痺者。閉也。閉塞不通之謂。乃火盛氣結。以致喉嚨腫脹。呼吸難通。壅塞痰涎。水漿不下一二日。卽能殺人。十二經脈。與經別多過於此。卽不然。亦在其前後左右也。有經脈過者。有經別過者。有經脈經別俱過者。如肺手太陰經脈。無過於此者。而經別篇則云手太陰之正。上出缺盆。循

者氣之所以上通於天氣下也。水穀之氣通於天氣。咽喉者。道也。氣通於地。會厭懸。雍舌本。口頰與咽喉相。關發病。皆爲喉。應故有。咽喉十。八症之。說此爲。生死急。症。慎不。可忽。此。先序經。之所過。而後分。症。妙甚。

喉嚨。大腸手陽明之脈。循缺盆。上頸貫頰。經別篇又云。上循喉嚨。胃足
陽明之脈。循喉嚨。入缺盆。經別篇又云。上循咽。出於口。脾足太陰之脈。
上膈夾咽。連舌本。經別篇又云。上結於咽。貫舌中心。手少陰之脈。上夾
咽。經別篇又云。上走喉嚨。出於面。小腸手太陽之脈。循咽下膈。其支者。
循頸上頰。而經別則無。膀胱足太陽之脈。自腦還出。別下項。經別篇又
云。直者從脊上出於項。腎足少陰之脈。循喉嚨。夾舌本。經別篇又云。直
者繫舌本。復出於項。心包絡手厥陰之脈。亦無過此者。而經別則云。手
厥陰之正。別屬三焦。出循喉嚨。三焦手少陽之脈。上項繫耳後。而經別
則無。經別雖無。其手厥陰之正。有別屬三焦。出循喉嚨者。以三焦與心
包爲配。故曰屬。屬則經脈相屬而合一也。膽足少陽之脈。下加頰車。下
頸。經別篇又云。足少陽上夾咽。出頤領中。肝足厥陰之脈。循喉嚨之後。
上入頡顙。而經別亦無。故靈樞第十篇諸經是動所生之病。有云頸腫
者。是手陽明有云。魋髑喉痺者。是手陽明有云。頸腫喉痺者。是手陽明
有云。舌強者是足太陰有云。舌本痛者是足太陰有云。噎乾者是足太陰有云。
本強者是足太陰有云。舌本痛者是足太陰有云。噎乾者是足太陰有云。

噬痛領腫者。是手太陽有云頸領腫者。是手太陽有云項痛者。是手太陽有云咽腫者。是少陰有云噬乾及痛者。是少陰有云噬腫喉痺者。是手少陽有云領痛者。是手少陽種種不同。總無外氣火二字。與本篇所云氣有餘。則當脈所過者熱腫。同一義也。宜黃芩枳殼連翹丹皮薄荷荆芥山梔防風牛蒡玄參黃藥黃連山豆根射干升麻生地甘草桔梗石膏等藥在臨症定在何經相宜者用。又不可純用寒涼須配輕散者斯善矣。然諸證之中。唯喉痺為急。而喉痺中。又唯以發於手少陰少陽二經者為最急。蓋喉主天氣。通呼吸。為生氣之門。火熱搏聚。則腫脹。腫脹則竅閉。竅閉則氣塞。氣塞則痰涎壅。愈壅愈塞。愈塞愈壅。呼吸亦將從此而斷。況少陰君火。少陽相火。火性速而炎上。較之他經。不更烈乎。故一二日。即成不治。唯鍼刺出血。以瀉其實。探吐痰涎。以決其壅。皆倉卒治標之妙法也。刺腫虛出血。以探吐其脈多數。數則為熱。故耳。間有脈遲者。乃是外寒襲經。經氣不利。鬱滯於所過之處。故亦為痺。外則兼表證。內亦不如數熱之腫痛。此不但忌用寒涼。而且當溫散也。更有一種纏喉風。或麻或癢。又腫又痛。纏綿於內。腫達於外。一種走馬喉痺。須臾之間。痛而腫。腫而閉。閉而氣

絕。暴發暴死。如走馬然。二者俱火中挾風。火性烈。風性疾。風火交煽。故發病凶暴如此。此等證惟其脈應浮大洪數。而反見微伏。是正衰邪盛。補瀉罔從。欲其生也。不亦難乎。

附方

和劑甘桔湯 治風痰上壅。咽喉腫痛。吞吐有礙。

苦桔梗一兩 炙甘草二兩

每服三錢。水一盞。煎七分。食後溫服。

三因荊芥湯 治咽喉腫痛。語聲不出。嚥之痛甚。

荊芥半兩 桔梗二兩 甘草一兩

右剉散。每服四錢。水一盞。薑三片。煎六分。去滓溫服。

和劑解毒雄黃丸 治纏喉風。及急喉痺。卒然倒仆。牙關緊急。不省人事。

雄黃研飛 鬱金各一兩 巴豆去皮出油

右爲細末。醋煮麵糊爲丸。如綠豆大。熱茶清下七丸。吐出頑痰立甦。如未再服。如至死者。心頭猶熱。灌藥不下。卽以刀尺鐵匙。斡開口灌之下。

咽無有不活。如小兒驚熱。痰涎壅塞。或二丸三丸。量大小加減。一法用雄黃丸三粒。醋磨化。灌之尤妙。其痰即瘥。

寶鑑碧玉散 治心肺積熱。上攻咽喉。腫痛閉塞。水漿不下。或喉痺、重舌、木舌、腫脹。皆可服。

青黛

盆硝

蒲黃

甘草各等分

右爲細末。研勻。每用少許。吹入咽喉內。細細嚥下。若作丸。用砂糖爲丸。每兩作五十丸。每服一丸。嚥化嚥下。

寶鑑開關散 治喉風氣息不通。

白僵蠶絲妙去

枯白礬各等分

右爲細末。每服三錢。生薑蜜水調下。細細服之。

瓜蒂散見第四十八

寶鑑備急如聖散 治時氣纏喉風。漸入咽喉。閉塞水穀不下。牙關緊急。不省人事。

雄黃細研

藜蘆

白礬飛

猪牙皂角去皮

右等分。爲細末。每用一豆大。鼻內嚙之。立效。

咽喉急備丹

青黛

芒硝

白殭蠶各一兩

甘草四兩

右爲細末。用臘月內牛膽有黃者。盛藥其中。陰四十九日。多時爲妙。

寶鑑增損如聖散

治風熱攻衝會厭。語聲不出。咽喉妨悶腫痛。

桔梗二兩

甘草半兩

枳殼湯浸去穰二錢半

防風半兩

右爲細末。每服三錢。水一大盞。煎至七分。去滓。入酥如棗許。攪勻。食後

溫服。

瑞竹羅青散 治單雙乳蛾。

蒲黃五錢

羅青

盆

硝研各三錢

甘草二錢

右爲細末。每服一錢。冷蜜水調。細細嚙之。吞不下。雞翎蘸藥。喉內掃之。

立效。

燒鹽散 治懸雍垂長。咽中妨悶。

燒鹽枯礬研細。各等分。和勻。以筋頭點之。即消。

四七湯

見第七

四味湯 治咽喉中如有物。嚥吐不利。

半

夏 以生薑汁浸一宿。湯浸切洗。

厚

朴 刮去粗皮。以生薑汁浸炙黃。

陳橘皮

以湯浸去白。焙各一兩。

赤茯苓

刮去黑皮。二兩。

右剉碎。每服三錢匕。水一盞。入生薑一棗大擘碎。煎六分。去滓。食遠溫服。

白礬散 治急喉閉。

白

礬三錢

巴

豆 作二個。去殼。

右將礬於銚內慢火熬化為水。置巴豆於內候乾。去巴豆。取礬研為末。每用少許。吹入喉中。立愈。

醫燈續焰

明 錢塘 王 紹 隆 著

明 錢塘 潘 楫 碩 甫 註

明 錢塘 王 佑 賢 聖 翼 評

鄞縣 曹 赤 電 炳 章 校

卷八

眩暈脈證第六十一

諸風眩暈。有火有痰。左澀死血。右大虛看。

眩者。目乍黑乍明。眈眈不定也。暈者。頭昏目旋轉。岑岑欲倒也。高巔而

見動象。風性爲然。故眩暈者多屬諸風。或兼見惡風垣垣羌活等證。脈應浮

又不獨一風也。有因於火者。有因於痰者。有因於死血者。有因於虛者。

夫火性上炎。衝於巔頂。動搖旋轉。不言可知。或兼見心煩口燥面赤耳

宜涼膈散散防風通聖散之類。胸中痰濁。隨氣上升。頭目位高而空明。清陽所注。滑濁

經云治
病必求
其本本
者因也
茲據症

辨因精
悉無遺

之氣。擾亂其間。欲其不眩不暈。不可得矣。或兼見吐痰。宜東垣半夏白朮天麻湯之類。諸陽上行於頭。諸脈上注於目。血死。則脈凝泣。脈凝泣。則上注之力薄矣。薄則上虛而眩暈生焉。其脈左手必澀。澀為滯澀。徵死血之不流利也。或兼見脇痛。喜忘。目黃。便黑等證。宜四物湯。丹皮。紅花。桃仁之類。又為枯澀。徵血液之不足也。謂之血虛。眩暈亦可。物宜四脈必徵於左者。以左心主血。肝藏血。腎主液。為血之源耳。頭以法天。諸陽之首。又云清陽出上竅。而目在其中。清陽者。氣也。氣不足。則不能上達。以致頭目空虛。而眩暈時時作矣。其脈右手必大而無力。散漫空鬆之象也。謂之氣虛。眩暈亦可。脈必徵於右者。以右肺主氣。脾生氣。命門火。為氣之根耳。宜補中益氣湯。

附方

芎藭散 治風頭旋。眼目昏痛。眩暈。倦怠心忪。

芎藭

前胡

白殭蠶炒

人參各一

蔓荊子

天麻酒浸

防風去叉各

右為末。每服二錢。食後溫酒調下。

佑賢曰
眩暈乃
頭目之
病方中
不用甘

葦者恐
留中而
不上也

東垣羌活湯 治風熱壅盛。上攻頭目昏眩。

羌活

防風

黃芩酒洗各一兩 柴胡七錢

黃連酒煮一兩

黃蘗酒炒

瓜蒌酒洗各半兩 甘草七錢

白茯苓五錢 澤瀉三錢

右爲粗末。每服五錢。水煎取清。食後或先臥。通口熱服之。日二服。

涼膈散見第九

防風通聖散見第四

右散賈同知崔宣武劉庭瑞及河間者共四方。其中藥品增減。分量多寡。俱不相同。但河間適中。選用當從之也。

半夏白朮天麻湯見第二

滾痰丸見第七

玉液湯 治七情所傷。氣鬱生涎。隨氣上逆。頭目眩暈。心嘈忪悸。眉稜骨痛。

半夏肥大者六錢湯洗七次切作片

右作一服。水一鍾半。生薑十片。煎至八分。去滓。入沉香末少許。不拘時溫服。

四物湯見第二十一

補中益氣湯見第三十九

頭痛脈證第六十二

頭痛多弦。浮風緊寒。熱洪濕細。緩滑厥痰。氣虛弦栗。血虛微瀋。腎厥弦堅。真痛短澀。

弦為陰脈。斂直而無抑揚之勢。乃陽虛不能張大。或致外邪所乘。况頭乃六陽所乘。邪束於外。陽鬱於中。安得不痛。故頭痛者多弦。多弦者。不皆弦也。亦有脈浮而痛者。屬風。風性飄蕩。虛浮也。兼見惡寒。仲景桂枝湯皆弦也。亦有脈浮而痛者。屬風。風性飄蕩。虛浮也。兼見惡寒。仲景桂枝湯散之類。茶調脈緊而痛者。屬寒。寒性收斂。緊實也。兼見惡寒。仲景麻黃丸丸味羌活。脈洪而痛者。屬熱。熱性充盛。洪大也。兼見惡熱。面赤口乾等湯之類。活。脈細而痛者。屬濕。濕性滲衍。濡細也。兼見惡寒。面赤口乾等神芎丸二仙散對金散之類。脈細而痛者。屬濕。濕性滲衍。濡細也。兼見惡寒。面赤口乾等

難經云
手三陽
之脈受
風寒伏
留而不
去者為
厥頭痛
以手三
陽之脈
不入連
在腦也

黃等證宜奇效芎朮湯半夏白朮脈緩滑而痛者屬痰。痰乃凝水結液。
天麻湯或瓜蒂散或紅豆散。播鼻脈緩滑而痛者屬痰。痰乃凝水結液。
停蓄不流。故替替然緩滑也。玉壺丸半夏白朮天麻湯等證宜局方脈弦奕
而痛者屬氣虛。氣虛則弦斂奕弱而無鼓動之力。四象見惡寒喜暖而空暈
微體倦等證宜補中益脈微瀋而痛者屬血虛。血虛則微弱澀滯而有
氣揚六君子湯之類。脈微瀋而痛者屬血虛。血虛則微弱澀滯而有
乾燥之象。兼見面白口乾頭兩側痛甚而兼暈痛加脈弦堅而痛者屬
腎。腎氣厥逆不能接引膀胱。膀胱經氣壅遏上實下虛。顛為之痛。脈亦
弦直而堅實也。即靈樞經脈篇所云膀胱是動則病衝頭痛。難經六十
難所云厥頭痛者是也。兼見頭重暈腰痛少腹裏急上熱下寒。難經單
言手三陽而不及足三陽。恐未盡善。素問五藏生成篇云。頭痛顛疾。下
虛上實。過在足少陰巨陽。甚則入腎。此正指膀胱厥痛不已。甚則入腎
而為真頭痛也。其痛連腦盡痛。齒亦痛。蓋腎主骨主髓。髓以腦為海。而
齒則骨之餘也。其脈短瀋者。短則陽脫於上。瀋則陰衰於下。若手足厥
寒至節者。必死不治。此等證若欲治之。非猛進烏附之藥。雖然。頭痛又
不止此數種。六府之清陽固上升。而五藏之精華亦上注。外有六淫之

若太陽
便入絡
腦

侵。內有經絡之逆。使隧道壅遏。清陽混淆。而痛作於頭顙者多矣。故五藏六府皆能病此。但宜細察其脈。與兼見之證。以別其藏府陰陽寒熱虛實而施治焉。則萬舉萬當矣。

附方

桂枝湯見第九

玄珠茶調散見第二

麻黃湯見第六

九味羌活湯見第六

瀉青丸見第四

二仙散即茶調散

大黃

黃芩各二兩

牽牛

滑石各四兩

右為細末。滴水為丸。如小豆大。溫水下十五丸。每服加十丸。以利為度。日三服。

對金散 治偏正頭風。

大黃

黃芩各等分

右二味。為極細末。每服四分。臨睡用好酒調下。仍飲酒盡量一醉。散髮露頂臥。令人扇頭數百扇。蓋煖。睡至明日病失矣。不愈再一服如前法。須大醉。扇透。百發百中。

神芎丸見第七

涼膈散見第九

奇效芎朮湯

治濕頭痛。眩暈痛極。

川芎

附子生去

白朮已上各錢桂心去皮

右作一服。水二鍾。生薑七片。棗二枚。煎至一鍾。食遠服。

半日白朮天麻湯見第十二

瓜蒂散見第四

頭重紅苴散

麻黃根炒半錢

苦丁香半錢

紅豆十粒

羌活

連翹各三錢

右五味爲細末。鼻內搐之。

和劑玉壺丸 治風痰吐逆。頭痛目眩。胸膈煩滿。飲食不下。及咳嗽痰盛。嘔吐涎沫。

天南星 生

半 夏 生 各一兩

天 麻 半兩

頭白麵 三兩

右爲細末。滴水爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。用水一大盞。先煎令沸。下藥煮五七沸。候藥浮卽熟。漉出放溫。別用生薑湯下。不計時候服。

補中益氣湯 見第三十九

六君子湯 見第十六

四物湯 見第二十一

逍遙散 見第五十一

六味丸 見第十六

八味丸 見第十六

心腹痛脈證第六十三

細述兼
見之症
病無遁
情

心腹之痛。其類有九。細遲從吉。浮大延久。

心腹之痛。其類甚多。此僅言有九者。亦舉其要耳。曰飲。曰食。曰風。曰寒。

曰熱。曰悸。曰蟲。曰忤。曰疰。飲者。痰飲也。痰飲留中。清陽淆濁。故痛。氣喘見

否悶等證。其脈滑宜二陳湯丹。食者。食物也。食物停積。氣礙不行。故痛。氣喘見

或勉食寒涼。餒敗之物。擾亂中和。亦痛。其脈見脹滿宜加味枳朮丸。食等證

平胃散。風者。風邪也。乘虛內干。邪正相搏。故痛。其脈見自汗惡風等證。其

之類。寒者。寒邪也。乘虛內襲。榮脈凝泣。故痛。其脈見惡寒五積散。蘇合香丸。證

類熱者。火也。火鬱不發。薰蒸於中。故痛。其脈見惡熱五積散。蘇合香丸。證

左金丸。悸者。心中動悸也。中氣空虛。乍有所觸。不能持定。故痛。其脈見

恍惚等證。其脈虛微。痛而欲按。宜黃耆蟲者。蟲積也。飲食不節。寒熱不

時。以致蟲動。蟲動則攻衝上下。故痛。或見面黃白。或痛處動。欲吐清水。其

脈大小不勻。宜萬應丸。集效丸。之類。蕪忤者。客忤也。不正之邪。一時干忤。

散。仲景烏梅圓萬應丸。集效丸。之類。蕪忤者。客忤也。不正之邪。一時干忤。

亂其清道。撓其運機。故痛。等證。其脈數動。宜蘇合丸。備急丸。紫金錠。九

此症用
瓦礫子
一味煨
為末湯
服甚妙

人所傳。即傳尸氣也。兼見骨蒸吐血。效驗勞損。諸證用之。脈微。外有瘀血。痛厥心痛。真心痛三種。瘀血痛者。痛在胃脘。或熱飲食。或極嘔吐。致傷胃脘。絡血迸溢。瘀留於中。氣為所礙。或作或止。或食下痛甚。或飲湯水作呃。其脈瀋。宜二陳湯。桃仁。紅花。五靈脂。玄。厥心痛者。因諸藏府經絡。有循胃口上膈者。陰肺。太有絡肺下膈者。大腸。明。有下膈。屬胃絡脾者。陽。明。有從胃別上膈注心中者。陰脾。太有絡心下膈抵胃者。小腸。太。有夾脊者。足太陽。有絡心注胸中者。陰腎。少。有起於胸中。出屬心包絡下膈者。厥。手。包絡心有布膻中。散絡心包下膈者。三焦。少。有下胸中貫膈者。足少。有夾胃上貫膈。布脇肋者。陰肝。厥。有循腹裏上關元者。奇經。有並於脊裏者。奇經。督有夾臍上行。至胸中而散者。奇經。有入裏維絡諸陰者。奇經。是諸藏府經絡。及任督衝維之脈。氣有厥逆。則經有偏盛。而當脈所過。如胃口。胸膈。心包膻中。脊脇。臍腹等處。隨經相引而痛。乃諸經之痛。豈心痛哉。諸經之痛。則隨經有兼見之證。如肺經痛。惡寒。氣急。脹滿。引缺盆。宜參蘇飲。香蘇散。蘇合丸。之類。大腸痛。上引臍。寒。腸鳴。口乾。宜四七湯。枳桔二陳湯。之類。脾痛。引胃脘。心下腹。腹善噫。善嘔。食不下。宜二陳湯。溫胃湯。來復丹。之類。脾痛。引胃脘。心下腹。腹善噫。善嘔。食不下。宜二陳湯。溫胃湯。

不控引他處但
之義盡矣此所
以為真心痛

砂平胃散理中湯來復丹之類小腸痛引膈胃腸鳴宜二陳湯四七湯
蘇合丸之類膀胱痛引腰脊惡寒宜參蘇飲東垣天合烏藥散腎痛引
胸中腰脊心如飢上氣喝喝而喘善惡宜半硫丸烏藥順氣散之類心
包痛引包絡胸膈胸膈支滿心動心煩喜笑宜二陳湯鐵鑊先生交感
丹之類三焦痛引心包膈中耳鳴宜二陳湯小柴胡湯之類肝膽痛引膈胃
脇肋口苦善太息振寒宜二陳湯溫膽湯小柴胡湯之類肝膽痛引膈胃
脇肋口苦善太息振寒宜二陳湯溫膽湯小柴胡湯之類肝膽痛引膈胃
陳湯四七湯來復丹之類真心痛者真藏痛也蓋心為一身君主神明
所居邪不易侵病不易及必也真藏自虛神明失守致心包厥痛之邪
乘虛而入難經言其痛甚但在心但在心則毫不控引他處必兼見神
昏舌短手足青冷斯為旦發夕死夕發旦死之真心痛耳已上諸痛若
脈見細遲是氣減舒徐厥邪衰退之象理應從吉設或大浮知邪方盛
况心腹裏證而得表脈更非所宜雖不至於殞軀亦難愈也

附方

二陳湯

見第六

丹溪海蛤丸 治痰飲心痛。

海蛤 燒為灰研極細過

瓜蒌仁 帶殼同研

右以海蛤入瓜蒌內乾濕得所為丸每服五十丸。

前胡半夏湯 治痰盛。

前胡

半夏薑製

茯苓錢各二

陳皮

木香

紫蘇

枳殼

甘草錢各一

右作一服。水二鍾。生薑三片。烏梅一個。煎一鍾。食遠服。

正傳加味枳朮丸 治痰積、食積、酒積、果積、食積、肉積。在胃脘當心而痛。

及痞滿惡心。嘈雜噯氣。吞酸吐嘔。脾疼等證。

白朮三兩

枳實黃熟炒

蒼朮三兩

豬苓去黑

麥蘖麴黃炒微

半夏湯泡透

瀉去毛

赤茯苓去皮

川芎

黃連陳壁土

白螺殼煨各錢各

縮砂仁

草豆蔻

黃芩陳壁土

青皮去白

萊菔子炒

乾生薑錢各七

陳皮去白

香附米浸便

神麴黃炒微

瓜蒌仁

厚朴薑製

檳榔錢各三

木香

甘草錢各二

吞酸加吳茱萸湯泡。寒月五錢。熱月二錢半。久病挾虛。加人參、白扁豆、

石蓮肉。各五錢。時常口吐清水。加炒滑石一兩。牡蠣五錢。右爲細末。用青荷葉泡湯浸晚粳米。研粉作糊爲丸。如桐子大。每服七十丸。多至百丸。清米飲送下。

香砂平胃散見第四

香蘇散見第四

參蘇散見第七

五積散見第七

蘇合香丸見第八

統旨清中湯 治火痛。

黃連 山梔炒各二錢

陳皮 茯苓各一錢半

半夏一錢薑湯 草豆蔻仁搗碎 甘草炙各七分

水二鍾。薑三片。煎八分。食前服。

越鞠丸見第四

左金丸見第九

黃耆建中湯

見第二十一

補中益氣湯

見第三十九

六君子湯

見第十六

金匱九痛丸 治九種心痛。

附子炮二

生狼牙炙香

巴豆去皮心炒研

人參

乾薑

吳茱萸各一

右爲末。煉蜜丸如桐子大。酒下。強人初服三丸。日三服。弱者二丸。兼治卒中惡腹脹。口不能言。又治連年積冷。流注心胸痛。併冷腫上氣。落馬墜車血疾等證。皆主之。忌口如常法。

神效剪紅丸 專取一切蟲積。神效無比。凡人百病。皆人飲酒過度。食傷生冷。致使脾胃不和。心膈脹滿。嘔惡咽酸。常吐清水。面色痿黃。不進飲食。山嵐瘴氣。水腫蠱脹。麴黠欬嗽。痰涎壅滯。酒積食積。氣積氣塊。翻胃噎膈。嘔逆惡心。腸風痔漏。藏毒酒痢。累蘊積熱。上攻頭目。下生瘡癬。婦人血氣寒熱往來。肌體羸弱。月經不調。赤白帶下。鬼氣鬼胎。產後諸疾。

佑賢曰
攻積劑
須用此
等有力
藥始能
奏效然
方兼
到極

小兒五疳蟲積。誤吞銅鐵。惡食惡毒等物。並宜服之。每服五更雞鳴時。用冷茶清吞下。更用馬桶盛糞於野地看之。庶見藥易辨。或蟲或積。或如魚凍。或作五色等積。若一次未見蟲積。更看第二三次下來。此即是病根。有積消積。有氣消氣。有蟲取蟲。有塊消塊。若病根去。其病自消。若病淺。即一服見效。若源深。更須再一服。能宣導四時蘊積。春宣積滯。不生瘡毒。夏宣暑濕。不生熱痢。秋宣痰飲。不生瘰癧。冬宣風寒。不生瘟疫。此藥溫和。不動元陽真氣。亦無反惡。小兒半服。孕婦休服。其效如神。

一上末 檳榔生研細。取淨末一斤。以二兩為母。餘十四兩。上第一次。以一等羅篩過。取齊晒乾。

二上末 商陸。即樟柳根。白者可用。赤者殺人。金毛狗脊。貫衆。各四兩。已上三味。和一處研極細末。上第二次。以二等羅篩過。取齊晒乾。又方不用貫衆。則蟲出來。猶未死也。

三上末 三稜醋煮。莪朮醋煮。各八兩。青木香。西木香。各四兩。雷丸醋煮。二兩半。南木香。二兩。已上六味。和一處研極細末。上第三次。以三

等羅篩過。取齊晒乾。

四上末 大黃鋤碎。酒浸晒乾。研細。取淨末一斤。上第四次。以四等羅篩。取齊晒乾。

五上末 黑牽牛。半生半炒。研細。取頭末。淨一斤。上第五次。以五等羅篩過。取齊晒乾。又方有枳殼一斤。爲母。有蘘香四兩。和入諸藥。

右作五處。另研極細末。要作五次。

茵陳半斤。大皂角一斤。煎汁濾淨。法水爲丸。如綠豆大。晒乾。後用丁香末一兩。或加蘆薈末一兩。亦妙。以前淨汁煎一滾。洒入丸藥。旋搖令光瑩爲度。再以阿膠二兩。以前汁熬溶。洒入丸藥。旋搖光瑩。晒乾。壯人每服五錢。弱人每服四錢。更以茶清吞下。小兒減半。

蕪荑散 治大人小兒。虻咬心痛。經云。蟲貫心。則殺人。欲驗之。大痛不可忍。或吐青黃綠水涎沫。或吐蟲出。發有休止。此是虻心痛也。宜速療之。

蕪荑

雷

丸

各半

乾

漆

煙

盡

一

兩

右爲細末。每服三錢。溫水七分。盪調和服。不拘時。甚者。不過三服。小兒

每服半錢。

仲景烏梅圓

烏梅三百枚

細辛六兩

乾薑十兩

當歸四兩

黃連一斤

附子六兩炮蜀椒四兩

桂枝六兩

人參六兩

黃蘗六兩

右十味。異搗篩。合治之。以苦酒浸烏梅一宿。去核蒸之五升米下。飯熟。搗成泥和藥。令相得。內臼中。與蜜杵二千下。圓如梧桐子大。先食飲服十圓。日三服。稍加至二十圓。禁生冷滑物臭食等。

萬應丸 取蟲積神效。

黑牽牛取頭

大黃

檳榔各八兩

雷丸醋煮

南木香各一兩

沉香五錢

右將黑牽牛、大黃、檳榔和一處爲末。以大皂角、苦練皮各四兩煎汁。法水爲丸。如綠豆大。後以雷丸、木香、沉香和一處研末爲衣。每服三四十丸。五更用砂糖水送下。或作末服亦可。

集效丸 治因藏府虛弱。或多食甘肥。致蛔蟲動作。心腹絞痛。發則種聚。往來上下。痛有休止。腹中煩熱。口吐涎沫。是蛔蟲。宜服此藥。若積年不瘥。服之亦愈。又治下部有蟲。生痔癢痛。

木香

鶴虱炒

訶子

去核裏煨

檳榔

榔

蕪荑炒

附子皮臍去

乾薑

各七錢半

大黃

半兩

烏梅

去核十四箇

右爲末。煉蜜丸如桐子大。每服三四十丸。食前用陳皮湯下。婦人淡醋湯送下。

備急丸

見第三十五

紫金錠

一名玉樞丹。一名神仙解毒萬病丹。治一切藥毒。菰子毒。鼠莽

毒。惡菌蕈。金石毒。喫疫死牛馬肉毒。河豚毒。時行瘟疫。山嵐瘴癘。忽喉閉。纏喉風。脾病黃腫。赤眼瘡癰。衝冒寒暑。熱毒上攻。或自縊溺水。打撲損傷。癰疽發背。未破魚臍瘡腫。湯火所傷。百蟲鼠犬蛇傷。顛邪狂走。鬼胎鬼氣。並宜服之。凡人居家。或出入。不可無此藥。真濟世衛家之寶。如

毒藥嶺南最多。若遊宦嶺表。纔覺意思不快。便服之即安。二廣山谷間。有草曰胡蔓草。又名斷腸草。若人以急水吞之急死。緩水吞之緩死。又取毒蛇殺之。以草覆之。以水灑之。數日苗生其上。取爲末。酒調以毒人。始亦無患。再飲酒。即毒發立死。其俗淫婦人多自配合。北人與人情分相好。多不肯逐。北人回。陰以藥置食中。北人還。即戒之曰。子某年來。若從其言。即復以藥解之。若過期不往。必死矣。名曰定年藥。北人屆時至。故誌之。若覺中毒。四大不調。即便服之。或以猪犬魚羊鵝鴨等肉下藥。復食此物。即觸發其毒。急服此藥一粒。或吐或利。隨服便瘥。昔一女子久患勞瘵。爲屍蟲所噬。磨一粒服之。一時久吐下小蟲千餘條。一大者。正爲兩段。後只服蘇合香丸。半月遂服如常。至牛馬六畜中毒。亦以此救之。無不效。

山茨菰南北處處有之俗名金燈籠葉似韭花似燈籠色白上有黑點結子三稜二月開花結子四月初苗枯即挖地得之遲則苗腐爛難尋矣與有毒老鴉蒜極相類但蒜無毛茨菰上有毛包裹宜辨去皮洗極淨焙乾二兩

川文蛤一名五倍子槌破洗刮內淨焙乾二兩

千金子

一名續隨子去殼揀色極白者用紙包裹換紙研數十次去盡油以色白再研紙無油成霜爲度一兩

麝

香細揀盡血毛皮殼研淨三錢

紅芽大戟

杭州紫大戟爲上江南土大戟次之去蘆根洗極淨焙乾一兩半北方綿大戟色白者大峻利反能傷人弱人服之

有吐血者慎之

右各研爲細末和勻。以糯米粥爲劑。每料分作四十粒。於端午重陽七夕合。如欲急用。辰日亦可。於木臼中杵數百下。不得令孝婦人孝子。不具足人雞犬之類見之。切宜祕惜。不可廣傳。輕之無效。如癰疽發背未破之時。用冷水磨塗痛處。并磨服。良久覺癢立消。陰陽二毒傷寒心悶。狂言亂語。胸膈壅滯。邪毒未發。及瘟疫山嵐瘴氣。纏喉風。冷水入薄荷一葉同研下。急中顛邪。喝叫亂走。鬼胎鬼氣。並用煖無灰酒下。自縊并落水死。心頭煖者。及驚死。鬼迷死。未隔宿者。並冷水磨灌下。蛇犬蜈蚣傷。並用冷水磨塗傷處。諸般瘡疾。不問新久。臨發時。煎桃柳枝湯磨下。小兒急慢驚風。五疳入痢。蜜水薄荷一葉同磨下。牙關緊急。磨塗一丸。分作三服。量大小與之。牙痛酒磨塗。及含藥少。

許吞下。湯火傷。東流水磨塗傷處。打撲損傷。炒松節無灰酒下。

年深日久頭疼。太陽疼。用酒入薄荷葉磨。紙花貼太陽穴上。諸般癰

疾。口眼喎斜。眼目掣眨。言語蹇澀。卒中風口噤。牙關緊急。筋脈攣縮。骨

節風腫。手足疼痛。行步艱辛。一應風氣疼痛。並用酒磨下。有孕婦人不

可服。一方加山豆根全蠍。朱砂雄黃各一兩。

四七湯見第七

枳桔二陳湯見第四

平胃散見第四

東垣溫胃湯 治服寒藥多。致脾胃虛弱。胃脘痛。

白豆蔻二分 益智 砂仁 厚朴

甘草 乾薑 薑黃各二分 黃耆

陳皮各七分 人參 澤瀉各三分

右為細末。每服三錢。水一盞。煎半盞。食前溫服。

來復丹見第七

理中湯

見第十七

東垣天台烏藥散

治一切沉寒痼冷。心腹攪痛。并積年寒疝。

天台烏藥

木香

茴香炒

青皮去白

良薑炒各五錢

檳榔剉二枚

川棟子十個

巴豆十四枚

右十味。先以巴豆打碎。同棟子用麸炒黑色。去巴豆麸。俱不用。外為細末。每服一錢。溫酒調下。痛甚者。炒生薑熱酒下。

和劑半硫丸

見第五十七

烏藥順氣散 治風氣攻注四肢。骨節疼痛。遍身頑麻。及癱瘓。步履艱難。

脚腰痿軟。或心腹疼痛。

麻黃

去根節

陳皮

烏藥各二錢

白僵蠶去絲嘴炒

乾薑

炮五分

川芎

枳殼

桔梗

白芷

甘草炒各一錢

水二鍾。薑三片。棗一枚。煎八分。食遠服。

鐵甕先生交感丹

見第五十八

溫膽湯

見第二十

小柴胡湯

見第三十四

醫燈續焰 卷八

心腹痛脈證第六十三

醫燈續焰 卷八 心腹痛脈證第六十三

醫燈續焰

明 錢塘 王 紹 隆 著

明 錢塘 潘 楫 碩 甫 註

明 錢塘 王 佑 賢 聖 翼 評

鄞縣 曹 赤 電 炳 章 校

卷九

疝氣脈證第六十四

疝氣弦急。積聚在裏。牢急者生。弱急者死。

疝氣者。氣聚而大。外仍斂束。故脈則見弦急而症則多脹痛也。字下從山。亦是聚而大之之義。皆從寒濕積鬱於裏得之。間有曰風曰熱者。亦不過寒風濕熱耳。其發也。多惡寒寒熱。嘔逆不食。狀類傷寒。但兼腹痛。或小腹痛脹。或只繞臍痛。或上衝心胸痛。或傍引脇肋痛。或臍下鞭急。或氣走腸鳴。或控引牽丸。痛脹急墜。或氣歸囊袋。收縱不時。甚或囊外

或冷、或濕、或熱、或紅。亦有出水。及久久成疝者。此皆裏有故積。復感風寒水濕。或加奔走焦迫。以致觸動積邪。氣聚而發。或一二日。或延多日。得溫煖及出汗。俱能氣散而解也。其脈弦急者。弦急乃厥陰肝脈。疝多發於肝故也。又弦欽急直。氣不鼓暢。主諸痛脹。疝則未有不痛不脹者。若弦急而牢。見積聚之有根。亦徵元本之壯實。脈證兩宜。故曰生。若但急而弱。急則邪盛。弱則正衰。更非積聚在裏者之所宜。故曰死。所云多發於肝者。素問五藏生成篇。平人氣象論。長刺節論。謬刺論。及靈樞經脈篇之言也。而素問骨空論又云。有發於任脈督脈者。素問陰陽別論。五藏生成篇。脈要精微論。玉機真藏論。大奇論。四時刺逆從論。及靈樞邪氣藏府病形篇。經筋篇。又皆云有發於別藏別府者。骨空論言任脈有內結七疝之名。而未有七疝之狀。巢氏因敘七疝曰厥疝。曰癰疝。曰寒疝。曰氣疝。曰盤疝。曰附疝。曰狼疝。而張子和復立七疝之名。曰寒疝。曰水疝。曰筋疝。曰血疝。曰氣疝。曰狐疝。曰癰疝。外復有小兒墮疝。及膀胱小腸等氣。亦指稱為疝者。聚訟紛紛。迄無定論。近惟張景岳一辯。最

此論詳
盡無遺

爲詳悉得理。茲錄於左。不敢再贅。景岳曰。愚按本經諸篇。所言疝證不一。有云狐疝者。以其出入不常也。有癰疝者。以其頑腫不仁也。有衝疝者。以其自少腹上衝心而痛也。有厥疝者。以積氣在腹中。而氣逆爲疝也。有瘕疝者。以少腹冤熱而痛。出白。一名蠱也。有六經風疝者。如四時刺逆從論之所云也。有小腸疝者。如邪氣藏府病形篇曰。小腸病者。小腹痛。腰脊控睪而痛。時窘之後者。亦疝之屬也。是皆諸疝之義。按骨空論曰。任脈爲病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。蓋任脈者。起於中極之下。以上毛際。循腹裏。上關元。總諸陰之會。故諸疝之在小腹者。無不由任脈爲之原。而諸經爲之派耳。云七疝者。乃總諸疝爲言。如四時刺逆從論所言者六也。邪氣藏府病形篇所言者一也。蓋以諸經之疝。所屬有七。故云七疝。若狐癰衝厥之類。亦不過爲七疝之別名耳。後世如巢氏所敘七疝。則曰厥、癰、寒、氣、盤、疝、狼。至張子和非之曰。此俗工所立謬名也。蓋環陰器上抵少腹者。乃屬足厥陰肝經之部分。是受疝之處也。又曰。凡疝者。非肝木受邪。則肝木自甚。皆屬肝經。於是亦立七疝之名。

曰寒、水、筋、血、氣、狐、癰。治多用下。繼自丹溪以來。皆宗其說。然以愚觀之。亦未為得。夫前陰小腹之間。乃足三陰陽明任衝督脈之所聚。豈得獨以厥陰經為言。但如四時刺逆從論所云。六疝皆兼風言者。本非外入之風。蓋風屬肝。肝主筋。故凡病各經之疝者。謂其病多在筋。而皆挾肝邪則可。若謂必在厥陰。則不可也。後世議論徒多。又安能出內經之範圍哉。學者當以經旨為正。至於治之之法。大都此證寒則多痛。熱則多縱。濕則多腫墜。虛者亦然。若重在血分者不移。在氣分者多動。分察六者於諸經。各因其多少虛實兼治之。自無不效也。

巢氏七疝狀

厥逆心痛。足寒。諸飲食吐不下。名曰厥疝。宜桂附二陳湯之類
腹中氣滿。心下痛。氣積如臂。名曰癥疝。宜東垣川棟散
寒飲食。即脇下腹中盡痛。名曰寒疝。宜仲景烏頭煎和劑胡蘆巴丸之類
腹中乍滿乍減而痛。名曰氣疝。宜蘇合香丸東垣川棟散之類
腹中痛在臍傍。名曰盤疝。宜桂枝湯東垣丁香棟實丸之類

如此分
治直是
舉要提
綱又何
愁多證
耶

也腎陰子 辜丸外

張子和七疝狀

腹中臍下有積聚。名曰臍疝。宜茴香散之類

小腹與陰相引而痛。大便難。名曰狼疝。宜木香丸丁香棟實丸之類

寒疝。其狀囊冷結硬如石。陰莖不舉。或控舉丸而痛。得於坐臥溼地。或寒月涉水。或冒雨雪。或坐臥磚石。或風冷處。使內過勞。宜以溫劑下之。久而得子。宜東垣天合烏藥散之類

水疝。其狀腎囊腫痛。陰汗時出。或囊腫而狀如水晶。或囊癢而搔出黃水。或少腹中。按之作水聲。得於飲水醉酒。使內過勞。汗出而遇風寒濕之氣。聚於囊中。故水多。令人為卒疝。宜以逐水之劑下之。有漏針去水者。人多不得其法。宜腰子散五苓散仲景牡蠣澤瀉散之類

筋疝。其狀陰莖腫脹。或潰或膿。或痛而裏急筋縮。或莖中痛。痛極則癢。或挺縱不收。或白物如精。隨洩而下。久而得於房室勞傷。及邪術所使。宜以降心之劑下之。宜白芍茯苓當歸小茴香青皮黃蘗蒼朮川椒之類

血疝。其狀如黃瓜。在少腹兩傍。橫骨兩端約中。俗云便癰。得於重感春

夏大燠。勞於使內。氣血流溢。滲入脬囊。留而不去。結成癰腫。膿少血多。

宜以和血之劑下之。

宜歸芍牛膝靈脂青皮木香丹皮沒藥玄胡索之類

氣疝。其狀上連腎區。下及陰囊。或因號哭忿怒。則氣鬱而脹。怒哭號罷。

則氣散者是也。有一治法。以針出氣而愈者。然針有得失。宜以散氣之

藥下之。或小兒亦有此疾。俗曰偏氣。得於父己年老。或年少多病。陰痿

精怯。強力入房。因而有子。胎中病也。此證不治。惟築賓一穴灸之。宜正

香散之類

狐疝。其狀如瓦。臥則入小腹。行立則出小腹入囊中。狐則晝出穴而溺。

夜則入穴而不溺。此疝出入上下往來。正與狐相類也。亦與氣疝大同

小異。今人帶鉤鈐是也。宜以逐氣流經之藥下之。宜金匱丸

癰疝。其狀陰囊腫墜。如升如斗。不癢不痛者是也。得之地氣卑溼所生。

故江淮之間。湫澹之處。多感此疾。宜以去濕之藥下之。女子陰戶突出。

雖亦此類。乃熱則不禁固也。不可便謂虛寒而澁之燥之補之。本名曰

瘕。宜以苦下之。以苦堅之。宜荔枝散三層茴香丸濟生橘核丸香附散

諸家另立諸疝之名。各隨其病。形狀而設。分言有寒熱。筋水氣。血之殊。總不出。腹中厥。氣為患。

味逍遙散或少
加升提之品

已上子和論疝七條。形證可謂詳悉。但七疝七名。形證亦異。治之當各有方。而俱云下者。恐出偏見。今擬對證方藥於下。在診之者。合宜則用。亦不敢概云不可下也。

附方

桂附二陳湯即二陳加肉桂附子

東垣川棟散

木香

川棟子剉細用巴豆十粒打破一處炒黃去巴豆

茴香

鹽一匙炒黃去鹽各一兩

右爲細末。每服二錢。空心食前。溫酒調下。

金匱烏頭煎見第七

和劑葫蘆巴丸 治小腸疝氣。偏墜陰腫。小腹有形如卵。上下來去。痛不

可忍。或絞結繞臍攻刺。嘔吐悶亂。

葫蘆巴炒一

茴香鹽炒十兩 吳茱萸洗炒十兩

川棟子去核炒一

巴戟去心 川烏炮去皮各六兩

右爲末。酒糊丸如桐子大。每服十五丸至二十丸。空心溫酒下。小兒五丸。茴香湯下。食前。一方有黑牽牛。

蘇合香丸見第十八

桂枝湯見第九

東垣丁香楝實丸 治男子七疝。痛不可忍。婦人瘕聚帶下。

當歸去蘆 附子 川楝子 茴香炒各一兩

右四味剉碎。以好酒三升。同煮酒盡。焙乾作細末。一兩。再入下項藥。

丁香 木香各五分 全蠍十三個

玄胡索作五錢一兩

右四味同爲細末。入前項當歸等末拌勻。酒糊丸如桐子大。每服三十丸至百丸。空心食前溫酒送下。一方無當歸。木香。名苦楝丸。

茴香散 治膀胱氣痛。

茴香 蓬朮 京三棱 金鈴子肉各兩

炙甘草半兩

右爲細末。每服二錢。熱酒調服。每發痛甚連日。只二三服立定。

木香散 治心疝。小腹痛悶不已。

木香

陳皮

良薑

乾薑

訶子去核

枳實各半

草豆蔻

黑牽牛

川芎各一錢

水二鍾。煎一鍾。食前服。或爲細末。每服三錢。白湯調服。

東垣天台烏藥散見第六十三

腰子散 治腎氣作痛。

黑牽牛炒熟

白牽牛炒熟

爲細末。每用三錢。猪腰子一對。薄切兩瓣。入川椒五十粒。茴香一百粒。以牽牛末徧摻入腰子中。線紮濕紙數重裹。煨香熟。出火氣。燈後空心嚼喫。好酒送下。少頃就枕。天明取下惡物即愈。

五苓散見第七

金匱牡蠣澤瀉散

牡蠣

澤瀉

蜀

漆洗去

栝蒌根

葶藶子

商陸根熬

海

藻洗去鹹已

右七味異搗下。篩為散。更入臼中治之。白飲和服方寸匕。小便利。止後服。

正氣天香散

見第七

金匱蜘蛛散

蜘蛛

十枚

桂

半錢要入厥陰取其肉厚者

右為散。每服一錢。蜜丸亦可。雷公云。凡使勿用五色者。兼大身上有刺毛者。并薄小者。須用屋西南有網。身小尻大。腹內有蒼黃膿者。真也。每用去頭足了。研如膏。投藥中。此余之法。仲景炒焦用。全無功矣。

荔枝散

治疝氣陰核腫大。痛不可忍。

荔枝核

十四枚燒灰

八角藋香炒

沉香

木香

青鹽

食鹽

各一

川楝肉

佑賢曰
此方治
偏墜神
效用荔
核為君

取其象
形而二
鹽潤下
諸香溫
散也

小蘘香各二錢

右爲細末。每服三錢。空心熱酒調服。

三層茴香丸。治腎與膀胱俱虛。爲邪氣搏結。遂成寒疝。伏留不散。臍腹疼痛。陰核偏大。膚囊腫重。墜滋長。有妨行步。瘙癢不止。時出黃水。浸成瘡瘍。或長怪肉。屢治不痊。以致腎經閉結。陰陽不通。外腎腫脹。冷硬如石。漸大。皆由頻服熱藥內攻。或因兜取。以致如此。用藥溫導。陽氣漸退。寒邪補虛消疝。暖養腎經。能使復元。一應小腸氣寒疝之疾。久新不過三料。

第一料

舶上茴香用鹽半兩同炒

川棟子炮去核

沙參洗剉

木香各一兩

右爲細末。煮米糊爲丸。如桐子大。每服三十丸。空心用溫酒或鹽湯下。日三服。小病一料可安。纔盡。便可用第二料。

第二料藥加

萆 撥一兩 檳 榔半兩

右共前藥六味。重五兩半。爲末。依前糊丸。丸數湯使亦如前。若病未愈。服第三料。

第三料藥加

白茯苓四兩緊實者去黑皮

黑附子炮去皮臍秤半兩或加作一兩

右通前八味。重十兩。並依前糊丸。湯使丸數加至三十丸。小腸氣發頻。及三十年者。寒疝氣如拷棹大者。皆可消散。神效。

濟生橘核丸 治四腫癰疝。卵核腫脹。偏有大小。或堅硬如石。痛引臍腹。甚則膚囊腫脹。成瘡。時出黃水。或成癰潰爛。

橘 核 海 藻 昆 布 海 帶各洗

川棟肉炒 桃 仁一兩各 製厚朴 木 通

枳 實麸炒 延胡索炒 桂 心 木 香各半

右爲細末。酒糊丸。如桐子大。每服七十丸。空心鹽酒鹽湯下。虛寒甚者。加炮川烏一兩。堅脹久不消者。加硃砂二錢。醋煮旋入。

香附散 治癰疽脹及小腸氣。

右用香附不拘多少為末。每用酒一盞。入海藻一錢。煎至半盞。先撈海藻細嚼。調香附末二錢服。一方以海藻為末。用熱酒調尤效。甚者灌之。一方熱酒下荊芥末。

龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱。兩拘腫痛。或腹中疼痛。或小便澀滯等證。

龍膽草

酒拌炒黃

澤

瀉錢各一

車前子

炒

木通

生地黃

酒拌

山

梔炒

當

歸酒拌

黃

芩炒

甘草

各五分

右水煎服。

加味逍遙散

見第五十一

腰痛脈證第六十五

腰痛之脈。多沉而弦。兼浮者風。兼緊者寒。弦滑痰飲。濡細腎着。大乃腎虛。沉實閃肭。

外因兼
見經絡
症

內因兼
見情志
症

腰痛者。足之六經病也。足三陽從頭走足。足三陰從足入腹。各經受邪。則隨各經之所過者為痛。與頭心為痛之義略同。而手之六經不與焉。以手經不至於腰也。其因有三。曰外因。內因。曰不內外因。外因者。風熱寒溼也。木化風。火化熱。水化寒。土化溼。風多傷厥陰。火多傷少陽。寒多傷太陽。少陰。溼多傷太陰。陽明。此言邪傷足三陰三陽之經也。亦各從其類也。厥陰腰痛。腰中如張弓弩弦。宜調肝散加味少陽腰痛。如以針刺其皮中。循循然。不可以俛仰。不可以顧。宜逍遙散倍白芍太陽腰痛。則引項脊尻背如重狀。宜東垣羌活湯之類足少陰腰痛。痛引脊內廉。宜金匱八味丸六太陰散脈腰痛。腰下如有橫木。居其中。甚則遺洩。宜東垣蒼朮湯統陽明腰痛。不可以顧。顧如有見者。善悲。宜四物湯痰湯內因者。恐懼失志。恚怒忿恨。抑鬱憂思也。恐懼失志則傷腎。恚怒忿恨則傷肝。抑鬱憂思則傷脾。此言情志不得其所。三陰藏氣自傷也。亦各從其類也。腎傷腰痛。虛羸不足。面目黧黑。遠行久立。力不能盡。宜地黃丸煨腎丸黑肝傷腰痛。腹急脇脹。目視眈眈。所祈不得。意淫於外。宗

不內外
因兼見
形體症

此種亦
屬不內
外因

筋弛縱。及為白淫。宜六味丸加脾傷腰痛。肌肉濡漬。痺而不仁。飲食不化。腸胃脹滿。閉墜腰脇。宜平胃散。局方普不內外因者。房室過度。煩勞力出於腎。而腰者腎所系。其病轉側屈伸不得。膝酸脛冷。腰中冷。面黑。僂僂不能久立。宜二至丸。和無比一種腰痛。因作勞多汗。衣裏冷溼。久久得之。其證身重不渴。小便自利。食飲如常。腰以下冷重。如帶五千錢者。名曰腎着。腎着者。因勞極。腎氣虛。張散汗。溼乘之。乘其已所勝。而重。更無他證。如上所云。宜仲景腎着。一種因搏擊墮墜。閃肭。氣血凝滯。或只氣滯而血未至於瘀。或血瘀結而氣久方行。令人僂僂腫痛而重。牽引脇脊。氣滯者。呼吸亦痛。不能轉側。鼻塞。身不動。則痛亦定。宜方人參。順氣散之。類烏血瘀者。亦轉側不能。腰下重痛。若錐刀之刺。大便黑。面目黃。日輕夜重。宜調榮。活絡。飲仲景一種積痰停飲。阻滯於腰脇之間。有礙氣道。亦能作痛。其痛或作或止。或移易不定。或不仁。或麻木。或痛處如冰。腰脊重墜。宜導痰丸。王隱以上諸證。大抵外因。寒溼多而風

熱少內因。腎多。肝次之。而脾藏少。不內外因。感亦明顯。若謹慎善攝之人。自不多罹。并可終身不一遇也。諸腰痛。脈多沉弦者。沉為在裏。在下。弦則為痛。故多沉弦也。兼浮者。沉弦中有泛泛欲浮之勢。所謂如水漂木。舉之有餘。是狀風邪虛浮之性。非言在表之浮也。兼緊者。寒寒緊。飲也。兼滑者。痰飲。痰飲滑利也。兼濡細者。腎著。腎著者。濕。濡細滲著也。兼大者。腎虛。腎虛不斂藏。而反空鬆虛大也。兼實者。閃肭。閃肭非血瘀。則氣滯。皆成凝滯。故沉實也。

附方

調肝散 治鬱怒傷肝。發為腰痛。

半夏製三分

辣桂

宣木瓜

當歸

川芎

牛膝

細辛各二分

石菖蒲

酸棗仁

鹽去皮微炒

甘草炙各一分

每三錢薑五片棗二枚煎服。

加味逍遙散見第五十一

東垣羌活勝溼湯 治脊痛項強。腰似折。項似拔。衝頭痛。乃足太陽經不行也。

羌活

獨活

藁本

防風各一錢

蔓荊子三分

川芎二分

甘草炙五分

右咬咀。作一服。水二盞。煎一盞。去滓。食後溫服。

東垣川芎肉桂湯 丁未年冬。曹通甫自河東來。有役人小翟。宿於寒溼之地。腰痛不能轉側。兩脇擗急作痛。月餘不愈。腰痛論中所說。皆為足太陽。足少陰血絡中。有凝血作痛。間有一二證。屬少陽膽經。外絡脈病。皆宜去血絡之凝。乃愈。其內經有云。冬三月。禁不得針。只宜服藥通其經絡。破其血絡中敗血。此方主之。

羌活半錢

柴胡一錢

獨活五分

肉桂

蒼朮各一錢

防風

漢防己各三分

桃仁五枚。去皮。另研如泥。

歸梢

甘草炙

川芎各一錢

炒麴

右咬咀。水酒煎。去滓。食遠熱服。

九味羌活湯見第六

六味丸見第六

八味丸見第六

直指青娥圓 治腎虛腰痛。益精助陽。烏鬚壯脚。用安胎飲吞。神效。

破故紙四兩炒香 杜仲去粗皮剉四兩用生薑二兩半擦淹炒乾

右爲末。用胡桃肉三十個研膏。入少熟蜜圓。桐子大。每服五十圓。食前下。

東垣蒼朮湯 治濕熱脚腿疼痛。

蒼朮五錢去濕止痛 柴胡三錢行經 防風一錢半去風勝濕

黃蘗一錢半始得之時寒也久不愈寒化爲熱除熱止痛

水二鍾。煎至一鍾。空心食前服。

統旨清濕散

黃蘗鹽水拌炒一錢五分 澤瀉一錢 蒼朮一錢半米

杜仲 白芍藥煨 牛膝酒浸 木瓜

佑賢曰 此方能 補右腎 名門元 氣虛寒 者爲宜 故又能 安胎以 胞子系 胞處也

歲靈仙

陳皮錢各一

甘草三分

痛甚者加乳香沒藥末五分臨服調入。

四物湯

見第二十一

平胃散

見第四十四

導痰湯

見第四十一

保命煨腎丸

治腎肝損及脾損穀不化宜益精緩中消穀。

牛膝

草薺

杜仲絲炒去

白蒺藜

防風

兔絲子酒浸

肉蓯蓉酒浸

葫蘆巴

破故紙

酒炒各等分

官桂減半

右爲細末將猪腰子製如食法搗爛煉蜜和杵丸如桐子大每服五七十丸空心用溫酒送下治腰痛不起甚效。

黑地黃丸

見第五十一

知藥八味丸

見第五十四

和劑普賢正氣散

醫燈續焰

卷九

腰痛脈證第六十五

陳皮 半夏 蒼朮 厚朴

藿香 甘草 生薑各等分

每服五錢。水二盞。葱二段。黑豆百粒。煎八分。不拘時熱服。

二至丸 治老人虛弱。腎氣虛損。腰痛不可屈伸。

附子炮去皮 桂心火不見 杜仲去皮剉 補骨脂炒各

鹿角鎊 麋角二鎊各 鹿茸酒炙 青鹽半兩研各

右細末。酒煮糊和丸。如桐子大。每服七十丸。空心同胡桃肉細嚼。用鹽

湯。或鹽酒送下。如惡熱藥者。去附子。加肉蓯蓉一兩。

子和無比山藥丸 治諸虛百損。五勞七傷。肌肉消瘦。目暗耳鳴。

赤石脂煨 茯苓去木 山茱萸去核 熟乾地黃酒浸

巴戟去心 牛膝去根 澤瀉已上各 杜仲去皮切

兔絲子酒浸 五味子揀六 肉蓯蓉酒浸

右為細末。煉蜜為丸。如桐子大。每服三十丸。空心溫酒。或鹽湯送下。

腎着湯見第二十一

佑賢曰 鹿乃山 獸屬陽 夏至得 陰氣而 角解麋 乃澤獸 屬陰冬 至得陽 氣而角 解方中 以此二 品為君 故名二 至

子和禹功散

黑牽牛四兩 茴香炒一兩

右為末。薑汁調一二錢服。

夏方人參順氣散 治氣滯腰痛。

人參 川芎 桔梗 白朮

白芷 陳皮 枳殼 麻黃去節

烏藥 白薑炮 甘草炙各一錢

水二鍾。煎一鍾。或為細末。食前用甘草湯調服。一方加五加皮一錢。

烏藥順氣散見第三十六

調榮活絡飲 治失力腰閃。或跌撲瘀血。及大便不通而腰痛。

川大黃 當歸條 川牛膝去蘆酒洗 杏仁去皮研如泥各二錢

赤芍藥 紅花 羌活 懷生地黃酒洗各一錢

川芎半錢 桂枝三分

水一鍾半。煎八分。食前溫服。

桃仁承氣湯見第十

滾痰丸見第十七

脚氣脈證第六十六

脚氣有四。遲寒數熱。浮滑者風。濡細者濕。

脚氣之疾。治同痺症。以其偏發於脚。故以脚氣立門。總不寒溼三氣雜至。為患故有風行流注者。寒凝痛極者。溼

脚氣一證。經名厥。漢名緩風。宋齊後始名脚氣。陳無擇謂風寒暑濕四邪皆能成。今歷診是證。成於寒濕者。十常八九。經曰。清濕襲邪。病起於下。信然哉。其始發也甚微。發亦易解。故人常忽而不覺。覺亦不速治。及其深久。愈發愈重。甚至痿痺不仁者有之。入腹衝心者有之。身命從此而殞。可哀也。足三陰三陽六經。皆有此證。而發於三陽者輕。三陰者重。以三陰屬藏。經絡居裏。若非藏氣大虛。邪不易及。其證不論陰陽。初發時。大類傷寒。頭痛發熱。惡寒嘔吐。但足屈伸不能。或痛或紅。為異耳。在陽。多惡寒壯熱。頭痛。或骨節痛。或嘔吐渴煩。或叫號譫語。或腿脚紅紫。極熱。大腫大痛。手不可按。或頑痺麻木。患多在腿外廉陽分。三陽經所

若重滯者痛壅腫發鬱熱自生此指外邪爲患者而言若內傷溼熱下溜三陰亦能爲患此當用子和蕩滌之法爲妙也

過之處。面光澤。脈多浮。在陰。多惡寒。甚或厥逆。不發熱。或微熱。頭不痛。或骨痛筋攣。或嘔逆。或神昏沉默。或腹痛下利。或畏見光明。或大小便閉。或心煩動悸。或小腹不仁。或衝胸悶亂。患處腫痛。或不腫。或微赤而熱。或反極冷。患多在腿內廉陰分。三陰經所過之處。面青慘。脈多沉。此言陰陽之大概。若細別之。太陽則發熱頭痛惡寒。目眩項強。腰脊身體及外踝後。至小指外側皆痛。宜仲景麻黃湯桂枝湯九味羌活湯陽明則翕翕發熱。口鼻乾。善欠。腹脹。自髀膝臍外廉以下。足跗中指內俱痛。宜得效芎芷香蘇散少陽則往來寒熱。口苦。脇痛。面垢。頭目眩痛。腋下大黃左經湯之類。馬刀腫痛。髀膝外至臍。及外踝諸指節皆痛。宜小柴胡湯三陽并合為病。則憎寒壯熱。自汗惡風。或無汗惡寒。眩暈重着。關節掣痛。手足拘攣。疼痛冷痺。腰腿緩縱不隨。心躁氣上。嘔吐下利。其脈浮弦緊數。宜大黃左經湯加味太陰則腹滿胸膈痞。舌系急。循胛骨下股膝內前廉。內踝過核骨後廉。足大指之端內側皆痛。宜胃苓湯六物少陰則腰脊痛。上衝胸咽。饑不能食。面黑。大小淋瀝。善恐。小趾足心內踝跟中。臍內廉

形有或
寒非可
泛然為
治觀此
論可謂
詳且盡
矣

皆痛。宜麻黃附子細辛湯厥陰則腰脇偏痛。脚攣急。噎乾嘔逆。洩泄。足
大趾連足趺上廉。上脰至內廉。循股環陰。小腹夾臍諸處脹痛。宜茱萸黃
神應養真丹之類。三陰并合為病。則四肢拘攣。上氣喘滿。小便閉澀。心熱煩悶。
偏身浮腫。脚弱。緩縱不能行步。宜加味敗毒散已上六經受病。流注自
汗為風勝。脈多浮滑宜桂枝羌活獨活防風無汗疼痛為寒勝。脈多遲實宜桂枝附子湯熱煩為暑
勝。脈多數宜香薷黃芩重着腫滿為濕勝。脈多濡細宜茯苓至如防己、
木瓜、米仁、檳榔、蒼朮、黃蘗、肉桂、桂枝、巴戟、萎蕤、木通、羌活、枳殼、澤瀉、桑
枝之類。各隨其氣所勝者而偏調之。證相宜者而倍用之。又不可拘於
一方也。東垣謂此疾南方卑下。乃寒濕之邪。外襲經絡而成。如北方地
高。外鮮水濕。發此者皆內傷酒亂。濕熱之邪下注也。故南則宜作寒濕
治。北則宜作濕熱治。此雖發前人之未發。恐未必盡然也。南方固下。豈
乏膏粱嗜酒之人。北方固高。豈無踐涉洗濯之事。是在圓機者。謹察證
脈而分別之。斯善矣。

附方

佑賢曰
經脈者
行血氣
通陰陽
以營於
身者也
為邪所
着便致
留礙此
湯能佐
經逐邪
以復常
道故名

仲景麻黃湯見第十六

仲景桂枝湯見第九

九味羌活湯見第六

敗毒散見第七

集驗麻黃左經湯 治風寒暑濕。流注足太陽經。腰足攣痺。關節重痛。行

履艱難。憎寒發熱。無汗而寒。或自汗惡風。頭痛眩暈。并一切癰瘰麻木

等證。

麻黃去節

乾葛

細辛去苗

白朮去蘆

茯苓去皮

防己去皮

桂心

羌活去蘆

防風去蘆

甘草炙各

右咬咀。每服七錢。水二盞。薑五片。棗一枚。煎一盞。空心服。自汗去麻黃。

加肉桂、芍藥、重着、加朮、陳皮、無汗減桂。加杏仁、澤瀉。

得效芎芷香蘇散

川芎七錢

甘草二錢

紫蘇葉

乾葛

白茯苓 柴胡各半 半夏六錢 枳殼炒三

桔梗生二錢半 陳皮三錢半

每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎八分不拘時溫服。

大黃左經湯 治風寒暑濕流注足陽明經腰脚痺痛行步艱難涎潮昏塞大小便秘澁腹痛嘔吐或復下利惡聞食氣喘滿肩息自汗譫妄並宜服之。

大黃煨 細辛去苗 茯苓去皮 防己去皮

羌活去蘆 黃芩 前胡去蘆 枳殼去穢炒

厚朴薑製 甘草炙 杏仁去皮尖

右各等分每服七錢水一盞半薑五片棗一枚煎八分空心熱服。腹痛加芍藥。秘結加阿膠。喘急加桑白皮紫蘇。小便秘加澤瀉。四肢瘡瘍浸淫加升麻各等分。

仲景小柴胡湯見第四十三

半夏左經湯 治足少陽經受風寒濕暑流注發熱腰脚俱痛頭疼眩暈。

嘔吐酸水。耳聾驚悸。熱悶心煩。氣促喘滿。肩背麻痺。腰腿不隨。

半夏湯洗七次切片 乾葛 細辛去苗 白朮去蘆

茯苓去皮 桂心 防風去蘆 乾薑炮

黃芩 甘草炙 柴胡去蘆 麥門冬去心各七錢半

右咬咀。每服七錢。水一盞半。薑五片。棗一枚。煎一盞。去滓。空腹服。熱悶。

加竹瀝。每服一合。喘滿。加杏仁。桑白皮。

大料神秘左經湯 治風寒暑濕。流注足三陽經。手足拘攣。疼痛。行履艱

難。憎寒發熱。自汗惡風。或無汗惡寒。頭眩腰重。關節掣痛。或卒中昏塞。

大小便秘澀。或腹痛。嘔吐。下利。惡聞食臭。髀腿頑痺。緩縱不隨。熱悶驚

悸。心煩氣上。臍下冷痺。喘滿氣羸。

麻黃去節 乾葛 細辛去苗 厚朴薑製

茯苓去皮 防己去皮 枳殼去穢炒 桂心

羌活去蘆 防風去蘆 柴胡去蘆 黃芩

半夏湯洗七次 乾薑炮 麥門冬去心 甘草炙各等分

右咬咀。每服七錢。水一盞半。生薑五片。棗一枚。煎一盞。去滓。空心服。
自汗加牡蠣。白朮去麻黃。腫滿加澤瀉。木通。熱甚無汗。減桂加橘
皮。前胡。升麻。腹痛吐利。去黃芩。加芍藥。附子炮。大便秘。加大黃。竹
瀝。喘滿。加杏仁。桑白皮。紫蘇等分。凡有此病。備細詳證。逐一加減。無
不愈者。

加味敗毒散。治三陽經脚氣流注。脚踝焮熱赤腫。寒熱如瘧。自汗惡風。
或無汗惡寒。

佑賢曰
脚氣焮
腫乃濕
熱為邪
而病經
之下其
流注如
瘧風寒
所為

人參	去蘆	赤茯苓	去皮	甘草	炙	芎藭
前胡	去蘆	羌活	去蘆	獨活	去蘆	枳殼
桔梗	去蘆	大黃	煨	蒼朮	米泔浸	

右每服五七錢。水一盞半。薑五片。薄荷五葉。煎一盞。去滓。熱服。皮膚
赤疹。加蟬蛻。

胃苓湯見第七

六味附子湯。治四肢流注於足太陰。骨節煩疼。四肢拘急。自汗短氣。小

便不利。惡風怯寒。頭面手足腫痛。

附子炮去

桂心

防己去皮各

白朮去蘆

茯苓

三兩各

炙甘草二兩

右咬咀。每服五錢。水二盞。生薑七片。煎一盞。去滓。空心溫服。

仲景麻黃附子細辛湯

麻黃去節

細辛各二

附子炮一枚

右三味。以水一斗。先煮麻黃減二升。去上沫。內藥。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

八味丸

見第六

茱萸木瓜湯

治脚氣衝心。悶亂不識人。手足脈欲絕。

吳茱萸半兩

乾木瓜一兩

檳榔一兩

右咬咀。每服八錢。以水一盞半。生薑五片。煎一盞。去滓。溫服。不拘時候。神應養真丹。治厥陰肝經受邪。四氣所傷。肝藏。或左癱右瘓。涎潮昏塞。半身不遂。手足頑麻。言語蹇澀。頭旋目眩。牙關緊急。氣喘自汗。心神恍

惚。肢體緩弱。上攻頭目。下注脚膝。榮氣凝滯。遍身疼痛。兼治婦人產後中風。角弓反張。墮車落馬。打撲傷損。瘀血在內等證。

當歸酒浸去蘆

天麻

川芎

羌活去蘆

白芍藥

熟地黃各等分

右爲細末。煉蜜和丸如彈子大。每服一丸。木瓜、兔絲子煎酒下。脚痺。

薏苡仁煎酒下。中風溫酒米湯下。一方無羌活。入木瓜、熟阿膠等

分。

追毒湯 治肝腎脾三經。爲風濕寒熱毒上攻。陰陽不和。四肢拘攣。上氣

喘滿。小便秘澀。心熱煩悶。徧身浮腫。脚弱緩縱。不能行步。

半夏湯洗七次

黃耆去蘆

甘草炙

當歸去蘆

人參去蘆

厚朴薑製

獨活去蘆

橘皮去白各一兩

熟地黃

芍藥

枳實去穢炒

麻黃去節各二兩

桂心三兩

右㕮咀。每服八錢。水一大盞半。薑七片。棗三枚。煎一大盞。去滓。空心溫

服。日三夜一。

醫燈續焰 卷九 脚氣脈證六十六

醫燈續焰

明 錢塘 王 紹 隆 著

明 錢塘 潘 楫 碩甫註

明 錢塘 王 佑賢聖翼評

鄞縣 曹 赤電炳章校

卷十

痿病脈證第六十七

痿病肺虛。脈多微緩。或濇或緊。或細或濡。

痿者委也。足痿不用。有委靡不振之義。故字從委。其證五藏俱能成。而

此獨歸之肺者。本素問也。素問痿論岐伯曰。肺熱焦。則皮毛虛弱急薄。

著則生痿。又曰。肺者藏之長也。為心之蓋也。有所失忘。所求不得。則

發肺鳴。鳴則肺熱葉焦。五藏因肺熱葉焦。發為痿躄。觀岐伯所言。則知

五藏之痿。必自肺始。內則先葉焦。而外則先皮毛虛弱急薄也。蓋肺居

心上為最高。外合皮毛為最表。故云藏之長。心之蓋。主一身之氣而司呼吸。朝百脈而行榮衛。故平人氣象論曰。藏真高於肺。以行榮衛陰陽也。其令收降。其化清肅。設有失忘。求謀不得。則肺氣鬱鬱。則收者愈收。氣遏為火而熱生焉。熱則清肅之化不行。炎熱之邪自迫。斯時也。氣不寧靜。則喘鳴。藏不濡潤。則焦萎。然不獨一肺止也。蒸熏榮衛。耗竭藏陰。嗣是五藏之合。如筋脈肉骨之屬。亦皆不得其榮潤。而諸痿之證作矣。故岐伯又曰。心氣熱。則下脈厥而上。上則下脈虛。虛則生脈痿。樞折挈。脛縱而不任地也。宜丹溪虎潛丸補陰丸之類肝氣熱。則膽泄口苦。筋膜乾。筋膜乾。則筋急而攣。發為筋痿。宜四物湯減四斤丸之類脾氣熱。則胃乾而渴。肌肉不仁。發為肉痿。宜東垣神效黃散之類腎氣熱。則腰脊不舉。骨枯而髓減。發為骨痿。宜丹溪虎潛丸三因此皆言肺熱葉焦。皮毛急薄。熱留着不去。災及四藏而發為諸痿也。若四藏不虛。無隙可乘。則熱亦不能遽襲。故下文岐伯復曰。悲哀太甚。則胞絡絕。胞絡絕。則陽氣內動。發則心下崩。數洩血也。故本論曰。大經空虛。發為肌痺。傳為脈痿。宜仲景炙甘草湯黑地黃丸之類

此言悲哀太甚。致心系急而胞絡絕。評熱論曰。胞脈者。屬心而絡於胞中。絕則不能上交於心。亢陽內迫。內迫則血溢下崩。隨洩而出。崩則大經空虛。無以榮灌脈絡。故先為肌痺。而漸傳為脈痿也。又曰。思想無窮。所願不得。意淫於外。入房太甚。宗筋弛縱。發為筋痿。及為白淫。故下經曰。筋痿者。生於肝。使內也。宜知藥入味丸四物之類此言外想邪淫而不遂。及甚於入房。一則肝火抑鬱。一則陰精耗亡。皆前陰所關。前陰者。宗筋也。宗筋無陰以養。而反為火迫。故弛縱痿弱。及淫念動而白物隨下。故筋痿者。生於肝。使內也。又曰。有漸於濕。以水為事。若有所留。居處相濕。肌肉濡漬。痺而不仁。發為肉痿。故下經曰。肉痿者。得於濕地也。宜胃苓湯參朮湯之類此言從事於水溼之處。居處皆濕。漸受其邪。留著而濡漬肌肉之間。久則肌肉不仁。發為肉痿。故肉痿者。得之濕地也。又曰。有所遠行勞倦。逢大熱而渴。渴則陽氣內伐。內伐則熱舍於腎。腎者水藏也。今水不勝火。則骨枯而髓虛。故足不任身。發為骨痿。故下經曰。骨痿者。生於大熱也。宜知藥八味丸之類此言遠行勞倦。逢熱而渴。渴則內熱

殊甚。內熱甚。則乘其虛者而迫之。遠行勞倦。則腎氣適虛。經脈別論云。出於腎。腎虛。則受其熱而不能勝。漸至髓減骨枯。以致足不任身。發為骨痿。故骨痿者。生於大熱也。又曰。陽明者。五藏六府之海。主潤宗筋。宗筋主束骨而利機關也。衝脈者。經脈之海也。主滲灌谿谷。與陽明合於宗筋。陰陽總宗筋之會。會於氣街。而陽明為之長。皆屬於帶脈而絡於督脈。經脈證。似故陽明虛。則宗筋縱。帶脈不引。前白淫證。似帶故足痿不用也。又曰。各補其榮而通其俞。調其虛實。和其逆順。筋脈骨肉。各以其受時月。則病已矣。前岐伯論痿之感受傳變。可謂盡矣。而終復歸之陽明者。何哉。蓋陽明為水穀之海。衝為血海。此不言水穀而言五藏六府之海。不言血而言經脈之海。見藏府經脈。無非二者為之源。一潤宗筋為陽。一灌谿谷為陰。總宗筋而會於氣街。推陽明為之長者。氣街乃陽明正脈。亦有尊水穀之義。督脈直行。帶脈橫圍。陽明衝脈。皆屬帶而絡督。陽明虛。則不能榮養宗筋。而帶脈亦無力收引。故足痿不用也。是知束骨利機關者。必藉乎宗筋。而宗筋又藉陽明之榮潤。故治痿者。

獨取陽明也。然必兼視各藏之榮俞。宜補宜通。受病之時月。或衰或盛。而後逆順可和。虛實可調。病良已矣。此岐伯答帝治痿之針法也。其脈多微緩。或濇或緊。或細或濡者。以微應皮毛。緩應肌肉。濡應血脈。緊應筋膜。細濡應骨髓耳。

附方

虎潛丸見第五十一

補陰丸

黃蘗

知母俱鹽酒拌炒熟地黃

敗龜板酥炙各四兩

白芍藥煨

陳皮

牛膝酒浸各二兩

虎脛骨酥炙

瑣陽酒浸炙

當歸酒洗各一兩半

右為末。酒煮羯羊肉為丸。鹽湯下。冬月加乾薑五錢半。

四物湯見第二十一

三因加減四斤丸 治腎肝虛。熱淫於內。致筋骨痿弱。不自勝持。起居須

人足不任地。驚恐戰掉。潮熱時作。飲食無味。不生力氣。諸虛不足。

佑實曰
腎肝兩

肉苁蓉酒浸 牛膝酒浸 天麻 木瓜乾

鹿茸煉去毛 五味子酒浸 熟地黃 兔絲子酒浸另研

右為細末。煉蜜丸如桐子大。每服五十丸。空心溫酒米飲任下。一方不用五味子。有杜仲。

東垣神效黃耆湯

黃耆二錢 人參去蘆 白芍藥 炙甘草各一

蔓荊子二錢 陳皮五分

水一盞八分。煎一盞去滓。臨臥稍熱服。如小便淋澀。加澤瀉五分。如有大便熱證。加黃蘗。酒炒四次。三分。麻木不仁。雖有熱。不用黃蘗。再加黃耆一錢。如眼縮小。去芍藥。忌酒醋濕麵。大料物。葱韭蒜。及淡慘生冷硬物。麻木重甚者。加芍藥。木通各一錢。

錢氏瀉黃散見第四

仲景炙甘草湯見第三

黑地黃丸見第五

虛用緩 中益精 之劑固 宜已於 熱溼於 內何以 用鹿茸 五味要 知虛熱 與邪熱 自是不 同 佑賢曰 陽虛則 脾寬而 眼縮去 芍藥恐 益陰也

知藥八味丸見第四

加味道遙散見第五

胃苓湯見第七

仲景防己黃耆湯

防己一兩

甘草半兩

白朮七錢

黃耆去蘆一分

右剉每抄五錢匕。生薑四片。大棗一枚。水盪半。煎八分。去滓溫服。良久再服。喘者加麻黃半兩。胃中不和加芍藥三分。氣上衝者加桂枝三分。下有陳寒者加細辛三分。服後當如蟲行皮中。從腰下如冰。後坐被上。又以一被繞腰以下。溫令微汗差。

東垣參朮湯 治氣虛顫掉。

人參

白朮

黃耆各二錢

白茯苓

炙甘草

陳皮各一錢

水二鍾。煎八分。食前服。甚者加附子童便製一錢。

六味丸見第六

痺病脈證第六十八

風寒濕氣。合而為痺。浮瀋而緊。三脈乃備。

痺者。風也。以風寒濕氣。雜至三。絡使氣。血不行為病。也。以天之邪氣。言三。謂之五。藏之所。合言謂之五。痺。

痺之一證。無如素問痺論之精且詳矣。其言邪客之多少。傳變之淺深。證狀之虛實。府藏之死生。榮衛形體之異。寒熱陰陽之分。皆辭義顯明。不可增損一字。茲錄全文於左。黃帝問曰。痺之安生。岐伯對曰。風寒濕三氣雜至。合而為痺也。其風氣勝者為行痺。寒氣勝者為痛痺。濕氣勝者為著痺也。帝曰。其有五者何也。岐伯曰。以冬遇此者為骨痺。以春遇此者為筋痺。以夏遇此者為脈痺。以至陰遇此者為肌痺。以秋遇此者為皮痺。帝曰。內舍五藏六府。何氣使然。岐伯曰。五藏皆有合。病久而不去者。內舍於其合也。故骨痺不已。復感于邪。內舍於腎。筋痺不已。復感於邪。內舍於肝。脈痺不已。復感於邪。內舍於心。肌痺不已。復感於邪。內舍於脾。皮痺不已。復感於邪。內舍於肺。所謂痺者。各以其時。重感於風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者。肺痺者。煩滿喘而嘔。宜當歸湯。紫心痺。

復感之
邪并亂
於裏曰
淫氣

者。脈不通。煩滿腹下鼓。暴上氣而喘。噎乾善噫。厥氣上則恐。宜扶神肝
痺者。夜臥則驚。多飲。數小便。上為引如懷。宜草薢丸奇效腎痺者。善脹。
尻以代踵。脊以代頭。宜加味五痺湯奇效脾痺者。四肢懈墮。發欬嘔汁。上
為大塞。宜薑中法類丸腸痺者。數飲而出不得。中氣喘爭。時發飧泄。宜扶
苓之類胃痺者。少腹膀胱按之內痛。若沃以湯。澀於小便。上為清涕。宜
瀝湯之類陰氣者。靜則神藏。躁則消亡。飲食自倍。腸胃乃傷。淫氣喘息。痺聚
於肺。淫氣憂思。痺聚於心。淫氣遺溺。痺聚於腎。淫氣乏竭。痺聚於肝。淫
氣肌絕。痺聚在脾。諸痺不已。亦益內也。其風氣勝者。其人易已也。帝曰。
痺其時有死者。或疼久者。或易已者。其故何也。岐伯曰。其入藏者死。其
留連筋骨間者。疼久。其留皮膚間者。易已。帝曰。其客於六府者。何也。岐
伯曰。此亦其食飲居處。為其病本也。六府亦各有俞。風寒濕氣中其俞。
而食飲應之。循俞而入。各舍其府也。帝曰。以針治之。奈何。岐伯曰。五藏
有俞。六府有合。循脈之分。各有所發。各隨其過。則病瘳也。帝曰。榮衛之
氣。亦令人痺乎。岐伯曰。榮者。水穀之精氣也。和調於五藏。灑陳於六府。

乃能入於脈也。故循脈上下。貫五藏。絡六府也。衛者。水穀之悍氣也。其氣慄疾滑利。不能入於脈也。故循皮膚之中。分肉之間。熏於肓膜。散於胸腹。逆其氣則病。從其氣則愈。不與風寒濕氣合。故不為痺。帝曰。善。痺或病。或不痛。或不仁。或寒。或熱。或燥。或濕。其故何也。岐伯曰。痛者。寒氣多也。有寒。故痛也。其不痛不仁者。病久入深。榮衛之行滯。經絡時疎。故不通。皮膚不營。故為不仁。其寒者。陽氣少。陰氣多。與病相益。故寒也。其熱者。陽氣多。陰氣少。病氣勝。陽遭甲乙經陰。故為痺熱。其多汗而濡者。此其逢濕甚也。陽氣少。陰氣盛。兩氣相感。故汗出而濡也。帝曰。夫痺之為病。不痛何也。岐伯曰。痺在於骨。則重在於脈。則並凝而不流。在於筋。則屈不伸。在於肉。則不仁。在於皮。則寒。故具此五者。則不通也。凡痺之類。逢寒則蟲。甲乙經逢熱則縱。帝曰。善。其脈浮濇而緊者。浮為風。濇為濕。緊為寒。乃一脈中見此三種。始為三邪雜合。若雜合中。邪有偏勝。則又當審脈之浮多。濇多。緊多。以別之也。主方十一首。固與本論府藏證對。殊不知三邪之變。見於形體者。不可勝紀。論中雖分行痛着三種。而

三種之證。未經列出。如痛痿走注。麻木不仁。拳攣重着等證。似與前方漠不相關。若概治之。恐迂緩無裨。故又選對證名方於後。以便採用焉。
行痺宜仙靈脾散三因控涎丹痛痺宜烏藥順氣散酒之類
散着痺宜東垣神效黃耆湯溫經除溼湯史國公浸酒之類

附方

當歸湯

當歸酒洗二錢 赤芍藥錢半 獨活 防風

赤茯苓 黃芩 秦艽各一錢 杏仁去皮尖八分

甘草六分 桂心三分

水二鍾。薑三片。煎八分。不拘時溫服。

紫蘇子湯 治肺痺。心胸滿塞。上氣不下。

紫蘇子炒入兩 半夏湯洗五兩 陳皮去白 桂心各三兩

人參 白朮 甘草炙各二兩

右㕮咀。每服四錢。水一盞。生薑五片。棗一枚。煎七分。去滓。不拘時溫服。

扶神湯 治心痺。神思昏塞。四肢不利。胸中煩悶。時復恐悸。

茯神去木

羌活去蘆

麻黃去根

麥門冬去心

龍齒各一兩

遠志去心

犀角屑

薏苡仁

人參去蘆

蔓荊子

防風各七錢五分

赤芍藥

甘草炙各五錢

右咬咀。每服三錢。水一鍾。薑五片。煎七分。去滓。不拘時溫服。

葶藶丸 治肝痺。緩筋脈。去邪毒。調榮衛。

葶藶

羌活去蘆

天麻酒浸一宿切焙各一兩

附子炮去皮乳

香

沒藥另研各二錢半

右爲細末。入乳香。沒藥同研勻。煉蜜丸。彈子大。每服一丸。空心溫酒化

下。日再服。

奇效人參散 治肝痺。氣逆。胸脇引痛。眠臥多驚。筋脈攣急。此藥鎮肝去

邪。

人參二兩

杜仲去粗皮炒

黃耆蜜炙

酸棗仁微炒

茯苓去木各一兩

五味子

細辛去苗

熟地黄

秦 芫去苗

羌 活去蘆

丹 砂細研

芎 藭各半

右爲細末。入丹砂。再研令勻。每服一錢。不拘時。溫酒調下。日三服。

加味五痺湯 治五藏痺證。

人 參

茯 苓

當 歸酒洗

白 芍藥煨

川 芎各一錢 肝心腎痺倍之

五 味 子十五粒

白 朮一錢 脾痺倍之

細 辛七分 甘 草五分

水二鍾。煎八分。食遠服。肝痺加酸棗仁、柴胡。心痺加遠志、茯神、麥

門冬。脾痺加厚朴、枳實、砂仁、神麴。肺痺加半夏、紫苑、杏仁、麻黃。

腎痺加獨活、官桂、杜仲、牛膝、黃耆、萆薢。

溫中法麴丸 治脾痺發欬嘔汁。

法 麴炒

枳 實熬炒

白 茯 苓

吳 茱 萸湯浸炒

桂 心

厚 朴去皮 薑汁炒

當 歸切焙

甘 草炙各兩

麥 蘖微炒 五合

細 辛去苗

乾 薑炮

麥 門 冬去心 焙

附 子炮去

桔 梗炒

人 參各一兩

右爲細末。煉蜜丸。桐子大。每服七十丸。食前熱水下。日三服。
黃耆丸。治脾痺。肌肉消瘦。心腹脹滿。水穀不化。食即欲嘔。飲食無味。四

肢怠惰。或時自利。

黃耆剉

石斛去根

附子炮去

肉苁蓉酒浸

益智去皮

白朮

人參各一

厚朴去皮薑

桂心各半

五味子

當歸

白豆蔻去殼

枳實熬炒

沉香剉

良薑各七錢

訶藜勒煨去核

吳茱萸湯洗

丁香各半

爲細末。煮棗肉和搗五百杵。丸如梧子大。每服三十丸。食前溫酒送下。

茯苓川芎湯

赤茯苓半錢

桑白皮

防風

蒼朮米泔浸

麻黃

芍藥煨

當歸酒洗各

官桂五分

川芎二錢

甘草四分

水二鍾。棗二枚。煎八分。食前溫服。

腎瀝湯

麥門冬去心

五加皮

犀

角各一錢半

杜

仲薑汁炒去絲

桔梗

赤芍藥煨

木

通各一錢

桑螵蛸一個

水二鍾。入羊腎少許。煎八分。食前服。

仙靈脾散 治風走注。往來不定。

仙靈脾

威靈仙

芎

藟

蒼耳子炒

桂心各一兩

右為細末。每服一錢。溫酒調。不拘時。

三因控涎丹

見第二十二

烏藥順氣散

見第六十五

丹溪二妙散

治筋骨疼痛。因濕熱者。如有氣。加氣藥。如血虛。加補血藥。

如痛甚。加薑汁。熱辣服之。

黃蘗炒

蒼朮炒製去皮

佑賢曰
筋骨疼
而用蒼
朮之燥
非有瀝

右為末。生薑研。入湯煎沸調服。此二物皆有雄壯之氣。如表實氣實者。

少酒佐之。

東垣神效黃耆湯見第七

東垣溫經除濕湯 治肢節沉重。疼痛無力之聖藥。

熱不可
各隨氣
血加藥
是丹溪
法一生活

羌活七分

獨活

黃蘗

麻黃去節

當歸各三分

柴胡

黃耆

黃連

木香

草豆蔻

神麴各二分

人參

甘草炙

澤瀉

猪苓

白朮錢各一

陳皮

蒼朮錢各二

白芍藥三錢

升麻五分

右作二服。用水二大盞。煎一盞。去滓。食遠稍熱服。

史國公浸酒方 專治左癱右瘓。四肢頑麻。骨節酸疼。諸般寒濕風氣。

當歸

虎脛骨酒浸一日焙乾酥炙

羌活

鼈甲炙

草薢

防風去蘆

秦艽

川牛膝

松節

晚蠶砂各二兩

枸杞子五兩

乾茄根上八兩飯上蒸熟

脾色外見則身黃目為黃此正濕熱所蒸致之

用無灰酒一斗。絹袋盛藥入酒內。封十日。取飲時。不可面向罈口。恐藥氣衝人頭面。飲酒不可間斷。飲盡。藥滓晒乾為末。米糊丸。梧子大。空心酒下五十丸。忌食發風動氣之物。

五疸脈證第六十九

五疸實熱。脈必洪數。澁微屬虛。最忌發渴。

疸者。黃疸也。謂濕疸、穀疸、女勞疸、酒疸及黃汗也。名雖分五。實脾胃為之總司。濕熱為之原始。夫脾胃屬土。合肌肉而主四肢。其化濕。其性滯着。其色黃。其脈遲緩。所畏者風木。而復喜風之燥。能制者寒水。而反惡水之濕。人之病也。若內無脾胃之鬱。外無風濕之搏。雖有外邪。氣機自利。熱不化濕。疸又何自而成乎。故金匱要略論濕疸曰。寸口脈浮而緩。浮則為風。緩則為痺。痺非中風。四肢苦煩。脾色必黃。瘀熱以行。蓋言風之獨行者。乃名中風。中風則腠理空疎。皮毛開泄。汗出熱越。不能發黃。今則脈浮而緩。浮固為風。緩為土濕。濕則痺着。非若風之疎利。必鬱瘀

穀疸飲
食氣蒸
腸胃並
傷溼熱
而然

成熱。脾土所主之四肢亦苦煩悶。而黃色則蒸行於表也。其論穀疸。則曰。跌陽脈緊而數。數則為熱。熱則消穀。緊則為寒。食即為滿。尺脈浮為傷腎。跌陽脈緊為傷脾。風寒相搏。食穀即眩。穀氣不消。胃中苦濁。濁氣下流。小便不通。陰被其寒。熱流膀胱。身體盡黃。名曰穀疸。夫人飲食入胃。胃主消納。脾主運輸。脾胃溫和。兩稱其職。今胃熱而過于強。則徒能消納。脾寒而失之弱。則不能運輸。既寒且弱。肝木得以乘之。木者風也。風與寒搏。脾愈不運。更加以食。氣愈不消。搏於寒。則中為滿。搏於風。則上為眩。氣既不消。胃中自濁。濁則不能清升。而反下流。下流則脾之緊寒乘腎。胃之數熱乘膀胱。尚書洪範曰。土爰稼穡。穡者作甘。夫萬物藉流而必歸之腎。與膀胱者。亦土乘水義。難經三十七難曰。脾氣通於口。和則知穀味矣。脾主五味。食味之歸於脾者。不可勝數。而獨言一穀味者。正稼穡也。膀胱者。州都之官。主藏津液。腎者水藏。主通二陰。熱流膀胱。而小便又復不利。水與熱鬱。未有不蒸。而蒸而為黃者。以膀胱太陽主表。故黃遍於周身也。或兼寒熱不食。食即頭眩。心胸不安。久其論女勞疸。則曰。額上黑。微汗出。手足中熱。薄暮即發。膀胱急。小便自利。名曰女

女勞疸。得之醉飽。使內腎者。胃之關。門不利。致有此症。

酒疸。是積飲傷脾。以脾土之濕。化傷酒。

勞疸。腹如水狀。不治。此言女勞而成疸。則黃不言可知矣。細察仲景文義。是亦穀氣鬱蒸之變證也。蓋人過勞於房室。則傷精。精傷則腎虛。腎虛則真水不足。真水不足。則相火熾炎。於是胃中濁熱之氣。不流于膀胱。而竟歸之腎。一以乘不足之水。虛一以就同類之火。熾火熾則君火亦因而動。況子午同氣。心腎交通。故不惟腎經之足心熱。而心經之掌心亦熱也。薄暮氣降而屬陰。乘其已虛之陰。助其下流之勢。無如此際。故薄暮病即發也。膀胱雖虛急。而熱不內蓄。故小便自利也。若濕熱相火鬱甚。久而不愈。則脾氣積而不運。腎氣散而不藏。致腹脹如有水狀者。是脾腎兩敗。故不治也。金匱又云。黃家日晡所發熱。而反惡寒。此為女勞得之。膀胱急。少腹滿。身盡黃。額上黑。足下熱。因作黑疸。其腹脹如水狀。大便必黑。時澹。此女勞之病。非水也。腹滿者難治。宜硝礬散主之。其論酒疸。則曰。心中懊懣而熱。不能食。時欲吐。名曰酒疸。酒疸者。過飲而病黃。亦穀氣鬱蒸之變證也。靈樞論勇篇云。酒者。水穀之精。熟穀之液也。熟則已經醞釀。拔其精微。蛭其糟粕。純陽氣勝之物。其性慄悍。多

飲之溼
蒸欲不
成疸得
乎

黃汗以
汗出入
水中此
溼鬱肌
腠所致
法當充
衛宣陽
故治黃
汗者以
黃耆桂
枝為主

升而少降。此今人飲少酒即頭面光紅。非上所云穀氣未經腐熟醞釀者。比故濕熱不流於下。但積於中焦。鬱胃熏心。令人外發黃而內煩懊。不能食而時欲吐也。又云。酒疸諸證。小便不利。心中熱。足下熱。又或無熱。譫語。小腹滿。欲吐。鼻燥。其脈浮者。先吐之。沉弦者。先下之。心中熱。欲嘔者。吐之。愈。酒疸下之。久久為黑疸。目青面黑。心中如噉蒜齏狀。大便正黑。皮膚抓之不仁。其脈浮弱。雖黑微黃。故知之。酒疸心中懊懣。或熱者。梔子大黃湯主之。黃汗一證。仲景金匱要略收入水氣病中。其主治與治疸亦自懸絕。後人以其汗黃。遂列為五疸之一。實非疸也。今本文既云五疸。則黃汗在其中。似不可移去。姑從之。而論治仍從要略。在圓機者。自為識別可也。要略曰。黃汗之為病。身體重。發熱。汗出而渴。狀如風水。汗沾衣。色正黃。如藥汁。脈自沉。從何得之。師曰。以汗出入水中浴。水從汗孔入得之。宜黃耆芍桂酒湯主之。此黃汗之病因也。蓋人作勞。汗出。陽氣動張。陰液妄泄。此時玄府未閉。榮衛兩虛。即浴于水。水寒之邪。未有不乘虛而入者。入則水濕內侵。浮陽外拒。鬱搏于肌肉之間。肌肉

甲錯言
皮膚燥
澀之甚
錯如甲之

者。脾土之合。故身則發熱。而汗則見黃色也。原以榮衛虛而受邪。邪入則愈虛。而陽仍不固。陰液仍泄。即仲景所云陽浮者。熱自發。陰弱者。汗自出之義。以汗液出多。故渴。以水氣在表。故狀如風水。水性就下。故脈沉。治以黃耆芍桂酒湯者。所以和榮固衛。托裏建中。則黃從汗減。水從汗消。與治疸之發汗利小便者。固不可同日語也。又云黃汗之病。兩脛自冷。假令發熱。此屬歷節。食已汗出。又身常暮盜汗出者。此勞氣也。若汗出已。反發熱者。久久其身必甲錯。發熱不止者。必生惡瘡。若身重。汗出已。輒輕者。久久必身暍。暍即胸中痛。又從腰已上。必汗出。下無汗。腰臍弛痛。如有物在皮中狀。劇者不能食。身疼重。煩躁。小便不利。此為黃汗。桂枝加黃耆湯主之。此黃汗之變證也。黃汗既為陰陽兩虛。陽則浮散于表。陰則脫根於下。兩脛逆冷者。其常也。今不冷而反發熱。是熱為濕鬱所成。乘陰之虛。流注下焦。以及于脛。而脛以上之諸節。歷遍而痛。不言可知。此黃汗之傳為歷節者如此。衛者。陽氣也。勞則陽動。陽動則衛氣張散。卒逢食穀。胃陽驟升。張散之虛陽。不能羈穀氣之慄悍。故與

理明義
貫無一
毫用力
虞

之俱出而爲汗也。又暮爲陽衰之時。勞動衰耗之陽。暮則愈衰。衰則不能外固。而汗因盜出矣。此黃汗之挾勞氣者如此。凡熱隨汗而解者。理之常也。今汗已反更發熱。如是久久。則津液續亡。肌膚枯澀。身體又安得不甲錯乎。甲錯而熱仍不止。不但淺災肌膚。亦將禍延肉理。惡瘡之生。勢所必然。如流注癰毒之類。故云惡身重者。水濕之邪也。汗出輒輕。似乎邪解。今云久久者。必輕而復重。重而復輕。亡散衛陽。耗竭津液。不知其幾。而邪仍不去。則必轉爲身潤。而胸中痛矣。靈樞本藏篇云。衛氣和則分肉解利。皮膚調柔。腠理緻密。又云。衛氣者。所以溫分肉。充皮膚。肥腠理。司開闔。素問痺論又云。衛氣循皮膚之中。分肉之間。熏於肓膜。散於胸腹。調經論亦云。陽受氣於上焦。以溫皮膚。分肉之間。觀諸篇論。則知人身分肉腠理。皆衛氣之所充實。上焦胸腹。皆衛陽之所布輸。今衛氣亡散。分肉腠理。不能緻密。而反空虛。空虛故潤而動。上焦胸腹。不得受其熏布。亦隨潤而爲虛痛也。痛必榮氣既虛。衛復不固。况腰已上爲陽。陽主開。故汗出。腰以下爲陰。陰主闔。榮衛虛而邪復滯着。故無汗。惟其無汗。邪

精義入神

黃病屬溼氣鬱結在表宜發汗在裏宜利小便此大法

茵陳氣香性發大有春月發陳之義解散風溼結熱成

不鬆解。故如有物在皮中。而腰臍爲之弛痛也。劇則三焦皆無所御。榮衛不能相將。氣不將於上。則不能食。氣不將於中。則生煩躁。氣不將於下。則小便不利。治以桂枝加黃耆湯者。與上條黃耆芍桂酒湯之義亦同。但此條云食已汗出。常暮盜汗。汗已反熱。汗出輒輕而不解。汗上出而下無。皆似病在汗處。故加薑棗甘草。蓋欲助脾胃以行津液。益辛甘以別取正汗耳。諸病黃家。但利其小便。假令脈浮。宜以汗解之。宜桂枝加黃耆湯主之。治疸利小便固一定之法然脈浮者鬱在表又宜以汗解也諸黃。猪膏髮煎主之。黃疸病。茵陳五苓散主之。治之方通二皆通黃疸腹滿。小便不利而赤。自汗出。此爲表和裏實。當下之。宜大黃硝石湯。汗出爲表和腹滿實者宜下之黃疸病。小便色不變。欲自利。腹滿而喘。不可除熱。熱除必噦。噦者。小半夏湯主之。色不變。欲自利。腹滿而喘。不可除熱。熱除必噦。噦者。小半夏湯主之。則虛象若認大便秘欲自利裏無熱也則喘滿爲諸黃腹痛而嘔者宜柴胡湯腹痛而嘔。小柴胡湯也。男子黃。小便自利。當與虛勞小建中湯。黃而利脾所致。脾傷則見土色。病黃疸。發熱煩喘。胸滿口燥者。以病發時火劫其汗。兩熱所得。然黃家所得。從濕得之。一身盡發熱而黃。肚熱。熱在

黃症須別陰陽
陰則如熏而暗
陽則似橘而明

裏當下之。不獨疸也。熱者手按則知脈沉。渴欲飲水。小便不利者。皆發黃。爲沉在裏。渴爲裏熱。熱則多飲。腹滿。舌痿黃燥。不得睡。屬黃家。胃土鬱則水而小便復不利。必鬱爲黃。腹滿。舌痿黃燥。不得睡。屬黃家。液不分布。故腹滿。舌燥。皆黃經云。胃不和則黃疸之病。當以十八日爲期。治之十日已上。睡不安。皆黃家之先驅也。黃疸之病。當以十八日爲期。治之十日已上。瘥反劇爲難治。上則旺於四時各一十八日。經土之病期亦應之。十日難以治。疸而渴者。其疸難治。疸而不渴者。其疸可治。發於陰部。其人必嘔。發於陽部。其人振寒而發熱也。經上鬱而成疸。內關脾胃發於脾陰。則嘔於陽部。其人振寒而發熱也。發於胃陽。則振寒發熱。皆二經是動之病。正文云。五疸實熱。以疸皆濕與熱鬱。外不得通。內不得泄。畜蒸成黃。虛鬆而有通泄處。則不能成黃。故曰實熱。若是則脈自應洪數。濇微者。自應爲虛黃也。渴爲裏熱。黃爲表蒸。表裏熱亢。陰何以堪。又疸既濕鬱。汗溺不通。可復加之飲乎。渴則多飲。故最忌也。是丹溪云。黃疸不必分五。證是失之太簡。巢氏廣爲九疸。亦失之太繁。惟金匱論證處。方言言中的。學者宗之。自無過不及之偏也。

附方

金匱茵陳湯
治寒熱不食。食即頭眩。心胸不安。久久發黃。名爲穀疸。

苗陳蒿六兩

槌

子
枝十
四

大

黃二兩

釋曰穀
疸乃溼
熱鬱遏
於裏自
可攻發
大黃推
結茵蒿
發陳梔
子解鬱
熱宜矣

右以水一斗。先煮茵陳減六升。內二味。煮三升。去滓。分溫三服。小便當利。尿如皂角汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便去也。

硝石礬石散。治女勞疸。身黃額黑。日晡發熱惡寒。膀胱急。小腹滿。足下熱。因作黑疸。其腹滿如水狀。大便必黑。時澹。此女勞之病。非水也。

硝石

礬石各燒等分

右為散。以大麥粥汁和服二錢。日三。重衣覆取汗。隨大小便去。小便黃。大便黑。是其候也。

金匱梔子大黃湯。治酒疸。心中懊懣。或熱痛。

山梔子十四枚

大黃一兩

枳實五枚

豆豉一升

右四味。以水六升。煮二升。分溫三服。

金匱黃耆芍桂酒湯

黃耆五兩

白芍藥

桂枝各三兩

右以苦酒一升。水七升相和。煮三升。溫服一升。當心煩。服至六七日乃解。若心煩不止者。以苦酒阻故也。

金匱桂枝加黃耆湯 治黃疸脈浮而腹中和者。宜汗之。若腹滿。欲嘔吐。懊懣而不和者。宜吐之。不宜此方。

桂枝

白芍藥

生薑

各三兩

黃耆

甘草

各二兩

大棗

十二枚

右以水八升。煮三升。溫服一升。須更飲熱稀粥一升餘。以助藥力。取微汗。若不汗。更服。

金匱猪膏髮煎

猪膏

半斤

亂髮

如雞子大二枚

右二味和膏中。煎髮消藥成。分再服。病從小便出。

金匱茵陳五苓散

茵陳蒿末 十分

五苓散 五分

右二味和。先食飲方寸匕。日三服。

金匱大黃硝石湯

大黃

黃蘗

梔子

各十五枚

硝石

各四兩 一作滑石

右以水六升。煮二升。去滓。內硝石。更煮取一升。頓服。

金匱小半夏湯

半夏一升 生薑半斤

右以水七升。煮一升半。分溫服。

小柴胡湯

見第四十三

小建中湯

見第二十二

醫燈續焰 卷十 五疸脈證第六十九

醫燈續焰

明 錢塘 王 紹 隆 著

明 錢塘 潘 楫 碩 甫 註

明 錢塘 王 佑 賢 聖 翼 評

鄞縣 曹 赤 電 炳 章 校

卷十一

水病脈證第七十

脈得諸沉。責其有水。浮氣與風。沉石或裏。沉數爲陽。沉遲爲陰。浮大出厄。虛小可驚。

據正文水氣有四。曰氣水。曰風水。曰石水。曰裏水。金匱要略多皮水。正水。黃汗。無氣水。裏水。而氣水裏水。又各突見一條於後。豈以皮水卽氣水。與風水之脈皆浮者。皆爲表水。而以正水。石水。黃汗之脈皆沉者。皆爲裏水者乎。其脈雖諸種不一。而沉則在在皆兼。卽氣水風水之在表

素問云
水入於
經其血

乃成靈樞云經水者受水而行水之則知水為血之則知水為血不能化為血而為血則停留成患隨所在而見症矣設能化則自行經道何厄之有

目裏屬脾土若水勝則土衰故目下腫大目裏上微擁

而脈應浮者。亦必有沉沉欲下之勢。蓋沉下者。水之性也。以狀言。浮則以位言耳。若沉而數。乃為陽水。證必兼陽而熱多。沉而遲。乃為陰水。證必兼陰而寒多。水脈浮大。水氣渙散。災厄將出之象。水脈虛小。則正衰邪存。誠可驚也。金匱要略曰。風水。其脈自浮。外證骨節疼痛。惡風。又云。脈浮而洪。浮則為風。洪則為氣。風氣相搏。風強則為癰疹。身體為癢。癢為泄風。久為痼癩。氣強則為水。難以俛仰。風氣相擊。身體洪腫。汗出乃愈。惡風則虛。此為風水。不惡風者。小便通利。上焦有寒。其口多涎。此為黃汗。又云。寸口脈沉滑者。中有水氣。面目腫大。有熱。名曰風水。視人之目裏上微擁如蠶新臥起狀。其頸脈動。時時欬。按其手足上陷而不起者。風水。又云。太陽病。脈浮而緊。法當骨節疼痛。反不疼。身體反重而痠。其人不渴。汗出即愈。此為風水。惡寒者。此為極虛。發汗得之。渴而不惡寒者。此為皮水。身腫而冷。狀如周痺。胸中窒。不能食。反聚痛。暮躁不得眠。此為黃汗。痛在骨節。欬而喘。不渴者。此為脾脹。其狀如厥。發汗即愈。然諸病此者。渴而下利。小便數者。皆不可發汗。又云。風水脈浮。身重。汗

為風水
學者當
知

佑賢曰
氣也水
也血也
分而有
三而其
源一也
水渙為

出惡風者。防己黃耆湯主之。腹痛加芍藥。又云。風水惡風。一身悉腫。脈浮不渴。續自汗出。無大熱。越婢湯主之。皮水。其脈亦浮。外證肘腫。按之沒指。不惡風。其腹如鼓。不渴。當發其汗。又云。皮水為病。四肢腫。水氣在皮膚中。四肢聶聶動者。防己茯苓湯主之。又云。厥而皮水者。蒲灰散主之。正水。其脈沉遲。外證自喘。石水。其脈自沉。外證腹滿不喘。黃汗其脈久不愈必致癰腫裏水者。一身面目黃腫。其脈沉。小便不利。故令病水。假如小便自利。此亡津液。故令渴也。越婢加朮湯主之。甘草麻黃湯亦主之。又云。心水者。其身重而少氣。不得臥。煩而躁。其人陰腫。宜防己當歸散肝水者。其腹大。不能自轉側。脇下腹痛。時時津液微生。小便續通。宜分氣補心湯肺水者。其身腫。小便難。時時鴨溏。宜扶苓湯之類脾水者。其腹大。四肢苦重。津液不生。但苦少氣。小便難。宜胃苓湯調胃類腎水者。其腹大。臍腫腰痛。不得溺。陰下濕。如牛鼻上汗。其足逆冷。面反瘦。宜金匱腎氣丸之類又云。寸口脈沉而遲。沉則為水。遲則為寒。寒水相搏。趺陽脈伏。水穀不化。脾氣衰。則驚漉。胃氣衰。則身腫。少陽脈卑。少

氣氣停 為水入 心變赤 則為血 故奪血 者無汗 汗多者 亡陽陽 即氣也 能知此 義則血 分氣分 之病治 不難矣

陰脈細。男子則小便不利。婦人則經水不通。經為血。血不利。則為水。名曰血分。宜調榮散四製又云。寸口脈遲而濇。遲則為寒。濇為血不足。跌陽脈微而遲。微則為氣。遲則為寒。寒氣不足。則手足逆冷。手足逆冷。則榮衛不利。榮衛不利。則腹滿。脇鳴相逐。氣轉膀胱。榮衛俱勞。陽氣不通。即身冷。陰氣不通。即骨疼。陽前通。則惡寒。陰氣通。則痺不仁。陰陽相得。其氣乃行。大氣一轉。其氣乃散。實則失氣。虛則遺尿。名曰氣分。宜防陽記元丹之類。復又云。氣分。心下堅大如盤。邊如旋杯。水飲所作。桂枝去芍藥加麻辛附子湯主之。又云。心下堅大如盤。邊如旋盤。水飲所作。枳朮湯主之。旋圓也。杯高於盤。盤大於杯。此杯盤之異。總皆水飲聚結。又云。水之為病。其脈沉小。屬少陰。浮者為風。無水。虛脹者。為氣。水發其汗。即已。脈沉者。宜麻黃附子湯。浮者。宜杏子湯。又云。病者苦水。面目四肢身體皆腫。小便不利。脈之不言水。反言胸中痛。氣上衝咽。狀如炙轡。當微欬喘。審如師言。其脈何類。師曰。寸口脈沉而緊。沉為水。緊為寒。沉緊相搏。結在關元。始時當微。年盛不覺。陽衰之後。榮衛相干。陽損陰盛。結寒微動。腎氣上衝。喉咽塞噎。脇下

急痛。醫以爲留飲而大下之。氣擊不去。其病不除。後重吐之。胃家虛煩。咽燥欲飲水。小便不利。水穀不化。面目手足浮腫。又與葶藶丸下水。當時如小差。食飲過度。腫復如前。胸脇苦滿。象如奔豚。其水洋溢。則浮欬喘逆。當先攻擊衝氣令止。乃治欬。欬止。其喘自差。先治新病。病當在後。宜金匱腎氣丸。又云。趺陽脈當伏。今反緊。本自有寒疝瘕。腹中痛。醫反下之。下之。卽胸滿短氣。又云。趺陽脈當伏。今反數。本自有熱消穀。小便數。今反不利。此欲作水。又云。寸口脈浮而遲。浮脈則熱。遲脈則潛。熱潛相搏。名曰沉。趺陽脈浮而數。浮脈卽熱。數脈卽止。熱止相搏。名曰伏。沉伏相搏。名曰水。沉則絡脈虛。伏則小便難。虛難相搏。水走皮膚。卽爲水矣。又云。寸口脈弦而緊。弦則衛氣不行。緊卽惡寒。水不沾流。走於腸間。又云。少陰脈緊而沉。緊則爲痛。沉則爲水。小便卽難。脈得諸沉。當責有水。身體腫重。水病脈出者死。脈出者。脈出而散。欲其歸源。不可得矣。又云。夫水病人。目下有臥蠶。面目鮮澤。脈伏。其人消渴。病水腹大。小便不利。其脈沉絕者。有水。可下之。又云。病下利後。渴飲水。小便不利。腹滿因腫者何也。答曰。

腰以上
為陽當
發汗謂
之開鬼
門腰以
下為陰
當利小
便謂之
潔淨府
此大法

三藏作
用得失
說得最
精須熟
玩之

*本在腎
末在肺
乃水之

此法當病水。若小便自利。及汗出者。自當愈。又云。諸有水者。腰以下腫。當利小便。腰以上腫。當發汗。乃愈。以上金匱論水病之寒熱虛實表裏陰陽藏府氣血。雖有多種。然約而言之。總不外腎脾肺三藏。為之原始也。蓋腎居下焦。屬水。統攝陰液。為水之宗本。右為相火。火以濟寒。故水得以宣揚也。脾居中焦。屬土。合肌肉。為水之隄防。主化穀生津。津生不窮。故水得以灌漑也。肺居上焦。屬金。主氣。為水之化源。行榮衛而出治節。故水得以通調也。人或房室勞倦。憂思恐懼。飲食起居。各以類傷其藏。而藏氣虛。虛則各失其職。而水液之常道紊矣。在腎則不能統攝宣揚。而停蓄。在脾則不能隄防灌漑。而濫行。在肺則不能生化通調。而壅閉。况脾與胃合。胃又倚腎為關。關門不利。則水聚。利則必由於氣化。是肺又為腎關之所倚也。故素問水熱穴論曰。其本在腎。其末在肺。皆聚水也。右仲景治水方法。皆以脈證為本。而後量其輕重虛實。治之百無一失。世俗淺醫。欲求急效。動以破氣去水為正治。不知暫寬一二。腫滿續至。坐視其死者比比。可勝悼哉。後學當不厭其繁。而一惟以靈素金

源流治
水方治
從此體
認

匱爲準。斯得之矣。準繩云。腫病不一。或偏身腫。或四肢腫。面腫。脚腫。皆謂之水氣。然有陽水。有陰水。並可先用五皮飲。或除濕湯。加木瓜。腹皮各半錢。如未效。繼以四磨飲。偏身腫。煩渴。小便赤澀。大便多閉。此屬陽水。輕宜四磨飲。添磨生枳殼。兼進保和丸。重則疏鑿飲。子利之。以通爲度。亦有雖煩渴而大便已利者。此不可更利。宜用五苓散。加木通。大腹皮半錢。以通小便。偏身腫。不煩渴。大便自調。或澹泄。小便雖少而不赤澀。此屬陰水。宜實脾飲。小便多少如常。有時赤。有時不赤。至晚則微赤。却無滯滯者。亦屬陰也。不可遽補。木香流氣飲。繼進復元丹。若大便不澀。氣息脹滿。宜四磨飲。下黑錫丹。四肢腫。謂之肢腫。宜五皮飲。加薑黃。木瓜各一錢。或四磨飲。或用白朮三兩。咬咀。每服半兩。水一盞半。大棗三枚。拍破。同煎至九分。去滓溫服。日三。無時。名大棗湯。面獨腫。蘇子降氣湯。兼氣急者尤宜。或煎熟去滓後。更磨沉香一呷。有一身之間。惟面與雙脚浮腫。早則面甚。晚則脚甚。經云。面腫爲風。脚腫爲水。乃風濕所致。須問其大小腸通閉。別其陰陽二證。前後用藥。惟除

佑賢曰
有外感
不得汗
微者久
之生瘡
爲邪出
路不知
者反傳
以藥則
邪閉成
腫不能
外達甚

濕湯。加木瓜、腹皮、白芷各半錢。可通用。或以蘇子降氣湯、除濕湯。各半貼煎之。羅謙甫導滯通經湯。治面目手足浮腫。感濕而腫者。其身雖腫。而腰下至脚尤腫。腿脹滿尤甚於身。氣或急。或不急。大便或澹。或不澹。但宜通利小便爲佳。煎五苓散。吞木瓜丸。內犯輕服牛亦間進除濕湯。加木瓜、腹皮各半錢。炒萊菔子七分半。因氣而腫者。其脈沉伏。或腹脹。或喘急。宜分氣香蘇飲。飲食所傷而腫。或胸滿。或噯氣。宜消導寬中湯。不服水土而腫者。胃苓湯。加味五皮湯。有患生瘡。用乾瘡藥太早。致偏身腫。宜消風敗毒散。若大便不通。升麻和氣散。若大便如常。或自利。當導其氣。自小便出。宜五皮飲。加生料五苓散。腹若腫。只在下。宜除濕湯。和生料五苓散。加木瓜、澤瀉之類。已上數條。爲有餘之證。大病後浮腫。此係脾虛。宜加味六君子湯。白朮三錢。人參、黃耆各一錢半。白茯苓二錢。陳皮、半夏、芍藥、木瓜各一錢。炙甘草、大腹皮、木香各五分。薑棗煎服。小便不利。間入五苓散。有脾肺虛弱。不能通調水道者。宜用補中益氣湯。補脾肺。六味丸補腎。有心火尅肺金。不能

則膨脹
喘滿而
死者慎
之

引症精
鮮集方
備悉搜
奇索隱
無遺漏
矣

生腎水。以致小便不利而成水證者。宜人參平肺散。若腎經陰虧。虛火燥肺。金而小便不生者。用六味地黃丸以補腎水。用補中益氣湯以培脾土。脾肺腎之氣交通。則水穀自然剋化。二經既虛。漸成水脹。又誤用行氣分利之藥。以致小便不利。喘急痰盛。已成蠱證。宜加減金匱腎氣丸主之。已上數條。為不足之證。不足者。正氣不足。有餘者。邪氣有餘。凡邪之所湊。必正氣虛也。故以治不足之法治有餘。則可以治有餘。法治不足。則不可。潔古法。如水腫因氣為腫者。加橘皮。因濕為腫者。煎防己黃耆湯。調五苓散。因熱為腫者。八正散。如火熱燥肺為腫者。乃絕水之源也。當清肺除燥。水自生矣。於梔子豉湯中加黃芩。如熱在下焦。陰消使氣不得化者。當益陰而陽氣自化。黃蘗黃連是也。如水脹之病。當開鬼門。潔淨府也。白茯苓湯主之。白茯苓湯能變水。白茯苓澤瀉各二兩。郁李仁五錢。水一碗。煎至一半。生薑自然汁入藥。常服無時。從少至多。服五七日後。覺腹下再腫。治以白朮散。白朮澤瀉各半兩。為末。煎服三錢。或丸亦可。煎茯苓湯下三十丸。以黃耆芍

腫脹之
疾禁忌
須嚴

藥建中湯之類調養之。平復後。忌房室、猪魚鹽麵等物。香菇熬膏。丸如桐子大。每服五丸。日三。漸增。以小便利爲度。冬瓜不限多少。任喫。鯉魚一頭。重一斤已上者。煮熟。取汁和冬瓜葱白作羹食之。青頭鴨。或白鴨。治如食法。細切。和米并五味煮熟作粥。食之。宜空腹時進。昔人論水病。知經義者。固惟仲景一人。近世何柏齋。張景岳二論。亦庶幾焉。故附錄於左。柏齋曰。造化之機。水火而已。宜平不宜偏。宜交不宜分。水爲濕。爲寒。火爲燥。爲熱。火性炎上。水性潤下。故火宜在下。水宜在上。則易交也。交則爲既濟。不交則爲未濟。不交之極。則分離而死矣。消渴證。不交而火偏盛也。水氣證。不交而水偏勝也。制其偏而使之交。則治之之法也。小火不能化大水。故必先瀉其水。後補其火。開鬼門。瀉在表在上之水也。潔淨府。瀉在裏在下之水也。水勢既減。然後用煖藥以補元氣。使水火交。則用藥之次第也。又云。盧氏以水腫隸肝腎胃而不及脾。丹溪非之似矣。然實則皆非也。蓋造化生物。天地水火而已矣。主之者天也。成之者地也。故曰乾知太始。坤作成物。至於天地交合變化之

用。則水火二氣也。天運水火之氣於地之中。則物生矣。然水火不可偏盛。太旱物不生。火偏盛也。太澇物亦不生。水偏盛也。水火和平。則物生矣。此自然之理也。人之藏府。以脾胃爲主。蓋飲食皆入於胃而運以脾。猶地之土也。然脾胃能化食與否。實由於水火二氣。非脾胃所能也。火盛。則脾胃燥。水盛。則脾胃濕。皆不能化物。乃生諸病。水腫之證。蓋水盛而火不能化也。火衰。則不能化水。故水之入於脾胃者。皆滲入血脈。骨肉血亦化水。肉發腫脹。皆自然之理也。導去其水。使水少減。復補其火。使二氣平和。則病去矣。丹溪謂脾失運化。由肝木侮脾。乃欲清心經之火。使肺金得令。以制肝木。則脾土全運化之職。水自順道。乃不爲腫。其詞迂而不切。故書此辯之。

景岳曰。愚按腫脹一證。觀靈樞脹論之義。則五藏六府。無不有之。再考諸篇。如脈要精微論曰。胃脈實。氣有餘則脹。邪氣藏府病形篇曰。胃病者。腹臃脹。胃脘當心而痛。本神篇曰。脾氣實。則腹脹。涇洩不利。陰陽應象大論曰。濁氣在上。則生臃脹。此皆實脹也。太陰陽明論曰。飲食起居

失節。入五藏。則臍滿閉塞。經別篇曰。足太陰之別。公孫虛則鼓脹。皆虛脹也。經脈篇曰。胃中寒。則脹滿。異法方宜論曰。藏寒生滿病。風論曰。胃風鬲塞不通。腹善脹。失衣則臍脹。此皆寒脹也。陰陽別論曰。二陰一陽發病。善脹心滿。診要經終論曰。手少陰終者。腹脹閉。足太陰終者。腹脹閉。此心脾受傷之脹也。此外如六元正紀。至真要大等論。有云太陰所至。爲身重脚腫。及土鬱之發。太陰之初氣。太陰之勝復。皆濕勝之腫脹也。有曰水運之太過。有曰寒勝則浮。有曰太陽之司天。太陽之勝復。皆寒勝之腫脹也。有曰少陰之司天。少陰之勝復。少陽之司天。少陽之勝復。有曰熱勝則腫。皆火勝之腫脹也。有曰厥陰之司天在泉。厥陰之復。有曰陽明之復。是皆水邪侮土。及金氣反勝之腫脹也。觀此。則不惟五藏六府。卽五運六氣。亦無不皆有是病。然至真要大論曰。諸濕腫滿。皆屬於脾。水熱穴論曰。其本在腎。其末在肺。皆聚水也。又曰。腎者胃之關也。關門不利。故聚水而從其類也。由此言之。則諸經雖皆有脹。然無不關於脾肺腎三藏。蓋脾屬土。主運化。肺屬金。主氣。腎屬水。主五液。凡五

爲識病
捷法

在氣不

氣所化之液。悉屬於腎。五液所行之氣。悉屬於肺。轉輸於二藏之中。以制水生金者。悉屬於脾。所以腫脹之生。無不由此三者。但證有陰陽虛實。如諸論之所云者。不可不辨。大都陽證多熱。熱者多實。陰證多寒。寒者多虛。先脹於內而後及於外者多實。先腫於表而後甚於裏者多虛。小便黃赤。大便秘結者多實。小水清白。大便稀溏者多虛。脈滑數有力者多實。弦浮微細者多虛。形色紅黃。氣息羸長者多實。容顏憔悴。音聲短促者多虛。凡是實證。必由六淫有餘傷其外。或飲食怒氣傷其內。故致氣道不行。三焦壅閉。此則多在氣分。無處不到。故不分部位而多通身浮腫。又或氣實於中。則爲單腹脹急。然陽邪急速。其至必暴。每成於旬日數日之間。此惟少壯者多有之。但破其結氣。利其壅滯。則病無不愈。此治實之道也。若是虛證。必由五志積勞。或酒色過度。傷其脾腎。日積月累。其來有漸。此等病候。多染於中年之外。其形證脈氣。必有虛寒之候。顯然可察。非若實證之暴至。而邪熱壅結。肝氣悍逆之有因也。治實者。本無所難。最難者在治虛耳。然虛有在氣者。有在水者。在氣者。以

能升清
降濁在
血不能
上下分
消

立齋用
六味丸
資水化
源用八
味資火
化源正
是此義

脾氣虛寒。不能運化。所謂氣虛中滿者是也。在水者。以脾虛不能制水。則寒水反侮脾土。泛濫為邪。其始也。必從陰分。漸次而升。按肉如泥。腫有分界。所謂水鼓水脹者是也。然水雖制於脾。而實主於腎。蓋腎本水藏。而元陽生氣所由出。若腎中陽虛。則命門火衰。既不能自制陰寒。又不能溫養脾土。陰陽不得其正。則化而為邪。夫氣即火也。精即水也。氣之與水。本為同類。但在於化與不化耳。故陽王。則化而精能為氣。陽衰。則不化而水即為邪。凡火盛水虧。則病燥。水盛火虧。則病濕。故火不能化。則陰不從陽。而精氣皆化為水。所以水腫之證。多屬陽虛。故曰寒脹多。熱脹少也。然觀丹溪之治腫脹。云清濁相混。隧道壅塞。而為熱。熱留為濕。濕熱相生。遂成脹滿。治宜補其脾。又須養肺金以制木。使脾無賊邪之患。滋腎水以制火。使肺得清化之令。其說重在濕熱。而猶以制火為言。夫制火固可保金。獨不慮其不生土乎。若以此法。施於陽實而熱者。則可。若以治陽虛而氣不化者。豈不反助陰邪而益其病哉。故予之治腫脹。審其果係實邪。則直清陽明。除之極易。凡屬虛勞內損者。多從

古人有
探治之
法故有
消息詳
慎之戒

溫補脾腎而愈。俱得復元。或臨證之際。有虛實未明。疑似難決者。則寧先以治不足之法。探治有餘。若果未投而病反加甚。是不宜補也。不妨易轍。自無大害。倘藥未及病而病自甚者。其輕重真假。仍宜詳察。若誤以治有餘之法。治不足。而曾經峻攻者。真氣復傷。雖神丹不能療也。或從清利。暫見平復。使不大補脾腎。以培根本。雖愈目前。未有不危亡踵至者。此治虛之道也。水脹之病。多有標實本虛。最爲危機。若辨之不慎。禍人非淺。

附方

仲景防己黃耆湯

見第六十七

仲景越婢湯 加朮四兩。卽越婢加朮湯。

麻黃六兩

石膏半斤

生薑三片

大棗十五枚

甘草二兩

水六升。先煮麻黃。去上沫。內諸藥。煮三升。分溫三服。

防己茯苓湯

防己

黃耆

桂枝各三兩

茯苓六兩

甘草二兩

水六升。煮二升。分溫三服。

蒲灰散

蒲

灰一兩七錢半

滑石五錢

右杵爲散。飲服方寸匕。日二服。

甘草麻黃湯

甘草二兩

麻黃四兩

水五升。先煮麻黃。去上沫。內甘草。煮三升。溫服一升。重覆汗出。不汗再服。慎風寒。

當歸散。水腫之疾。多由腎氣不能攝養心火。心火不能滋養脾土。故土不制水。水氣盈溢。氣脈閉塞。滲透經絡。發爲浮腫。心腹堅脹。喘滿不安。

當歸

桂心

木香

赤茯苓

木通

檳榔

赤芍藥

牡丹皮

陳皮 白朮各一錢三分

水二鍾。紫蘇五葉。木瓜一片。煎一鍾。不拘時服。

分氣補心湯 治心氣鬱發為四肢浮腫。上氣喘急。

木通 川芎 前胡去苗 大腹皮泡

青皮 白朮 枳殼麸炒 甘草炙各一錢

香附炒去毛 白茯苓 桔梗錢半 細辛

木香各五分

水二鍾。薑三片。紅棗二枚。煎一鍾。食前服。

分氣香蘇飲

桑白皮炒 陳皮 茯苓 大腹皮

香附炒各一錢 紫蘇半一錢 桔梗 枳殼各八分

草果仁七分 五味子粒十五

水二鍾。薑三片。煎八分。入鹽少許。食前服。

導水茯苓湯 治水腫。頭面手足徧身腫如爛瓜。手按而陷。手起隨高。喘

滿倚息。不能轉側。不能倒臥。飲食不下。小便祕澀。溺出如割。或如黑豆汁。諸藥不效。用此即愈。

赤茯苓

麥門冬去心

澤瀉

白朮各三兩

桑白皮

紫蘇

檳榔

木瓜各一兩

大腹皮

陳皮

砂仁

木香各七錢半

右咬咀。每服半兩。水二盞。燈草二十五根。煎八分。去滓。空心服。如病重者。可用藥五兩。再加去心門冬二兩。燈草半兩。水一斗。於砂鍋內熬一大碗。再下小銚內。煎至一大盞。五更空心服。滓再煎服。連進三服。小水自利。一日添如一日。

胃苓湯見第七十

元戎調胃白朮澤瀉散 治痰病化為水氣。傳為水鼓。不能食。

白朮

澤瀉

芍藥

陳皮

茯苓

生薑

木香

檳榔各等分

右為末。水煎服。一法加白朮。治臍腹上腫如神。心下痞者加枳實。下盛

者加牽牛。

金匱八味丸見第十六

濟生腎氣丸。治腎虛脾弱。腰重脚腫。小便不利。或肚腹腫脹。或喘急痰盛。已成蠱證。其效如神。此證多因脾胃虛弱。治失其宜。元氣復傷而變者。非此不救。

熟地黃四兩 薯蕷一兩 山茱萸一兩 澤瀉一兩

茯苓三兩 牡丹皮一兩 肉桂一兩 附子炮五錢

牛膝一兩 車前子一兩

右末。煉蜜丸如桐子大。每服七八十丸。空心米飲下。

調榮飲。治瘀血留滯化爲水。四肢浮腫。皮肉赤紋。名血分。

蓬朮 川芎 當歸 延胡索

白芷 檳榔 陳皮 赤芍藥

桑白皮炒 大腹皮 赤茯苓 葶藶炒

瞿麥各一錢 大黃半錢 細辛 官桂

甘草炙各五分

作一服。水二鍾。薑三片。紅棗二枚。煎一鍾。食前服。

四製香附丸 治婦人女子經候不調。

香附浸去皮一斤分作四分酒浸一分鹽水浸一分童便一分醋浸一分各三日焙乾

右為細末。醋糊丸如桐子大。每服七十丸。空心食前溫酒下。香附子血中氣藥

也開鬱行氣而血自調何病不開鬱婦人宜常服之

濟生寶脾飲 治陰水發腫。用此先實脾土。

厚朴去皮製 白朮 木瓜去穢 大腹子

附子炮 木香不見火 草果仁 白茯苓去皮

乾薑炮各一兩 甘草炙半兩

右咬咀。每服四錢。水一盞。薑五片。棗一枚。煎七分。不拘時溫服。

復元丹見第四十六

桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯

桂枝 生薑各三兩 甘草一兩 大棗十二枚

佑賢曰 香附多毛 堅而氣勝 為肺家 專藥故 助肺氣 以行榮 衛是經 婦人宜 永悉宜 之四製 法更精

佑賢曰
用氣藥
治水要
知氣行
則水行
一補一
消有體
有用此
方之所
以立也

麻黃

細辛各二兩

附子一枚

右以水七升。先煮麻黃。去上沫。內諸藥。煮取二升。分溫三服。當汗出。如蟲行皮中。即愈。

金匱枳朮湯

枳實七枚 白朮二兩

右以水五升。煮取三升。分溫三服。腹中軟。即當散也。

麻黃附子湯

麻黃三兩 甘草二兩 附子一枚

水七升。先煮麻黃。去上沫。內二味。煮取二升半。溫服八合。日三服。

葶藶丸 治肺氣欬嗽。面目浮腫。喘促不安。小便赤色。

甜葶藶隔紙炒 貝母煨黃 木通各一兩 杏仁去皮尖

防己各二兩

為末。棗肉丸如桐子大。每服五十丸。桑皮煎湯。食前下。

和劑五皮散 治風濕客於脾經。氣血凝滯。致面目虛浮。四肢腫滿。心腹

膨脹。上氣喘急。兼治皮水妊娠胎水。

五加皮

地骨皮

生薑皮

大腹皮

茯苓皮

各等分 沉香 一方加白朮 入服

右咬咀。每服三錢。水一盞。煎七分。熱服無時。

除濕湯

見第二十一

濟生四磨湯 治七情感傷。上氣喘悶不食。

人參

檳榔

沉香

天台烏藥

右四味。各濃磨水。取七分。煎三五沸。放溫。空心服。或下養正丹尤佳。濟生疏鑿子飲 治水氣。浮腫喘急。煩躁多渴。大小便不利。服熱藥不得者。

澤瀉

商陸

赤小豆炒

羌活

去蘆

大腹皮

椒目

木通

秦艽

去蘆

茯苓皮

檳榔

各等分

右咬咀。每四錢。水一盞。薑五片。煎七分。空心服。

五苓散見第十七

和劑木香流氣飲。治諸氣痞塞不通。胸膈膨脹。面目虛浮。四肢腫滿。口

苦咽乾。大小便秘。

半夏煨二雨

紫蘇去梗香附子去毛

甘草炙各一斤

陳皮去白二斤

青皮去白

厚朴薑製去粗皮

肉桂去麝皮不見火蓬莪朮煨

丁香皮不見火

草果仁各六雨

木通去節八雨藿香葉

白芷

赤茯苓去皮

白朮乾木瓜

人參去蘆

石菖蒲各四雨

右咬咀。每服四錢。水一盞半。薑三片。棗二枚。煎七分。熱服。

和劑黑錫丹。治痰氣壅塞。上盛下虛。心火炎盛。腎水枯竭。一應下虛之

證。及婦人血海久冷無子。赤白帶下。

沉香

葫蘆巴酒浸炒

附子炮

陽起石研細水飛各一雨

肉桂半雨

破故紙

舶茴香炒

肉豆蔻煨麵裹

木香

金鈴子

硫黃

黑錫去滓秤各二雨

右用黑鹽。或新鐵銚內。如常法結黑錫硫黃砂子。地上出火毒。研極細。餘藥細末和勻。自朝至暮。以研至黑光色爲度。酒糊丸如桐子大。陰乾。入布袋內。擦令光瑩。每四十丸。空心鹽薑湯。或棗湯下。女人艾棗湯下。和劑蘇子降氣湯。治虛陽上攻。氣不升降。上盛下虛。痰涎壅盛。胸膈噎塞。并久年肺氣至效。

紫蘇子炒

半

夏二錢湯各半前

胡去蘆

甘草炙

厚

朴去皮薑

陳

皮去白各一錢

川當歸去蘆一錢半

沉香七分

水二鍾。薑三片。煎一鍾。不拘時服。虛冷久加桂五分。黃耆一錢。

寶鑑導滯通經湯

治脾濕有餘。及氣不宣通。面目手足浮腫。

木香

白朮

桑白皮

陳皮

茯苓

各等分

右咬咀。每五錢。水二盞。煎一盞。去滓。溫服。空心食前。內經云。濕淫所勝。平以苦熱。以苦燥之。以淡泄之。陳皮苦溫。理肺氣。去氣滯。故以爲主。桑皮甘寒。去肺中水氣。水腫臃脹。利水道。故以爲佐。木香苦辛溫。除肺中

佑賢曰
有白朮
而曰導
滯無經
血藥云
通經其
意有在
之可細
思

滯氣。白朮苦甘溫。能除溼和中。以苦燥之。白茯苓甘平。能止渴除濕。利小便。以淡滲之。故以為使也。

和劑木瓜圓 治腎經虛弱下攻。腰膝沉重少力。腿脚腫癢。疰破生瘡。脚心癢痛。筋脈拘攣。或腰膝緩弱。步履艱難。舉動喘促。面色黧黑。大小便秘澁。飲食減少。無問久新。並宜服之。

熟地黃洗焙

陳皮去白

烏藥各四

黑牽牛炒三

石楠藤

杏仁去皮

當歸

菴蓉酒浸

乾木瓜

續斷

牛膝酒浸各

赤芍藥一兩

右為細末。酒糊為圓。如桐子大。空心木瓜湯吞三五十圓。溫酒亦得。

消導寬中湯

白朮一錢五分

枳實炒

厚朴薑製

陳皮

半夏

山楂肉

茯苓

神麴炒

麥芽炒

蘿蔔子炒各一錢

水二鍾。薑三片。煎八分。小便利。不利加。

加味五皮湯 卽五皮散。脚腫加五加皮、木瓜、防己。不服水土。入胃苓湯。消風敗毒散

人參

獨活

柴胡

桔梗

枳殼麸炒

羌活

茯苓

川芎

前胡

甘草

荆芥

防風各一錢

水二鍾。薑三片。煎八分。食遠服。

和劑升麻和氣散

乾薑五分

乾葛一兩

大黃蒸半兩

熟枳殼五分

桔梗

熟蒼朮

升麻各一兩

芍藥七錢

陳皮

甘草各半兩

當歸

熟半夏

白芷

茯苓各二錢

每服四錢。水一盞。薑三片。燈心十莖。煎七分。食前溫服。

補中益氣湯見第三十九

六味丸見第六十

佐賢曰
言受熱
則知非
肺家自
生之熱
故方中
用人參
五味

東垣人參平肺散 治肺受熱而喘。

桑白皮炒二錢

知母半一錢

甘草炙

茯苓

人參

地骨皮

天門冬去心各一錢

青皮

陳皮各六分

五味子搥三十粒

水二鍾。生薑五片。煎一鍾。食遠溫服。如熱加黃芩、薄荷葉。各一錢。

八正散見第四十九

梔子豉湯

梔子十四枚炒

香豉四合

傷寒汗吐下後。虛煩不得眠。心中懊懣者。此方主之。汗吐下之後。正氣不足。邪氣乘虛而結于胸中。故煩熱懊懣。煩熱者。煩擾而熱。懊懣者。懊惱懷悶也。梔子味苦。能湧吐熱邪。香豉氣腐。能剋制熱勢。所謂苦勝熱。腐勝焦也。是方也。惟吐無形之虛煩則可。若用之以去實。則非梔子所能宣矣。宣實者。以瓜蒂散主之。

醫燈續焰 卷十一 水病脈證第七十

醫燈續焰

明 錢塘 王 紹 隆 著

明 錢塘 潘 楫 碩 甫 註

明 錢塘 王 佑 賢 聖 翼 評

鄞縣 曹 赤 電 炳 章 校

卷十二

脹滿脈證第七十一

脹滿脈弦。土制於木。濕熱數洪。陰寒遲弱。浮爲虛滿。緊則中實。浮大可治。虛小危極。

滿乃脹
之漸
乃滿
之極

脹。謂脹於外。滿。謂滿於中。排藏府而廓胸脇。急皮膚而露筋脈。臍凸腰圓。鼓之如鼓。胸腹之疾也。間亦有脹及於頭面四肢者。與水腫大同小異。而此則無水耳。大抵飲食不節。起居失宜。房室過勞。憂思無極。久久

陽在內
陰之守
也

皆足以耗其守陰。衰其陽運。致氣壅滯留中。而脹滿之疾漸起矣。故實者少。虛者多。熱者少。寒者多。成於他藏府者少。成於脾胃者多。蓋虛則氣空浮。故易鼓而大。寒則氣凝滯。故易壅而堅。脾胃居中。以胸腹為宮城。屬土而化濕。性緩氣屯。故亦易脹易滿。此但言其常耳。至若五藏六府盛衰之脹。五運六氣勝負之脹。有實者。有熱者。有成於他藏府者。又不能以此數端盡也。在圓機者。自為審別。再宜參看張景岳水脹一論。斯得之矣。靈樞諸脹。則有本神篇所云。腎氣實則脹。而腎主藏。藏已中實。言可知。經脈篇所云。胃病則大腹水腫。制水屬土。而主中焦。土病不能。又云。胃中寒。則脹滿。而寒則氣滯。又云。足太陰虛。則鼓脹。則脾不足。太陰主運。運虛虛則空。故邪氣藏府病形篇所云。三焦病者。腹氣滿。小腹尤堅。不得小便。窘急。溢則水留。即為脹候。在足太陽之外大絡。三焦主氣。化為滯而遊。行者阻。故病如是在太陽。熱病篇所云。男子如蠱。女子如疽。蠱者。蠱毒也。者。三焦聯絡膀胱耳。熱病篇所云。男子如蠱。女子如疽。蠱者。蠱毒也。阻者。阻也。阻滯如懷。素問諸脹。則有脈解篇所云。太陰所謂病脹者。太陰者。形也。容腹之大。懷。素問諸脹。則有脈解篇所云。太陰所謂病脹者。太陰子也。十一月。萬物氣皆藏於中。故曰病脹。實故病如是大奇論所云。

肝滿。肺滿。腎滿。胃實。即為腫。肺之壅。喘而兩胠滿。肝壅。兩胠滿。臥則驚。不得小便。腎壅。胠下至少腹滿。脛有大小。脾胠大。跛。易偏枯。肺主氣而實。則氣喘而兩胠滿。肝壅。實。胠滿。臥驚。而難小。便。腎壅。實。則少腹滿。而脛。脾大。調經論所云。志有餘。則腹脹。志為腎所藏。有餘。則實。實則脈。要精微論所云。胃氣實。則脹。口下。脈下。循腹裏。實。則經脈。滿。湧。故脹。陰陽應象大論所云。中滿者。瀉之於內。中滿。實。則從內瀉之。及成。其害也。不可不審。又云。濁氣在上。則生臌脹。清陽上升。濁氣下降。濁氣不降。則生氣通天論所云。因於氣為腫。四維相代。陽氣乃竭。何腫之有。設或不調。不順。則壅滯。而形腫於外。四維乃人之四肢。為諸陽之本。更代俱病。陽氣不從此衰。竭乎。即本篇所云。失之。則外壅。肌肉。衛氣。散解之義。太陰陽明論所云。飲食不節。起居不時者。陰受之。陰受之。則入五藏。入五藏。則臌滿閉塞。而飲食起居。為內傷。內傷。則陰受之。平人氣象論所云。盛而緊曰脹。此言脹病之脈也。盛。則氣強。皆中有餘邪。故脹。異法方宜論所云。藏寒生滿病。此言生於方土也。北土地寒。乳酪為食。五常政大論所云。適寒涼者。脹也。適往。外寒。斂而內滯。臌故滿。病生焉。往寒涼之。處。外刺熱。篇所云。下牙車。為腹滿。此言外部之色。應腹中而閉內鬱。故脹。刺熱篇所云。下牙車。為腹滿。知脹滿也。牙車。即牙床轉。

虛滿則
有時而
減

動之虞。牙車之下。正應腹中。腹脹者。牙車下。金匱要略。論諸脹滿有云。當見青白色。青白為寒。寒則凝滯。故脹也。跌陽脈微弦。法當腹滿。不滿者。必便難。兩胕疼痛。此虛寒從下上也。以溫藥服之。微弦之脈。陽不能運。腹自當滿。設不滿。亦當便難。兩胕痛。上愈矣。如枳實理中湯之類。而云。病者脹滿。按之不痛。為虛。痛者為實。可下之。舌黃未下者。下之黃自去。邪實於內。按以實。其實故痛。又云。腹滿時減。復如故。此為寒。當與溫藥。得煖必減。如理中。又云。病腹滿。發熱十日。脈浮而數。飲食如故。厚朴七物湯主之。又云。按之心下滿痛者。此為實也。當下之。滿固可下。要審其宜。大柴胡湯。又云。腹滿不減。減不足言。當須下之。宜大柴胡湯。已上諸脹諸滿。雖種種不同。然而無一不關於脾胃者。蓋脾胃者。土也。居中而溉四藏。胸腹乃其城府。胸腹脹滿。猶城府崩裂。未有城府崩裂。而土能獨全者。有諸中。形諸外。此必然之理也。脈若見弦。知木來侮土。更為不吉。若見數洪。必濕熱之鬱。若見遲弱。乃陰寒所凝。浮則氣散。外雖滿而中必虛。緊則氣斂。外固堅而中更實。浮而大者。元氣之振作。與病形相宜。故云可治。虛而小者。知元氣之

按之堅
氣鼓之
也推之
移病無
根也註
云氣病
血未病
妙妙

腫脹五
傷者死
腎黑傷
肝缺盆
平傷心

衰微。又與病形相反。故云危極。外有腸覃石瘕二種。女子之病也。寶鑑言之甚詳。以其類乎脹滿。故附錄於此。腸覃者。寒氣客於腸外。與衛氣相搏。氣不得榮。因有所繫。癖而內着。惡氣乃起。瘕肉乃生。其始生也。大如雞卵。稍以益大。至其成。如懷子之狀。久者離歲。按之則堅。推之則移。月事以時下。此其候也。夫腸者。大腸也。胃者。延也。大腸以傳導為事。乃今寒客於大腸。故衛氣不榮。有所繫止。而結瘕。所以惡氣貼着。其延久不已。是名腸覃。大氣散。則清氣聚。則濁。結為瘕。聚所以惡氣貼着。其延久不已。小漸益大。至期而下。本非妊娠。可以此為辨矣。此氣病。而血未病。故主月事。不斷。應時而下。非妊娠。可以此為辨矣。此氣病。而血未病。故主月事。瘕者。生於胞中。寒氣客於子門。子門閉塞。氣不得通。惡血當瀉。不瀉。以留止。日以益大。狀如懷子。月事不以時下。皆生於女子。可導而下。勝夫。不流。為津液之府。氣化則能出焉。今寒客於子門。則氣塞而後。不通。血壅而不來。則可宜導之。而下出者也。難經云。任之為病。其內少精。男子為七。經。女子為八。經。聚此之謂也。非大辛之劑。不能已也。可服。見曉丸。和血。通經。湯。諸脹滿病。腹脹。身熱。或腹大脹。四末清。脫形。泄甚。或腹脹便血。其脈大。時絕。或嘔欬。腹脹。且飧洩。其脈絕。或面黑。齒長而垢。腹脹閉。上下不通。或腹脹不得息。善噫。善嘔。嘔則逆。逆則面赤。不逆。則上下不通。不通。

則面黑。皮毛焦。或手足掌紋不見。或臍凸氣促等證。皆主必死。

附方

枳實理中湯見第七

金匱厚朴七物湯

厚朴半斤

甘草

大黃各三兩

大棗十枚

枳實五枚

桂枝三兩

生薑五兩

水一斗。煮四升。溫服八合。日三服。嘔者。加半夏五合。下利。去大黃。寒多者。加生薑至半斤。

仲景大柴胡湯

柴胡

半夏各半斤

黃芩三兩

芍藥三兩

生薑五兩

枳實四枚

大棗十二枚

右七味。以水一斗二升。煮六升。去滓再煎。溫服一升。日三服。一方用大黃二兩。

寶鑑晞露丸

治寒傷於內。氣凝不流。結於腸外。久為癥瘕。時作疼痛。腰

臍凸傷
脾足心
平傷腎
背平傷
肺皆不
治

瘕曰陰
凝堅結
積聚癥
瘕服此
如日晞

不可伸。

京三稜

蓬莪朮二味各一兩並酒浸巴豆不用

乾

漆洗去腥

川

烏炙各兩

礞

砂另研

輕

粉另研

茴

香鹽炒

青

皮去白

雄

黃另研

穿山甲炒各錢

麝

香五分另研

右爲細末。研勻。生薑汁煮麵糊和九。如梧子大。每服二十九丸至三十丸。空心生薑湯下。溫酒亦得。

寶鑑木香通氣散

治寒氣結瘕。腹大堅滿。痛不可忍。

木香

戎鹽炒

京三稜炮各兩

厚

朴薑製

枳

實炙炒

甘草炙各錢

乾

薑炮

蓬莪朮炮各錢

右爲末。每服三錢。食前淡生薑湯調下。

寶鑑見睨丸 治寒氣客於下焦。血氣閉塞而成瘕聚。堅大久不消者。

附

子炮去皮

鬼箭羽

紫石英錢各三

澤

瀉

肉桂

玄胡索

木

香各二錢

檳

榔二錢

瘕曰見
氣曰睨
瘕曰陰

之自消

醫燈續焰 卷十二 積聚脈證第七十二

八

血竭一錢半 水蛭一錢 炒錢 京三稜五錢

桃仁三十粒 湯浸去 皮尖炒 研去 大黃二錢 剉用酒同

右十三味。除血竭桃仁外。同為末。入另研二味和勻。用元浸藥酒打糊。丸如桐子大。每服三十丸。食前淡醋湯下。溫酒亦得。

寶鑑和血通經湯 治婦人室女受寒。月事不來。惡血積結。堅硬如石。

當歸 京三稜五錢 廣茂炮 木香

熟地黃 肉桂各三錢 紅花 貫衆

蘇木各二錢 血竭一錢

右十味。除血竭外。同為細末和勻。每服三錢。熱酒一盞調下。食前。忌生冷。及當風大小便。

積聚脈證第七十二

五藏為積。六府為聚。實強者生。沉細者死。

難經五十五難曰。積者。陰氣也。聚者。陽氣也。陰沉而伏。陽浮而動。又曰。

積聚雖分陰陽

要知都
由氣病
而成扁
鵠揭出
氣字令
人有下
手處
引證精
詳令人
無辯

總病在
着字故
經云勇
者氣行
則已關
閉則膜
而為脹

積者。五藏所生。聚者。六府所成。越人以陰陽分藏府。既分藏府。自有五
六之名。但歷考靈素積聚癥瘕之類。亦不全以藏府分也。如靈樞百病
始生篇云。積之初成。必先身形自虛。而後外邪中傷。始於皮膚腠理毛
髮。次絡脈。次經脈。次輸。次伏衝。次腸胃。次腸胃之外。募原之間。此言邪
氣自淺入深之常道也。然亦有不必要傳至極處。邪之所在。無論淺深。若
有積留。即積於彼。故本篇岐伯又曰。或着孫脈。或着絡脈。或着經脈。或
着於督筋。或着於腸胃之募原。上連於緩筋。邪氣淫洩。不可勝論。後復
詳言留着成積之病狀。曰。其着孫絡之脈。而成積者。其積往來上下。臂
手孫絡之居也。浮而緩。不能句積而止之。故往來移行腸胃之間。水湊
滲注灌。濯濯有音。有寒則膜脹滿雷引。故時切痛。其着于陽明之經。則
挾臍而居。飽食則益大。饑則益小。其着於緩筋也。似陽明之積。飽食則
痛。饑則安。其着於腸胃之募原也。痛而外連於緩筋。飽食則安。饑則痛。
其着於伏衝之脈者。揣之應手而動。發手則熱氣下於兩股。如湯沃之
狀。其着於督筋在腸後者。饑則積見。飽則積不見。按之不得。其着於輸

之脈者。閉塞不通。津液不下。孔竅乾壅。此邪氣之從外入內。從上下也。又云。積之始生。得寒乃生。厥乃成積也。又云。厥氣生足悞。悞生脛寒。脛寒則血脈凝滯。血脈凝滯則寒熱上入於腸胃。入於腸胃則腹脹。腹脹則腸外之汁沫迫聚不得散。日以成積。又云。卒然多食飲則腸滿。起居不節。用力過度則絡脈傷。陽絡傷則血外溢。血外溢則衄血。陰絡傷則血內溢。血內溢則後血。腸胃之絡傷則血溢於腸外。腸外有寒汁沫與血相搏。則并合凝聚不得散而積成矣。又云。卒然外中於寒。若內傷於憂怒。則氣上逆。氣上逆則六輸不通。溫氣不行。凝血蘊裏而不散。津液滯滲。着而不去。而積皆成矣。最後黃帝始曰。其生于陰者。奈何。岐伯曰。憂思傷心。重寒傷肺。忿怒傷肝。醉以入房。汗出當風。傷脾。用力過度。若入房汗出浴。則傷腎。此五藏之五傷也。雖不詳言成積之狀。謂之五藏所生可也。謂之即成肥氣。伏梁。痞氣。息賁。賁豚。五積之因亦可也。據本篇全文。及素問脈要精微論云。推而外之。內而不外。有心腹積也。又五藏生成論云。赤脈之至也。喘而堅。診曰有積氣在中。時害於食。名曰心

經云五藏為中
之守藏
氣既傷
運用難
周則易
留結為
積也

腹中堅
硬按之
應手曰
癥腹中
雖硬而
忽聚忽
散無有
常處曰
瘕在腹

痺。赤乃其色。色赤而脈喘。堅白。脈之至也。喘而浮。上虛下實。驚。有積氣。在胸中。喘而虛。名曰肺痺。青脈之至也。長而左右彈。有積氣在心下支。肱。名曰肝痺。得之寒濕。與疝同法。黃脈之至也。大而虛。有積氣在腹中。有厥氣。名曰厥疝。黑脈之至也。上堅而大。有積氣在小腹與陰。名曰腎痺。又平人氣象論云。寸口脈沉而橫。曰脇下有積。腹中有橫積痛。又云。盛喘數絕者。則病在中。結而橫。有積矣。又大奇論云。腎脈小急。心脈小急。不鼓。皆為瘕。又云。三陽急。為瘕。又靈樞邪氣藏府病形篇云。心脈微緩。為伏梁。在心下。肝脈微急。為肥氣。在脇下。若覆杯。腎脈微急。為沉厥。奔豚。又衛氣篇云。積痛可移者。易已也。積不痛。難已也。又難經十八難云。診在右脇。有積氣。得肺脈結脈。結甚則積甚。結微則積微。診不得肺脈。而右脇有積者。何也。然肺脈雖不見。右手脈當沉伏。又脈經云。脈遲而濇。中寒有癥結。又云。弦急。疝瘕。小腹痛。又為癖病。又云。弦小者。寒癖。由是觀之。則脈之小也。微也。小急也。弦急也。沉也。沉伏也。遲也。濇也。實也。數絕也。沉橫也。結伏也。長而左右彈也。是皆陰寒斂實之脈。則知積

內近臍左右隱痛如贅如指如弦之狀曰弦在胸側之助間有時而痛曰瘕皆積聚之症也
積聚分陰陽全在動靜浮伏上見此處最精
此處以元本盛衰分生死說得極妙

之成也。亦多屬陰寒。陰寒則不能溫散。而易於凝着。始則毫厘之留。日以增益。如堆積然。久久則小者大。軟者堅。虛者實。無形者有形。越人言其始發也。有常處。其痛不離其部。上下有所終始。左右有所窮處。又云。積者。陰氣也。又云。陰沉而伏。皆中的之語。聚則不然。越人謂聚者。陽氣也。六府所成。又云。陽浮而動。病發無根。痛無常處。夫無根無常。則氣不留止。偶與氣血相搏。則邪正相干。氣聚而痛。氣散則解。非若積之留止不移不散也。如腸腹攻衝。疝瘕瘕熱。胸腹脹滿。切痛雷鳴等證。皆聚之類也。古人論積聚。分藏府者。亦不過以沉伏留止不移者屬陰。陰則為藏。浮動聚散不常者屬陽。陽則為府耳。治之者。當於留止聚散上相機。不當於藏府二字上作工夫也。其脈實強者。陽脈也。一以徵邪正之相搏。一以徵元本之壯實。從府從陽。故曰生。其脈沉細者。陰脈也。一以徵邪氣之深入。一以徵元本之衰微。從藏從陰。故曰死。已上積聚二證。輯引靈素難經金匱諸書。其病因病狀。可謂詳且悉矣。但言證處不斬然。亦不全屬一證。故雖有成方。不能插入。今歷觀積聚之由。似宜溫行。不

溫行運
機四字
治積聚
要法溫
行自無
停着機
運氣自
前通夫
何積聚
之有

佑賢曰
攻利毒
藥過用
損真故
減半而
止

宜寒斂。似宜運動樞機。不宜專尙攻剋。是選名方十九首。以便擇用焉。

附方

濟生大七氣丸

治積聚癥瘕。隨氣上下。心腹疴痛。上氣窒塞。小腹脹滿。

大小便不利。

京三稜

蓬莪朮

青皮

陳皮各去

藿香葉

桔梗去蘆

肉桂不見

益智仁各半

甘草炙七錢半

香附炒去毛

右咬咀。每服五錢。水二盞。煎一盞。食前溫服。

東垣肥氣丸

治肝之積。在左脇下。如覆杯。有頭足。久不愈。令人咳逆瘕

瘕。連年不已。其脈弦而細。

柴胡二兩

黃連七錢

厚朴半兩

甘草炙三

椒閉口者四錢

廣茂炮

昆布

人參各二錢半

阜角去皮弦

白茯苓去皮共

烏炮去皮

乾薑

巴豆霜各五

右除茯苓、皂角、巴豆外。爲極細末。再另研茯苓、皂角爲細末。和勻。方旋入巴豆霜和勻。煉蜜丸如桐子大。初服二丸。一日加一丸。二日加二丸。漸加至大便微澹。再從兩丸加服起。周而復始。積減大半。勿服。東垣息賁丸。治肺之積。在右脇下。覆大如杯。久不已。令人洒淅寒熱。喘嗽發肺癰。其脈浮而毛。

厚朴八錢製

黃連三錢一兩

人參去蘆

乾薑炮

白茯苓另去末

川椒炒去

紫苑去毛各

桂枝去

桔梗

京三稜炮

天門冬去心

陳皮

川烏炮去

白豆蔻錢各一

青皮五分

巴豆霜四分

右除茯苓、巴豆霜旋入外。餘藥共爲細末。煉蜜丸如桐子大。每服二丸。一日加一丸。二日加二丸。加至大便微澹。再從二丸加服起。煎淡薑湯食遠送下。周而復始。積減大半。勿服。秋冬加厚朴五錢。通前一兩三錢。黃連減七錢。用六錢。

金匱鼈甲煎丸 治瘰母。

佑賢曰
仲景立
方藥品
最少惟
此與薯
蕷丸品
味甚多
一治久
瘧成積
一治虛
勞風氣
皆正虛
邪著久
不去者
非彙集
衆力攻
補兼施
自不易
愈

鼈甲炙三兩 烏扇燒 黃芩 鼠婦熬
 大黃 桂枝 石葦去毛 厚朴
 紫葳 阿膠各七錢半 乾薑 人參
 瞿麥 桃仁各五錢 柴胡 蜣螂熬各一錢
 芍藥 牡丹皮 蠱蟲炒各一兩二錢半
 蜂窠炙各一兩 葶藶炒 半夏各二錢半 赤消三兩
 右二十三味爲末。取煨竈下灰一斗。清酒一斛二升。浸灰。候酒盡一半。
 着鼈甲於中。煮令泛爛如膠漆。絞取汁。內諸藥煎爲丸。如桐子大。空心
 服七丸。日三服。千金方用鼈甲十二片。又以海藻三分。大戟一分。麝香五分。無鼠婦。赤消二味。以鼈甲煎和諸藥。和丸。
 東垣伏梁丸 治心之積。起臍上大如臂。上至心下。久不愈。令人煩心。其
 脈沉而芤。

黃連去鬚一兩半 人參去蘆 厚朴去粗皮薑製各半兩
 黃芩三錢 肉桂 茯苓去皮 丹參炒各一錢
 川烏炮去皮膚 乾薑炮 紅豆 菖蒲

巴豆霜各五

右除巴豆霜外。爲末。另研巴霜。旋入和勻。煉丸如桐子大。初服二丸。一日加一丸。二日加二丸。漸加至大便微澹。再從二丸加服。淡黃連湯下。食遠。周而復始。積減大半。勿服。秋冬加厚朴半兩。通前共一兩。減黃連半兩。只用一兩。黃芩全不用。

半夏湯 治肺積息賁咳嗽。

半夏湯炮去細辛葉苗

桑白皮炙

前胡去蘆各一兩半

桔梗炒

貝母去心

柴胡去苗

訶梨勒煨去核

炙甘草

人參去蘆

白朮各一兩

右㕮咀。每服三錢。水一盞。生薑三片。棗三枚。擘破。同煎至七分。去滓溫服。食後臨臥各一服。

東垣痞氣丸

治脾之積。在胃脘。腹大如盤。久不愈。令人四肢不收。發黃

疸。飲食不爲肌膚。其脈浮大而長。

厚朴製半兩

黃連去鬚八錢

吳茱萸炮三錢

黃芩

白朮錢各二

茵陳酒製

縮砂仁

乾薑炮錢各一

白茯苓另為末

人參

澤瀉錢各一

川烏炮去臍

川椒各五分

巴豆霜另研

桂各四分

右除茯苓、巴豆霜。另研為末。旋入。外餘藥同為細末。煉蜜丸。桐子大。初

服二丸。一日加一丸。二日加二丸。漸加至大便微溏。再從二丸加服。淡

甘草湯下。食遠。周而復始。積減大半。勿服。

東垣奔豚丸。治腎之積。發於小腹。上至心下。若豚狀。或上或下。無時。久

不已。令人喘逆。骨痿少氣。及治男子內結七疝。女子瘕聚帶下。其脈沉

而滑。

厚朴薑製七錢

黃連炒錢五

苦練子酒煮錢五

白茯苓另末

澤瀉

菖蒲錢各二

玄胡索半錢

附子去臍皮

全蠍

獨活錢各一

川烏頭炮

丁香各五分

巴豆霜四分

肉桂二分

右除巴豆霜、茯苓。另為末。旋入。外餘藥為細末。煉蜜丸。如梧子大。初服

二丸。一日加一丸。二日加二丸。漸加至大便微瀉。再從二丸加服。淡鹽湯下。食遠。積減大半。勿服。秋冬加厚朴二兩。通前一兩二錢。如積勢堅大。先服前藥不減。於一料中。加存性牡礪三錢。疝帶下勿加。如積滿腹。或半腹。先治其所起是何積。當先服本藏積藥。諸疾自愈。是治其本也。餘積皆然。如服藥人覺熱。加黃連。氣短加厚朴。悶亂加桂。三因奔豚湯。

甘李根皮焙

乾葛

川芎

當歸

白芍藥

黃芩

甘草炙各一半

夏次湯炮七錢

右作一服。水二鍾。薑五片。煎至一鍾。食前服。

萬病紫苑丸見第三十二

太無神功助化散。專治男子婦人腹中痞塊。不拘氣血食積所成。此方之妙。不可盡述。

地扁蓄

瞿麥穗

大麥蘖各五錢

神麴二錢

沉香

木香各半錢

甘草五錢

大黃二兩

右爲細末淨。依分兩和勻。男以燈心、淡竹葉二味等分煎。及無灰酒同調服。湯多於酒。婦人用紅花、燈心、當歸等分煎湯。及無灰酒同調服。酒多於湯。忌油膩動氣之物。及房事一月。藥須於黃昏服。大小便見惡物爲度。

寶鑑醋煮三稜丸 治一切積聚。不拘遠年近日。治之神效。

京三稜

四兩醋煮軟竹刀切片曬乾

川

芎二兩醋煮微軟切片

大

黃半兩醋浸濕紙裏煨過切

右爲末。醋糊丸如桐子大。每服三十丸。溫水下無時。病甚者。一月效。小者半月效。

寶鑑聖散子 治遠年積塊。及婦人乾血氣。

硃砂

大

黃錢各八

麥

蘗六兩炒乾取淨麵乾

漆炒烟盡二兩

扁蓄

茴香炒

檳

榔各一兩

婦人乾血氣。加穿山甲二兩炮。右爲細末。每服五錢。臨臥溫酒調下。仰臥。此藥只在心頭。至天明大便

如爛魚腸。小便赤爲瘡。藥並無毒。有神效。小兒用一錢。十五以上三錢。空心服之。更效。此按古方校定。今綱目刻本。確砂六兩。大黃八兩。豈不誤人。

三聖散 消積塊。進飲食。

橘 紅淨一斤 甘草四兩 鹽半兩

用水三四碗。從早煮至夜。以爛爲度。水乾則添水。晒乾爲末。淡薑湯調下。有塊者。加薑黃半兩。同前藥煮。氣滯加香附二兩。同前藥煮。氣虛者。加沉香半兩。另入。噤口痢。加蓮肉二兩。去心另入。

控涎丹 見第二十二

雲岐牡丹散 治婦人久虛羸瘦。血塊走注。心腹疼痛。

牡丹皮 桂心 當歸 玄胡索 各一兩

莪朮 牛膝 赤芍藥 各三兩 京三稜 半兩

右爲粗末。每服三錢。水酒各半鍾。煎服。

三因化氣丸 見第三十二

保和丸 見第七

沉香化氣丸

專攻赤白青黃等色痢疾。諸般腹痛。飲食傷積。酒積。痰積。

血積。跌撲損傷。五積六聚。胸膈氣逆痞塞。胃中積熱。中滿腹脹。瘧痞茶

癖。及中諸毒惡氣。傷寒大便不通。下後遺積未盡。感時疫氣。瘴氣。并諸

惡腫瘡瘍腫毒。及食諸般牛畜等物中毒。不問婦人小兒。並皆治之。

大

黃

黃

芩

參

白

朮

各

三

錢

沉

香

上

四

錢

另

為

末

者

右將前四味剉碎。用雷竹瀝七浸七曝。候乾。為極細末。和沉香末再研
勻。用竹瀝入薑汁少許為丸。如綠豆大。硃砂為衣。晒乾。不見火。每服一
錢。淡薑湯送下。小兒六分。

中惡脈證第七十三

中惡腹脹。緊細者生。脈若浮大。邪氣已深。

不善之謂惡。暗襲潛侵。忽然倒仆。昏不知人。或手足厥寒。或肌膚粟起。

或語言錯妄。或唇齒噤關。或肢體不仁。或面目青黑。即客忤卒厥。鬼擊

陽氣不
振則陰
邪易乘
非急用
蘇合開
氣轉機
便難一
時奏效
大勢已
定隨調
中氣此
妙法

飛尸之類。涉水登山。穿塚入廟。夜行露臥。弔死問喪者。多得之。然非正氣之大虛。邪亦不能一時中傷如此也。初宜灌以蘇合丸。候竅開氣轉。再以調氣平胃散與服。若服後吐下者。如六君子湯。香砂四君子湯。皆中的之藥。視與證相宜者。投之自無不效也。人之正氣。自內達表。自胸腹而達四肢者。其常也。卒中外邪。則正氣不能達外。而反退縮於中。退縮於中。則氣機斂實。而緊細之脈象見矣。腹安得不脹。藥力一助。正氣必張。邪氣必散。緊者仍舒。細者仍充。而本來之面目可還也。故知其生。若脈浮大。則正先散越。散越於外。則裏更虛。裏更虛。則邪必深入。而欲為之治。不亦難乎。

附方

蘇合香丸見第八

調氣平胃散

砂仁 <small>各一錢</small>	木香	烏藥	白豆蔻	檀香
藿香 <small>二錢</small>				
蒼朮 <small>半錢</small>				
厚朴 <small>薑汁炒</small>				

陳皮各一錢 甘草五分

水二鍾。薑三片。煎八分。食前服。

六君子湯見第十六

香砂四君子湯即四君子加砂仁

千金返魂湯見第三十五

玉樞丹即紫金錠見第六十三

華陀救中惡方 治一應忤惡鬼氣。

犀角末五錢 辰砂過水飛 麝香研各二分

每服二錢。井水調下。如一時不能得此藥。用雄黃末一錢。煎桃枝葉湯調灌之。又無雄黃。可用着身上多時。遭汗衣。或貼肉襯衣。男用女。女用男。燒存性。服二錢。百沸湯調下。

又方 韭菜搗汁滴鼻中。冬月用韭根。

又方 百會穴。人中穴。足大姆指離甲一韭葉許。各鬼眼穴。及丹田。氣海諸穴。灸七壯。愈多愈妙。一二處醒。即止。不必俱灸也。以炭火烹米醋薰

鼻亦妙。諸急證。宜先以牙皂末搐鼻取嚏。牙關緊者。以烏梅肉擦之。自開。皆通關之法。後可進藥。

砒毒 早禾稈燒灰。新汲水淋汁。絹濾過。冷服一碗。得下利即安。新汲水

調白扁豆末亦好。華佗用黑鉛磨濃水灌之。

附子天雄川烏斑蝥毒 煮大小黑豆汁飲。

河豚毒 倉卒無藥用清油多灌之。得吐愈。

巴豆毒 煮黃連汁飲。

諸藥毒 甘草黑豆淡竹葉等分。水一碗煎服。

刺毛蟲毒 疼痛不已。蚯蚓泥乾搽。又治胡蜂叮。

鬱肉漏脯毒鬱肉密器蓋隔宿者漏 燒犬屎酒服方寸匕。生韭汁亦好。

馬肉毒 香豉二兩杏仁三兩。蒸一飯時。杵之。酒煎服。蘆根煮汁飲亦良。

牛肉毒 甘草煮汁飲之即解。

犬肉毒 心下堅。腹脹口乾。發熱妄語。或洞下。杏仁一升。不去皮。熟研。以

沸湯三升和取汁。分三服。利下肉片良。

佑賢曰 斑蝥最厲 毒最厲 屢見少 年人服 便毒小 此則小 便急痛 欲死尿 血尿肉 苦不可 言曾以 大劑木 通滑石 綠豆通 艸解之 得免

*佑賢曰世間牛犬斷不宜食蓋以病死毒死者多無益而有大害也
*佑賢曰小兒食白果多則吐涎沫不知人當急用白煮頭煎湯灌之能解

中箭死鳥獸肉毒 大豆煮汁及鹽汁服之解。

諸魚毒 橘皮煎濃汁飲之解。蘆根煮汁亦良。

蟹毒 紫蘇煮汁飲之。蘇子亦好。

*諸果毒 猪骨燒過為末。水服方寸匕。解。

諸菌毒 悶亂欲死。人糞汁飲一升。飲土漿一二升亦良。大豆濃煮汁飲

之。或服吐利藥。俱可解。亦治楓樹菌毒。令人哭不止。哭一作笑

野芋毒 即前方。

閉口椒毒 戟入咽喉氣欲絕。或吐白沫。身冷。服肉桂煎汁飲之。或多飲

冷水。或食蒜或飲地漿俱良。

水荑蓉葉毒 人每誤認作菜食。令人狂亂吐血。甘草煮汁飲之。即解。

芹菜毒 手背腹滿痛。名蛟龍病。以芹上帶蛟蜃精耳。用硬糖二三升煮

服之。當吐如蜥蜴者。

貪食成病方 食多不消。心腹堅滿痛。用鹽一升。水三升。煮鹽消化。分三

服。當吐出食。

醫燈續焰 卷十二 中惡脈證第七十三

二六

諸食物毒

煮甘草薺芫汁飲之。通能解。

醫燈續焰

明 錢塘 王 紹 隆 著

明 錢塘 潘 楫 碩 甫 註

明 錢塘 王 佑 賢 聖 翼 評

鄞縣 曹 赤 電 炳 章 校

卷十三

癰疽脈證第七十四

癰疽
分曉處
再合末

癰疽浮數。惡寒發熱。若有瘡狀。初起宜審。不痛者陰。而痛者陽。不數不熱。不疼陰。疽屬臟。痛者陽。癰屬腑。已潰癰疽。洪太可怕。癰者壅也。疽者阻也。榮衛氣血不和。則脈絡停滯。膿之所致。有陰陽藏府之分。癰陽形大。疽陰形小。大則氣鼓發。鼓發則向表而淺。小則氣內鬱。內鬱則近裏而深。淺則從府從陽。故易消易潰。深則從藏從陰。故難

節黃帝問答知從來俗醫憤憤

先以衛氣失常提出再實串諸症分析淺深臨症自有頭腦

以下釋名甚悉每知作

消難潰。易潰者。則毒從外洩。難潰者。則毒常內陷。此吉凶輕重之所由分也。方書謂其源有五。一曰天行。昔氣。二曰七情內鬱。三曰體虛外感。四曰身熱搏于風冷。五曰食炙燔。飲法酒。服丹石等熱毒。雖分為五。然總不外三因也。三因者。一外因。如素問運氣等篇之太陽少陰。陽明太陰。少陽厥陰之客氣。以及所至所復。又感淫邪并熱淫所勝。歲火太過之發為痲。瘰癧瘡瘍。癰疽瘡腫。又據脈要精微論。帝曰。諸癰腫筋攣骨痛。此皆安生。岐伯曰。此寒氣之腫。入風之變也。又生氣通天論曰。勞汗當風。寒薄為皴。鬱乃瘰。瘰之久。則為瘡。又曰。陽氣者。開闔不得。寒氣從之。乃生大癰。榮氣不從。逆於肉理。乃生癰腫。氣失常則開闔亦不得如常矣。邪因乘隙而入。結於筋絡。故成癰腫。若入陷於脈。則營亦不順。逆於肉理之中。久則結聚為癰腫也。又素問氣穴論曰。邪溢氣壅。脈熱肉敗。榮衛不行。即將為膿。內消骨髓。外破大脰。留於節腠。必將為敗。所注必大為敗。壞豈僅消節。破髓而已。又靈樞刺節真邪篇曰。虛邪之中人也。搏於脈中。則為血閉。不通則為癰。亦榮氣又云。熱勝其寒。則爛肉腐肌為膿。內傷骨。內傷骨。為骨蝕。化熱為膿。勝久則良肉腐。

者苦心
從此參
入思過
半矣

諸氣積
鬱皆屬
於肺未

易入新則附骨及於蟲之蝕也。又曰。邪氣中之。凝結日以易甚。連以聚居。為昔瘤。贅於形體。其日久漸增聚。則日漸長大矣。不腐而大。又曰。骨與氣并。日以益大。則為骨疽。邪附於骨。又曰。有熱則化為膿。無熱則為肉疽。結於邪肉者。有熱久則肉腐。為膿。無熱久則一內因。如素問陰陽則論曰。三陽為病。發寒熱。下為癰腫。寒熱太陽走足。故下為癰腫。又素問氣厥論曰。腎移寒於脾。癰腫少氣。脾移寒於肝。癰腫筋攣。脾土是為逆。逆則氣壅。肌肉而為腫。以脾主肌肉。故脾以寒氣反移於肝。木又素問厥論曰。少陽厥逆。發腸癰。不可治。驚者死。此言少陽遊行之火。若厥逆結聚。入藏主死。以驚屬心。藏又靈樞脈度篇曰。六府不和。則留結為癰。陽陽則指厥陰。心包絡也。又玉版論。黃帝曰。病之生時。有喜怒不測。飲食不節。陰氣不足。陽氣有餘。營氣不行。乃發為癰疽。陰陽不通。兩熱相搏。乃化為膿。喜怒傷氣。飲食傷藏。不測者。暴發之謂。暴則氣壅。逆而陽有餘。聚而熱勝。陰不足。則榮不行。故化膿而成癰疽也。又陳無擇亦云。癰疽瘰癧。不熱相搏。營衛不行。故化膿而成癰疽也。問虛實寒熱。皆由氣鬱而成。蓋言喜怒憂思久鬱所致。治以遠志酒。獨

有氣鬱而榮衛流通者。斯蓋由情志而成。故治法宜用。遠志等劑。至於五志相勝。尤在攝生者。善自會心。瘡腫之發。寒熱大似傷寒。但傷寒病在氣機。則痛無定所。瘡腫在形。體故痛止一處。

醫燈續焰 卷十三 癰疽脈證第七十四

四

勝散。兼以五志相勝之理。乃善。勝惡之類。思不內外因。如素問生氣通天論曰。膏粱之變。足生大丁。受如持虛。必生也。又異法方宜論曰。東方之域。天地之所生也。魚鹽之地。海濱傍水。其民食魚而嗜鹹。皆安其處。美其食。魚者使人熱中。鹽者勝血。故其民皆黑色疎理。其病皆為癰瘍。其治宜砭石。顯於外。陽蓄於內。美食久久。使人熱中。癰瘍之病。乃其常耳。又有久服丹石法酒熱毒蓄中。發為癰疽疔腫。亦同膏粱之類。其脈浮數者。以血泣而氣復從之。邪與正鬱。鬱則化熱。故數也。在表在陽。故浮也。正為邪搏。則宣暢外衛之力薄。故復惡寒。據脈證似與傷寒表證無異。但傷寒雖有痛。或在頭。或在身體。或在骨節。未有痛止於一處者。今痛止一處而脈數。此處必化熱為膿。正癰疽所發之處也。即傷寒論辨脈法所謂諸脈浮數。當發熱而洒淅惡寒。若有痛處。飲食如常者。蓄積有膿是也。如此者。乃為陽毒。若脈不數。身不熱。所患之處不疼。是邪客陰分。不能鼓發。多致內陷。然必兼有煩懊嘔逆。胸膈不安等證。否則不熱不疼。脈又不數。是一不病人也。何得謂之陰瘡而反重於陽證耶。

切須認明施治
瘡瘍舊
列外科
以其症
形在外
敷貼刀
刺所加
故也雖
知症難
在外病
由內生
非深明
藏府經
絡及內
外三因
受病之
原似難
取效今
人剽竊
方書不
究義理
豈能轉
危為安

方癰疽之未潰也。無論成膿與否。熱邪鬱蓄。外不疏通。脈之鼓湧洪大。是其宜也。至於已潰。則熱泄邪解。而洪大之脈宜衰矣。潰而不衰。一派熱邪。正從何復。誠為大可懼者。與素問評熱病論。所謂病溫者。汗出輒復熱。而脈躁疾。不為汗衰。病名陰陽交者。同一義也。凡此癰疽瘍腫。自有專書。註固不能畢述。然靈樞癰疽一篇。窮源別流。包括殆盡。恐業外醫者。不能出其範圍也。故備錄於左。黃帝曰。余聞腸胃受穀。上焦出氣。以溫分肉。而養骨節。通腠理。衛氣中焦出氣如露。上注谿谷。而滲孫脈。津液和調。變化而赤為血。血和則孫絡先滿。溢乃注於絡脈。皆盈乃注於經脈。陰陽以張。因息乃行。榮氣行有經紀。周有道理。與天合同。不得休止。切而調之。從虛去實。寫則不足。疾則氣減。留則先後。從虛去虛。補則有餘。血氣已調。形氣乃持。余已知血氣之平與不平。未知癰疽之所從生。成敗之時。死生之期。有遠近。何以度之。可得聞乎。岐伯曰。經脈流行不止。與天同度。與地合紀。故天宿失度。日月薄蝕。地經失紀。水道流溢。草莖不成。五穀不殖。徑路不通。民不往來。巷聚邑居。則別離異處。血

此篇大法已備。專精者再參看。立齋諸書自入佳境。

命名固巧。註釋甚精。

氣猶然。請言其故。夫血脈營衛周流不休。上應星宿。下應經數。寒邪客於經絡之中。則血泣。血泣則不通。不通則衛氣歸之。不得復反。故癰腫。言衛氣因以留聚而不得復返於平常流行之故道也。寒氣化為熱。熱勝則腐肉。肉腐則為膿。膿不寫。則爛筋。筋爛則傷骨。骨傷則髓消。不當骨空。骨空者。骨中細孔。如髮眼者。所以通血液。之慘。不得泄瀉。血枯空虛。則筋骨肌肉不相榮。經脈敗漏。薰於五藏。藏傷故死矣。黃帝曰。願盡聞癰疽之形。與忌曰。名岐伯曰。癰發於嗌中。名曰猛疽。猛者。猛也。速之謂也。猛疽不治。化為膿。膿不寫。塞咽。半日死。其化為膿者。寫則合。豕膏。冷食三日已。發於頸。名曰天疽。肺外在其頸而內則入腋。熏其癰大以赤黑。不急治。則熱氣下入淵腋。前傷任脈。內薰肝肺。十餘日而死矣。陽氣大發。消腦留項。名曰腦爛。爛者。消也。如之。煩心者。腎毒傳心也。其色不樂。項痛而如刺。以針煩心者。死不可治。發於肩及臑。名曰疵癰。其狀色黑。急治之。令人汗出至足。不害五藏。癰發四五日。逞逞。健也。燒之。發於腋下。赤堅者。名曰米疽。言其小如粟米也。治之以砭石。欲細而長。疎砭之。塗以豕膏。六日已。勿裹之。其癰堅而不潰者。為馬刀挾纓。急治之。刺之。刀始

胸中衛氣所出之處名井疽得非所出之義

癰形似一之挾纓者發於結纓之處大迎之下頸側也。二癰一在腋一在頸常相連絡故俗名歷申。發於胸名曰井疽。其言也。其狀如豆大。三四日起。不蚤治。下入腹。不治。七日死矣。發於膺名曰甘疽。色青。其狀如穀實。莢莢常苦寒熱。急治之。去其寒熱。十歲死。死後出膿。甘屬土。此疽發於陽明胃經隱名也。即乳癰之類。內膿發於脇。名曰敗疵。之亦乳串。敗疵者。女子之病也。灸之。其病大癰膿。治之。其中乃有生肉。大如赤小豆。剉蔞藺草根。各一升。以水一斗六升。煮之竭。為取三升。則強飲厚衣。坐於釜上。令汗出至足已。發於股脛名曰股脛疽。其狀不甚變而癰膿搏骨。不急治。三十日死矣。發於尻名曰銳疽。而尾骨盡處。名其狀赤堅大。急治之。不治。三十日死矣。發於股陰名曰赤施。太陰厥陰二經所過之處。火毒傷陰之甚。則發此。曰赤施者。謂赤火之施發耳。不急治。六十日死。在兩股之內。不治。十日而當死。發於膝名曰疵癰。其狀大。癰色不變。寒熱如堅石。勿石。石之者死。須其柔。乃石之者生。諸癰疽之發於節而相應者。不可治也。發於陽者。百日死。發於陰者。三十日死。上節為神氣之所遊行。出入若發於脛。名曰兔齧。傷如兔之齧。其狀赤至骨。急治之。不治。害人也。發於內踝。

當照應

劉涓子
生宋武
帝時得

名曰走緩。毒害於足則走其狀癰也。色不變。數石其輪而止其寒熱。不
死。發於足上下。名曰四淫。毒淫其末諸陽之本其狀大癰。急治之。百日
死。發於足傍。名曰厲癰。厲惡其狀不大。初如小指。發急治之。去其黑者。
不消輒益。不治百日死。急挑去其黑者。發於足指。名脫癰。其狀赤黑。死
不治。不赤黑。不死。不衰。急斬之。否則死矣。不赤黑者雖不死亦欲其即
脫而死。指黃帝曰。夫子言癰疽。何以別之。岐伯曰。榮衛稽留於經脈之
中。則血泣而不行。不行則衛氣從之而不通。壅遏而不得行。故熱。大熱
不止。熱勝則肉腐。腐則為膿。然不能陷。骨髓不能焦枯。五藏不為傷。故
命曰癰。黃帝曰。何謂疽。岐伯曰。熱氣淳盛。下陷肌膚。筋髓枯。內連五藏。
血氣竭。當其癰下。筋骨良肉皆無餘。故命曰疽。疽者。上之皮天以堅。上
如牛領之皮。皮天白如牛脊。皮之堅厚也。癰者。其皮上薄以澤。此其候也。

癰疽雜述

鬼遺方云。癰之痛。只在皮膚之上。其發如火焚茅。初如黍米。三兩日如
掌大。五七日如碗大。即易治。如腫冷。外熱不發。渴。邪熱發逆。而嘔。裏治之

鬼遺方
千無一
失要其
切實乃
爾是萬
古治癰
疽之祖

虛處易
成漏近
筋骨處
易成癰
況死生
關係所
在幸毋
玩忽

難愈。又云。疽發如小癰。觸則徹心痛。四邊微起如橘皮孔。色紅赤。不
全變膿水不甚出。至七八日。疼悶喘急。若始腫高。五七日忽平陷。此內
攻之候也。又云。癰疽有三等。毒氣浮淺。屬府。毒氣沉深。屬藏。毒氣猛
烈而行經絡。或淺或深無定。五藏六府皆受五毒。難為調理。惟宜於癰
疽諸處。不問虛實。高腫起盛。光澤疼痛。只在皮膚之上。熱急脹滿。或有
癢疼。別無惡候。初用溫藥平氣。次用排膿發穴。治癰所謂平氣者。乃犀角連翹漏蘆甘草當歸肉桂皆發表之藥也。所謂發穴者。乃棘針之類。用
卑角末為君。甘草川芎乳香為佐。使亦托裏之藥也。然不若櫟占東垣諸方發表解裏為穩當。疽發諸處。不拘大小。惟起在背。廣一尺二尺三尺。皮厚紫
黑。高腫不常。內疼如錐刺。攻擊滿悶。應四肢重疼。前心亦痛。餘處發猶
可。惟虛處。及近筋骨處。若膿毒未潰。即傷爛筋骨肉。損為疽者。屬五藏
毒氣深沉。氣伏堅實。不宜緩治之。須內實五藏。外透皮膚。令輒勻和。即
膿透。宜用內托實藏氣之藥。排膿勻氣乃可。不比癰之毒氣淺也。毋一
類治之。

凡一切瘡腫。見有內攻之候。急以內托散。及內補湯藥。補填藏府令實。

如已見
七惡之
候而忽
然平陷
者死若
無惡陷
者非裏
氣虛寒
必調護
違法知
犯何逆
急治毋
遲

最怕透膜。膜穿十無一生矣。婁全善云。癰之邪淺。其稽留壅遏。獨在經脈之中。而專攻於外。故初發時。自表便發熱。患處便如碗如盆。高腫而痛甚者。縱欲下陷。緣正氣內固。不肯受。故或便秘。或發渴。發逆以拒之。是以骨髓終不焦枯。五藏終不傷也。疽之邪深。其稽留壅遏。內連五藏。而不專攻於外。故身體或無熱。患處或不腫。毒甚者。聲嘶氣脫。眼黑眼小。十指腫黑如墨。多死也。治之之法。癰之初發。當以潔古法為主。表者散之。裏者下之。火以灸之。藥以敷之。膿未成者。必消膿。已成者。速潰。又當以鬼遺方為主。補填藏府。令實。勿令下陷。之邪蔓延。外以火灸。引邪透出。使有穴歸着而不亂。則可轉死為生。今外科不分癰疽。一例宜熱拔毒。外以五香耗其氣。內以大黃竭其血。終不能自悟其藥之非。惜哉。集驗云。癰疽之名雖多。而其要則二。陰陽而已。發於陽者。為癰。為熱。為實。發於陰者。為疽。為冷。為虛。故陽發。則皮薄色赤。腫高。多有椒眼數十而痛。陰發。則皮厚色淡。腫硬。狀如牛頸之皮。而不痛。又有陽中之陰。似熱而非熱。雖腫而實虛。若赤而不燥。欲痛而無膿。既浮而復消。外

分陰分
陽又分
陰中之
陰陽中
之陽又
分變陰
變陽辨
症審脈
真非俗
醫所能
了了

由經絡
辨氣血
之多少
乃治病
之要術

盛而肉腐。陰中之陽。似冷而非冷。不腫而實。赤微而燥。有膿而痛。外雖不盛而內實煩悶。陽中之陰。其人多肥。肉緊而內虛。陰中之陽。其人多瘦。肉緩而內實。而又有陽變而為陰者。草醫涼劑之過也。陰變而為陽者。大方熱藥之驟也。然陽變陰者。其證多。猶可返於陽。故多生。陰變為陽者。其證少。不能復為陰矣。故多死。然間有生者。此醫偶合於法。百中得一耳。觀此。則癰與疽。但有陰湯深淺。內外虛實之分。而無大小之別。精要乃謂二寸至五寸為癰。五寸至一尺為疽者。謬矣。凡癰疽之脈。沉實發熱煩躁。外無焮赤痛。其邪深在裏。宜先疎通以絕其源。浮大數。焮腫在外。當先托裏。恐邪入內。不沉不浮。內外證無。知其。在經。當和榮衛。身無熱而脈數者。內有癰膿。數脈不時見。當生惡瘡。諸癰腫欲知有膿無膿。以手掩腫上熱者。為有膿。不熱者。為無膿。人身之有經絡。猶地理之有界分。治病不知經絡。猶捕賊不知界分。其能無誅伐無過之咎乎。况手足十二經絡。有血氣多少之分。如手少陽三焦。足少陰腎。太陰脾。多氣少血。手厥陰心包絡。手太陽小腸。足太陽膀胱。多血少氣。

五善七惡
正之盛
衰瘍科
毋忽

手陽明大腸。足陽明胃。多氣多血。此其大較也。多血少氣者。易愈。多氣少血者。難療。氣多之經。可行其氣。血多之經。可破其血。不可執一也。瘡瘍有五善七惡。動息自寧。飲食知味。一善也。便利調勻。二善也。膿清腫消。不臭。三善也。神采精明。語聲清爽。四善也。體氣和平。五善也。煩躁時嗽。腹痛渴甚。或泄利無度。小便如淋。一惡也。膿血大泄。腫焮尤甚。膿色臭敗。痛不可近。二惡也。喘粗短氣。恍惚嗜臥。三惡也。目視不正。黑睛緊小。白睛青赤。瞳子上看。四惡也。肩背不便。四肢沉重。五惡也。飲食不下。服藥而嘔。食不知味。六惡也。聲嘶色敗。鼻青赤。面目四肢浮腫。七惡也。五善見三則瘥。七惡見四則危。元戎云。瘡瘍自外而入者。不宜灸。自內而出者。宜灸。外入者。托之而不內。內出者。接之而令外。故經云。陷者灸之。灸而不痛。痛而後止其灸。灸而不痛者。先及其潰。所以不痛。而後及良肉。所以痛也。灸而痛。不痛而後止其灸。灸而痛者。先及其未潰。所以痛。而次及將潰。所以不痛也。凡人初覺發背。欲結未結。赤熱腫痛。先以濕紙覆其上。立視候之。其紙先乾處。即是結癰頭也。取大蒜切

薛伯宗
徒癰之
法不知
若何然
種種治
法宜審
症爲上
古云用
藥如用
兵欲知
用兵之
利者當
先知用
兵之害
學者所
當知之

淺深處
有大利
有大害
慎之慎
之

成片。如當三錢厚薄。安於頭上。用大艾炷灸之。三壯即換一蒜片。痛者。灸至不痛。不痛者。灸至痛時方住。最要早覺。早灸爲上。一日二日。十灸。十活。三日四日。六七活。五六日。三四活。過七日。則不可救矣。若有十數頭作一處生者。即用大蒜研成膏。作薄餅鋪頭上。聚艾於蒜餅上燒之。亦能活也。若背上初發赤腫一片。中間有一片黃粟米頭子。便用獨蒜切去兩頭。取中間半寸厚薄。正安於瘡上。着艾灸十四壯。多至四十九壯。又頭爲諸陽所聚。艾炷宜少而小。若少陽分野。尤不可灸。灸之多至不救。亦有因灸而死者。蓋虛甚孤陽將絕。其脈必浮數而大且鼓。精神必短而昏。無以抵當火氣。宜其危也。方書治癰疽。用針烙者。乃用圓針如筴。如緯鋌大。頭圓平。長六七寸。一樣二枚。蘸香油於炭火中燒紅。於瘡頭近下烙之。宜斜入向軟處。一烙不透。再烙必得膿也。總要用得其宜。若毒深針淺。膿不得出。毒淺烙深。損傷良肉。不當其所。他處作頭。此皆不能愈疾。反增痛苦。又有用砭鎌者。此血實者宜決之。砭鎌者。磁鋒之類。未熟而決。以洩其毒。不可太深。所謂刺皮無傷肉。不可輕

敷帖有期亦要留意
淋瀝之法使不逆於肉理也

服藥有方將護有法自然重者輕危矣不獨瘡疽凡屬切加身皆當加意

用。又有敷貼之法。初生之瘡。腫似有頭而未起。即當貼溫熱藥。引出熱毒。火就燥之義。若瘡腫初生。即高起。四畔焮赤。宜搗生寒藥貼之。折伏其熱勢。驅逐其邪惡。撲火之義。大抵敷貼之法。欲消散腫毒。疏通血脈。寒熱錯綜。皆期於不成膿也。又有用淋洗法。瘡腫初生。一二日不退。須用湯水淋射之。其在四肢者。濡漬之。其在腰腹及背者。淋射之。其在下部委曲者。淹漬之。無非疏導腠理。通調血脈。使無凝滯耳。

將護法

大凡瘡疽初生。皆如黍粒。其狀至微。人多忽視。因成大患。能防於未形。理於未成。朝覺夕治。則必無危困矣。否則膿血結聚。毒入深沉。束手待斃。悔之何及。夫以不貲之軀。緩慢自忽。更托命庸醫。任其措置。危殆可立而至。故醫不可不擇。然當知其飽讀經書。久諳疾候。洞明色脈。湯藥熟閑。更平素仁善孝義。臨事不惑者。方為良醫。而濟我事也。又要在病人自克。不可恚怒悲憂。叫呼忿恨。及驕性情。縱口腹。任勞役。惟宜恬澹耐煩。至如患人左右。尤宜止息煩雜。一切打觸器物。諸惡音聲。爭辯是

食物即
是藥品
一利一
害關係
非小指
出示人
爲利多
矣

非。咒罵鬪毆。產婦淫男。體氣不潔。腥羶穢濁。雞犬畜獸。並須遠離。設親友問疾者。可以預囑徐行。低聲款曲。禮畢躬退。勿令咨嗟驚訝。話舊談新。妄言虛實。亂舉藥方。久坐多言。重叠省問。勞煩病體。惑亂性情。爲害非淺小也。其侍患者。宜壽近中年。性情仁厚。調治藥物。無失其時。畜中勿食野獸自死有病之肉。水族勿食異狀雜魚。及父母自身本命生屬。蔬中勿食不時無名大熱大寒滑泄之菜。果中勿食不時酸澀難化。及蟲蛀之物。止宜黃白梁米。稀粥軟飯。瓜薺蘿蔔薑醬。及酥爛潔淨豬羊等肉。勿令過饑。勿令太飽。此時猶忌一應麵果炙博煎炒肥甘厚味。若肌膚將平。惡肉去盡。瘡口收斂。尙忌起立行步。揖待賓客。房室宴會。嗔怒沐浴。登陟遨遊。衝寒冒暑。直待瘡癰平復。精神如故。氣力完全。方無所忌。百日內。慎勿觸犯之。此篇不但將護瘡疽。卽一切虛損久疾。信能奉行。自然大有裨益。故錄出與世共寶之。

附方

遠志酒 治一切癰疽發背。癰毒惡候。有死血陰毒在中。則不痛。傅之卽

痛。有憂怒等氣內攻。則痛。傅之即不痛。或蘊熱在內。手不可近。傅之清涼。或氣血虛而不斂。傅之自斂。

遠志不以多少為末

酒一盞。調末三錢。澄清飲之。以滓傅於患處。

獨勝散 治癰疽。皆緣血滯氣凝而致者。

香附子去毛令淨以生薑汁淹一宿焙乾研極細

右無時。以白湯調二錢服。又云疽多因怒而得。但服香附。進食寬氣。自有神效。

人參敗毒散見第三十七

飛龍奪命丹 專治疔瘡發背。胸疽吹乳癰疽。一切無名腫毒。惡瘡無頭者。服之有頭。不痛者。服之知痛。已成形者。服之立愈。危急者。服之無失。

蟾酥乾者酒化 雄黃各二錢 膽礬 寒水石各一錢

乳香 沒藥 銅綠各二錢 輕粉

麝香各五分 海狗即蝸牛連殼 硃砂作一錢

佑賢曰
以上三
方為瘡
科神劑
當預備
救人

為末。先將海洋研為泥。和末丸綠豆大。丸不就。加好酒多杵。每服三丸。用葱白三寸。令病者嚼爛。吐於男左女右手心。將爛葱裹藥。無灰酒三四盞。溫熱送下。避風蓋煖臥。約人行五里許。飲熱酒助藥力。發熱大汗為度。重不過三服。

蟾酥丸 治疔黃一切惡瘡。

川烏

蓮花蕊

硃砂

砂各半

乳香

香

沒藥

各二錢

輕粉

蟾酥

各一錢

麝香

五分

為末。糊丸豌豆大。每服一丸。病重者二丸。依前奪命丹服法取汗。

真人活命飲 治一切癰疽腫毒。

穿山甲

三片切碎

天花粉

甘艸節

乳香

白芷

赤芍

貝母

各一錢

防風

沒藥

皂角刺

各五錢

陳皮

各半錢

金銀花

三錢

在背。阜刺為君。在腹。白芷為君。在胸。加薑仁二錢。在四肢。金銀花為君。

疔瘡。加紫河車草三錢。作一貼。老酒鍾半。煎一鍾。溫服。煎須用大瓦器。紙封口。勿泄氣。服看登上下。饑飽服之。能飲者。再飲數杯。忌酸物鐵器。宜服於未潰之先。

護心散 治發背癰疽。發腦。發髑。腦虛頭暈。風濕等證。

甘草錢一 綠豆粉錢二 硃砂研水飛過一錢

右爲細末。作一服。白湯調下。

防風通聖散見第六十一

神效托裏散 治癰疽發背。腸癰爛癰。無名腫毒。焮赤疼痛。憎寒發熱。不問老幼。並治之。

黃耆去蘆五兩 當歸一兩 粉草錢八 忍冬藤葉五兩

右爲細末。每服五錢。酒一盞半。煎至一盞。病在上。食後服。在下。食前服。少頃再進。留滓外傳。

正鐵箍散

貝母去心 白芷 蒼耳草灰醋拌晒乾各二兩

佑賢曰
芙蓉涼
血蒼耳
祛風散
熱敷患
處四圍
者不使
毒氣散
漫也露
頭者欲
使毒氣
外出也

或加龍骨三錢尤妙。

右為細末。水調。或香油調。貼瘡上。

鐵井欄 治無名腫毒。或背疽。

芙蓉葉重陽前收 耳端午前收

右同研細。以蜜水調。敷患處四圍露頭。

補中益氣湯見第三

玉樞丹見第六

十全大補湯見第六

當歸補血湯見第六

神仙太乙膏 治一切癰疽瘡毒。已潰未潰者。如發背。以溫水洗淨。軟絹

拭乾。用緋帛攤貼。更為丸。冷水送下。血氣不通。溫酒下。赤白帶。當歸酒

下。咳嗽及喉閉纏喉風。並用新綿裹置口中。嚙化。一切風赤眼。捏作小

餅。貼太陽穴。更以山梔子湯下。打撲傷損。外貼內服。橘皮湯下。腰膝痛。

貼患處。鹽湯下。唾血。桑皮湯下。以蛤粉為衣。其膏可收十餘年不壞。又

治療癰。用鹽湯洗貼。酒下一丸。楊梅瘡毒。潰爛者。尤效。婦人經脈不通。腹痛。甘草湯下。并攤貼之。疥瘡。用麻油煎滾。和膏塗之。虎犬蛇蠍傷。刀斧傷。皆可內服外貼。

玄參 白芷 當歸 赤芍

肉桂 大黃 生地各一兩

蘇油二斤。入銅鍋內。煎至黑。濾去滓。入黃丹十二兩。再煎。滴水掄軟硬得中。即成膏矣。腫毒跌撲疼痛。加乳香沒藥。製丹法。黃丹先炒紫色。傾缸內。用滾水一桶泡之。再汲涼水滿缸。用棒常攪。浸一宿。去水。再炒如前二次。方研令極細用。

替針丸

雄雀糞二十粒 硃砂 陳倉米 沒藥各一

右研勻。以米飯丸。如粟大。每用一粒。貼瘡口眼中。即潰膿出。

六君子湯見第六

圍藥

佑賢曰
雀糞硃砂能爛
好肉故
可代針

佑賢曰
方妙之
處其得
力又在
白芨

佑賢曰
此膏功
在行瘀
消滯

南星

草烏頭

黃藥

白芨
各二兩

五倍子
炒一兩

右爲細末。調如糊。隨血圍匝如牆壁。可移險處於不險處如神。

金絲萬應膏。治癰撲損傷。手足肩背并寒濕脚氣。疼痛不可忍。小兒脾疳。瀉痢咳嗽。不肯服藥者。

瀝青
二斤

威靈仙

黃蠟
各二兩

蓖麻子
去殼一百個

沒藥

乳香
各一兩
麻油
夏二兩 冬四兩

木鱉子
殼切十八片子

右先將瀝青同威靈仙下鍋熬化。以槐柳枝攪候焦黑色。重綿濾過。以瀝青入水盆候冷成塊。取出秤二斤淨。再下鍋鎔開。下麻油黃蠟蓖麻木鱉子泥。不住手槐柳枝攪勻。須慢火滴入水中不黏手。扯拔如金絲狀。方可如硬。再旋加油少許如軟。加瀝青試得如法。却下乳沒末。起鍋在炭火上。再用槐柳枝攪數百次。又以粗布濾膏在水盆內。扯拔如金絲。頻換水浸一日。却用小銚盛。如跌撲傷。於疼痛處火上炙熱貼。透骨

肉爲驗。連換熱水數浴之。則血瘀自消。小兒脾疳貼患處。瀉痢貼肚上。咳嗽貼背心。

八珍湯

見第六

疥瘡大楓膏 治一切乾濕疥瘡。并膿窠爛瘡。

大楓子

二兩去殼

枯

礬

四兩

蛇

脫

燒存性

樟

腦

蜂

窠

燒存性

水

銀

五錢

死之

柏油

燭

四兩

楓子諸藥爲末。入燭油。次入水銀。搗勻塗擦。

桃花隔紙膏

治久患膿瘡如神。驗過千百矣。

上好透明松香水。煮。隨換水。煮數十次。以色白味不澀苦爲度。研細。入

上上飛丹十分之四。再研勻。用豬板油。去膜切碎。同藥搗勻。攤油紙上。

作隔紙膏。上針刺多孔。先將苦茶洗患處淨。拭乾貼上。以絹帛緊包紮。

一日一換。雖二十年膿瘡。不消十紙。

千槌膏 治療瘰。

瀝 青 一兩

杏

仁

去皮半

蓖麻仁

四兩

針

佑賢曰
陳小粉
當於羅
磨店多
年缸口
上刮之

佑賢曰
凡石藥
用火煨
須停久
出火毒
研末須
極細如
塵庶不
滯着

同搗爛。初搗甚燥。如不能成膏者。搗千下。則漸柔粘矣。用布攤貼。未潰消。已潰出核。

烏龍膏 治一切癰疽發背。無名腫毒。初發焮熱未破者。

用陳年小粉。不拘多少。入鍋炒令成黃黑色。取出待冷。碾極細。以陳米醋調。稀稠得所。如過稀。微火熬之。其色如漆。用磁瓶收貯。遇有腫毒。量腫大小。用榜紙攤成膏藥。中剪一孔。露出毒頭。貼上疼痛即止。少頃覺癢。久則腫毒自消。甚效。

白麥飯石膏 治膿潰後圍瘡口。

白麥飯石

二兩有小於鵝卵石者。有大於鵝卵石者。其色有青黑。白紅。二點相間。惟鬆脆為佳。以炭火煨至紅。以好米醋淬之。如

此煨碎十數次。研為末。重羅去粗者。取細末。入乳鉢數人更。隨研為末。重羅去粗者。取細末。

白

欽為二兩研

鹿角灰。不用自脫者。須用帶腦頂骨。全者。却是生取之。截角作二三

右三味。最要研得極細。方有效。粗則反致甚痛。細則大能止痛。收口排

膿。精粗之。和合。量藥末多寡。用陳好米醋。入銀石器內。熬令魚眼沸。却

旋旋入藥末。用竹篾子不住手攪。熬一二時久。令稀稠得所。提出以磁

器盛之。候冷。以紙蓋覆。勿令着塵。用時。先以猪蹄湯洗去膿血。以軟絹搥乾。鵝翎蘸膏塗傅四圍。凡有赤處盡塗之。但留中心一口如錢大。未潰。能令內消。已潰。則排膿如湍水。逐日令口收斂。瘡久肌肉腐爛。筋骨出露。用舊布片塗藥貼瘡。但內膜不穿。亦能取安。洗瘡勿可手觸嫩肉。亦不可口氣吹着。合藥。亦忌腋氣之人。及月經有孕婦人見之。仍可熬好米醋一大碗。收磁器內。候逐日用藥。如瘡上久則藥乾。以鵝翎點醋拂拭藥上。勿令燥也。初則一日一洗一換藥。十日後。兩日一換。古方云。麥飯石。顏色黃白。類麥飯。曾作磨者尤佳。按麥飯石。不可作磨。狀如麥飯團。生粒點。如無此石。當以舊麵家磨近齒處石代之。取其有麥性故也。或溪中尋白石如豆如米大者。即是也。其石大小不等。或如拳如鵝卵。略如握聚一團麥飯。

精要神異膏 治諸般惡毒瘡癰發背癰疽。其妙如神。

露蜂房

要用蜂兒多者爲妙。細剪淨一兩。

全蛇蛻

鹽水洗乾。玄。

參

去蘆各半兩。

綿黃耆

七錢。

黃

丹

五兩。研。

仁

去皮尖。切。

男子亂髮洗淨焙乾如雞子大

真麻油一斤

右件藥。先將麻油入銀銚中。同亂髮於風爐上。慢慢文武火熬。候髮焦。熔盡。以杏仁投入。候杏仁色變黑。好綿濾去滓。再將所熬清油入銀銚內。然後入黃耆玄參二味。慢火熬一二時。取出銚子。安一冷風爐上。候半時久。火力稍息。旋入露蜂房蛇蛻二味。將柳枝急攪。移銚於火上。不住手攪。慢火熬至黃紫色。用綿濾過。後復入清油在銚內。乘冷投黃丹。急攪片時。又移銚於火上。文武火慢慢熬。不住手用柳枝攪千餘轉。候藥油變黑色。滴於水中凝結成珠子。則是膏成就矣。若珠子稀。再熬少時。必候得所。然後用磁器內封收待用。或恐偶然熬火太過。稍硬難用。却入少蠟熬。添麻油在內。磁器盛封。蓋於甑上蒸。乘熱攪勻。收而用之。膏藥熬成了。須用所盛磁器置淨水盆中。出火毒一晝夜。歇三日方可用。熬此膏藥。極難於火候。須耐煩看火緊慢。火猛。卽藥中火發。千萬謹戒。膏藥方甚多。效無過於此。

內托復煎散 焮腫於外。根盤不深。形證在外而其脈浮者。病在皮肉。非

氣盛。則必侵於內。急宜服之。托裏健胃。

地骨皮

黃芩

茯苓

芍藥

人參

黃耆

白朮

桂

甘草

防己

當歸各一兩

防風二兩

先以蒼朮一斤。水五升。煎三升。去朮。入前藥。再煎至三四盞。取清汁。分三四次。終日飲之。如未已。再煎半料飲之。如大便秘。煩熱。少服黃連湯。如微利。及煩熱已退。仍與此散。使榮衛俱行。邪氣不能內傷也。

神仙蠟礬丸

治癰疽及腸癰。托裏消毒。固藏府。止疼痛。

黃蠟二兩

明礬三兩

先將黃蠟溶開。離火待少溫。入礬末和勻。衆手急丸如桐子大。每服二十丸。食前酒下。每日二服。此藥不惟定痛生肌。且護膜止瀉。消毒化膿。內癰排膿。托裏之功甚大。金石藥毒發疽。非此莫治。更用白礬爲末。每日酒服一錢。尤效。有遍身生瘡。狀如蛇頭者。尤宜服之。每日百丸。若蛇蠍并一切毒蟲所傷。溶化熱塗患處。內更服之。毒卽解。服至三四兩

以上。愈見其功。此宜於癰毒潰後服之。腸癰尤效。

癰疽收口藥

白龍骨

白蘇

乳香

沒藥各半

爲末摻之。

比天膏此淮安王寡婦家祕傳

麻黃

川芎

白芷

薄荷

草烏

全蠍各二兩

防風

連翹

黃芩

黃連

大黃

知母

貝母

當歸

蒼朮

羌活

桔梗

柴胡

荊芥

五倍子

海螵蛸

白芨

穿山甲

木鱉子

大楓子

蛇蛻

梔子

血餘各三兩

椿皮

桑枝

槐枝

柳枝各二十許者

片腦一錢

麝香二錢

乳香

沒藥各五錢

龍骨

血竭各三錢

輕粉二兩

赤石脂三錢

右麻黃等粗藥。入麻油內浸一宿。文武火熬至藥枯黑色。去滓再熬。滴水成珠。每油二斤。入蜜陀僧一斤。收成膏。下片腦細藥柳枝不住手攪。入水中。出火毒收用。

治癰疽發背。無名腫毒。疔瘡癰癰。鼠瘡癰瘡。棒瘡刀傷。便毒魚口。風癬頑瘡。多日不滿。口常流膿水。婦人吹乳奶疽。瘡癰等項。先將花椒湯洗淨貼。肩背風吹。兩膊酸疼。貼肩井穴。左右肘疼。貼曲池穴。風寒濕氣。腰眼大腿酸麻。貼患處。兩曲膝冷痛。貼膝眼上。脚氣舉發。貼疼處。跌打損傷。貼患處。以上諸證。俱用食鹽炒熱。布包熨患處。令透毛孔。方貼之。

仙傳萬靈膏忌用鐵鍋煎

羌活

獨活

山梔

兩頭尖

官桂

玄參

大黃

五倍子

當歸

白芷

皂角

天花粉

赤芍

生地

熟地

山茨菰

防風

黃連

川芎

紅牙大戟

連翹

桔梗

白芨各六錢

木鱉子去殼二十粒

白藜

苦參各六錢

穿山甲十片

葶藶子去殼八十粒

杏仁四十粒

血餘四兩

槐枝

柳枝

桑枝各三十段

巴豆三十粒去殼

用麻油二斤四兩。春秋浸三日。夏浸二日。冬浸五日。熬枯黑色。去滓再熬。滴水成珠。每油二斤。下飛丹一斤。松香三兩。黃蠟二兩。桐油二兩。熬不老不嫩。稍冷。入乳香沒藥各六錢。血竭。阿魏。孩兒茶。百草霜。輕粉。馬莧膏。各三錢。桑枝攪勻攤貼。

治癰疽發背。瘰癧。用火烘手熱。摩百餘下。貼。已出膿者。不必摩。疥癬瘡。搔癢貼。風癩。用木鱉子。火煨研爛。置膿上貼。無名腫毒。貼患處。跌撲刀斧傷。貼患處。風痰壅塞。貼心上。熱手摩百下。痞塊。木鱉子研爛。置膏藥上貼之。以皮硝一兩。鴿糞五錢。蒜二個。搗勻。用麵作一團。

圍定在膏藥外。熨斗火運藥上。令氣透。蠱脹。加煨木鱉。貼心下臍上。熱手摩百次。癰瘻濕氣痛。加煨木鱉貼患處。手摩百下。月經不調。貼血海穴。手摩百下。

解輕粉毒

用佛前照過陳年琉璃。燒存性。為末。每服二錢。酒調下。日服一二次。一月全愈。

花莖石散

治一切打撲金刃傷損。身體出血者。急於傷處摻藥。其血化為黃水。如有內損。血入藏府。熱煎童便。入酒少許。調一錢服之。若牛舐腸出不損者。急送入。用桑白皮為線縫合。摻藥血止立活。如無桑白皮。用生麻縷亦可。不得封裏瘡口。恐作膿血。以竹夾兩邊皮起亦好。如瘡乾。以津液潤之。然後摻藥。婦人產後。敗血衝心。胎衣不下。並用童便調服。

硫

黃

明淨者四兩。搗粗末。

花莖石

一兩。搗粗末。

二味拌勻。先用紙筋和鹽泥。固濟罐子一個。候泥乾。入藥於內。再用泥

佑賢曰。跌撲金瘡。只用陳石灰。一味菜汁。曬乾。為末。敷之。止痛。散血。妙不可當。

封口。候乾。置四方磚上。書八卦五行字。用炭一秤。籠疊周匝。自巳午時後下火。令漸漸上徹。直至經宿。火冷炭消。又放經宿。罐冷。取出研貯磁瓶內收用。

醫燈續焰 卷十三 癰疽脈證第七十四

醫燈續焰

明 錢塘 王 紹 隆 著

明 錢塘 潘 楫 碩甫註

明 錢塘 王佑賢聖翼評

鄞縣 曹赤電炳章校

卷十四

肺癰脈證第七十五

肺癰已成。寸數而實。肺痿之形。數而無力。肺癰色白。脈宜短澀。不宜浮大。唾糊嘔血。

亡津液而虛為肺痿熱迫結聚為肺癰

金匱要略問曰。熱在上焦者。因欬為肺痿。肺痿之病。何從得之。師曰。或從汗出。或從嘔吐。或從消渴。小便利數。或從便難。又被快藥下利。重亡津液。故得之。曰。寸口脈數。其人欬。口中反有濁唾涎沫者何。師曰。為肺

二者治
自迥別

營衛之
行乃肺
所主風
熱迫聚
而成膿
則肺藏
敗而榮
衛無主
矣奚可
望生
通調水
道下輸
膀胱肺
之職也
熱則閉
癰寒則
遺尿要
知分曉

痿之病。若口中辟辟燥。欬即胸中隱隱痛。脈反滑數。此為肺癰。欬唾膿血。脈數虛者為肺痿。數實者為肺癰。又問曰。病欬逆。脈之何以知此。為肺癰。當有膿血。吐之則死。其脈何類。師曰。寸口脈微而數。微則為風。數則為熱。微則汗出。數則惡寒。風中於衛。呼氣不入。熱過於榮。吸而不出。風傷皮毛。熱傷血脈。風舍於衛。其人則欬。口乾喘滿。咽燥不渴。時唾濁沫。時時振寒。熱之所過。血為之凝滯。畜結癰膿。吐如米粥。始萌可救。膿成則死。又云。肺痿吐涎沫而不欬者。其人不渴。必遺尿。小便數。所以然者。以上虛不能制下故也。此為肺中冷。必眩多涎唾。甘草乾薑湯以溫之。若服湯已。渴者。屬消渴。又云。肺癰喘不得臥。葶藶大棗瀉肺湯主之。又云。欬而胸滿。振寒脈數。咽乾不渴。時出濁唾。腥臭。久久吐膿如米粥者。為肺癰。桔梗湯主之。又云。肺癰胸滿脹。一身面目浮腫。鼻塞涕出。不聞香臭。酸辛。欬逆上氣。喘鳴迫塞。葶藶大棗瀉肺湯主之。已上數條。金匱要略辯肺痿肺癰之所成不同也。其言熱在上焦者。痿癰皆有熱也。其言咳者。痿癰皆有咳也。其言亡津液者。痿癰皆亡津

鼻乃肺竅藏和
竅通自
然之理
因竅知
藏亦自
然之理
論其同
處則肺
癰肺痿
方無遁
情此絕
巧辯法
候脈審
症要如
捉賊見
賊必有
證據何
俗醫之
冒昧也
即此數
端已見
治病之
大凡矣

液也。其言脈數者。痿癰皆脈數也。但痿屬肺氣虛。虛則雖有熱而不烈。熱不烈。則雖亡津液。不至燥涸。故雖欬而口中反有濁唾涎沫。熱雖客肺。亦不至腐。良為膿。唯肺藏痿萃而已。其脈雖數而必虛。癰則不然。乃肺藏氣壅邪實。實則熱烈。熱烈則津液亡而更加乾涸。故口中辟辟燥。烈熱迫肺。肺將腐傷。故氣逆而欬。欬即胸中隱痛也。津液既涸。脈應澹滯。而反滑數者。蓄熱腐化。挾有膿血之象。即謂之數實亦可。次條云寸口脈微而數者。以衛疎故微。邪鬱故數。衛疎邪鬱。故汗出表熱而且惡寒也。此言風之初襲。邪猶在表。不入於裏。唯隨呼出。中於衛而外傷皮毛。鬱而為熱。其熱則不出於外。唯隨吸入。過於榮而內傷血脈。夫衛者主表。主皮毛。陽也。風客之。則內關於肺。肺氣壅逆。故欬而喘滿。衛主氣。肺亦主氣。口咽為氣之門戶。氣不通調。則津液不周布。故口乾咽燥。或有時反唾濁沫。以熱不在胃。故不渴。衛疎邪客。時為振寒。此皆風中於衛。激動肺氣之證驗也。榮主裏。主血脈。陰也。熱迫之。則內及於脈。肺朝百脈而行榮衛。况邪自皮毛始。皮毛者。肺之合。由合入肺。肺受其熱。血

肺癰亦
是急症
膿成則
藏體已
傷豈得
不死

肺受命
於脾補
母者所
以治其
源也

爲之凝結。久則腐敗爲膿。隨吐而出如米粥。此皆熱過於榮。敗傷肺體之證驗也。始萌則在陽。在衛屬氣分。故云可救。久則入陰。傷血脈。傷藏體。故云膿成則死。三條所云肺痿者。虛寒之痿。痿之變也。肺虛而寒。則液不流布。故亦吐涎沫。無熱迫肺。則肺氣不逆。故不咳。無熱。故不渴。肺居最上。爲諸氣之總司。而通調水道。下輸膀胱。遺尿小便數者。肺氣虛冷。有失通調之職。所謂不能制下也。氣虛於上。故眩。治以甘草薑湯者。薑以溫冷。草以補虛。草補土而不補金者。虛則補其母耳。服此溫劑而渴者。肺中必熱。是知遺尿便數。非痿證。乃消渴也。卽氣厥論所謂飲一溲二。肺消之屬。下四條所載已成癰。未成癰。皆肺氣壅塞之有餘者。前二條論中頗悉其義。而阜角、葶藶、桔梗輩亦皆下氣瀉壅開結之藥。以方合證。理可想見。故不重解也。本文云肺癰已成。寸數而實者。卽要略所謂脈數實者。爲肺癰。肺痿之形。數而無力者。卽要略所謂脈數虛者。爲肺痿。必候於寸者。以肺居最上也。肺癰色白。脈宜短濇者。言其面色白。爲肺色。短濇。爲肺脈。色脈與證相符。故宜也。若脈浮大。是爲火象。

唾如米糊。嘔見膿血。是火尅金。肺藏已傷。宜乎。

附方

金匱甘草乾薑湯

甘草炙四兩 乾薑炮二兩

右咬咀。以水三升。煮取一升五合。去滓。分溫再服。

金匱葶藶大棗瀉肺湯 治肺癰喘欬。不得臥。或鼻塞清涕。不聞香臭。酸

辛。上氣迫塞。服此湯。可先服小青龍湯一劑。乃進此。小青龍湯方見第十卷

葶藶丸。熟令黃。色大。 大棗十二枚

右先以水三升。煮棗取二升。去棗。內葶藶。煮取一升。頓服。

桔梗湯 亦治血痺。今人用此為咽喉諸證要藥。見第三十二卷

炙甘草湯見第三十二卷

千金甘草湯 治同桔梗湯。

甘草

右一味。以水三升。煮減半。分溫三服。

千金生薑甘草湯 治肺痿欬唾涎沫不止。咽燥而渴。

生薑五兩 人參三兩 甘草四兩 大棗十五枚

右四味。以水七升。煮三升。分溫再服。

千金桂枝去芍藥加皂莢湯 治肺痿吐涎沫。

桂枝 生薑各三兩 甘草二兩 大棗十枚

皂莢一枚炙焦去皮

右五味。以水七升。微微火煮取三升。分溫三服。

外臺桔梗白散 治欬而胸滿。振寒脈數。咽乾不渴。時出濁唾腥臭。久久

吐膿如米粥者。為肺癰。

桔梗去蘆 貝母三分 各巴豆一分去

右三味為散。強人飲服半錢匕。羸者減之。病在膈上者。吐膿血。膈下者。

瀉出。若下多不止。飲冷水一杯則定。

千金葦莖湯 治欬有微熱。煩滿。胸中甲錯。是為肺癰。

葦莖二升 薏苡仁半升 桃仁五十粒 瓜瓣半升

佑賢曰
瓜瓣須
用苦絲
瓜瓣

佑賢曰
治肺癰
多用桔
梗者以
此藥開
通肺氣
故也

右四味。以水一斗。先煮葦莖得五升。去滓。內諸藥。煮取二升。服一升。再服。當吐如膿。

白散 治肺癰。

桑白皮 錢二

地骨皮 去骨

甘草 炙

貝母 去心

紫苑

桔梗 炒

當歸

酒拌各一錢

瓜蒌仁 半

作一劑。水一鍾。薑三片。煎八分。食遠服。

立齋云。此方乃瀉肺邪消毒之劑也。若喘咳唾痰沫。肺脈浮數者。用之有效。

四物湯 治肺癰吐膿。五心煩熱。壅悶欬嗽。

貝母 去心

紫苑 去苗

桔梗 炒各一兩

甘草 炙半

右搗篩。每服三錢。水一盞。煎五七沸。去滓。不拘時。稍冷服。如咳嗽甚。加去皮尖杏仁三枚同煎。小兒量減。

肺癰神方

用薏苡米為末。糯米飲調下。或入粥內煮喫亦可。一方用水煎服。當下

膿血便愈。

濟生排膿散

治肺癰。得吐膿後。以此排膿補肺。

生綿黃耆二兩。細末。每二錢。水一碗。煎五分服。

排膿散

黃耆鹽水拌炒

白芷

五味子炒并

人

參各等分

為細末。每服三錢。食後蜜湯調下。

肺癰收口方

肺癰收斂瘡口。止有合歡樹皮。或白斂煎湯飲之。然不可飲於未吐膿血之先也。

又肺癰方

野毛栗根二兩。水二鍾。煎五分服。覺肺中微有聲。數次即愈。

治吐膿血方

吐膿血如肺癰。口臭。他方不應。宜消風散。入男子髮灰。清米湯下兩服。

又治肺癰方

佑賢曰。治肺癰。大法先開通。解散。次清涼。後補養。二方乃後局。藥也。佑賢曰。用藥有先後。不可不知。有用白芨一味。治此亦妙。

鮮百合搗汁。酒和服。六次愈。

試肺癰法

凡人覺胸中隱隱痛。咳嗽有臭痰。吐在水內。沉者是癰膿。浮者是痰。

腸癰脈證第七十六

腸癰實熱。滑數可知。數而不熱。關脈芤虛。微瀋而緊。未膿當下。緊數膿成。切不可下。

結熱於
腸始生
癰毒小
腹處或
腫痞或
甲錯皆
其驗也

敗醬即
苦菜小
腸癰上
藥也

腸癰者。腸內生癰也。大腸小腸皆有之。大抵得之不節飲食。不適寒溫。或積垢瘀凝。或敗血留滯。壅塞不行。久鬱化熱。久熱腐膿。而癰斯成矣。如小腹腫痞皮急。按之則痛。小便數如淋。或復自調。時或發熱。或自汗惡寒。身如甲錯。外無熱。內無積聚。而見上證者。皆腸癰之候也。甚者腹脹大。轉側有水聲。或繞臍生瘡。或膿自臍出。或大便出。其脈數者。小有膿也。洪數滑數者。大有膿也。宜薏苡附遲散。或微瀋而緊者。未有膿也。宜大黃牡丹湯。萬氏桃仁承氣湯。加連翹。蘇結成熱。其熱自實。熱實則

當下不
當下此
死生之
機

佑賢曰
腸癰之
脈當滑
數若數
而不滑
知虛而
有熱也
去邪熱
用薏苡
敗醬散

脈之滑數。不言可知。若數而無熱。則數為虛促之數。非熱所鼓。不唯不實。而與腹中相應之關脈。亦且訖虛矣。雖見諸證。未必成膿。設的確有癰。亦瘀凝之血耳。蓋血瘀聚於腸腹。則流行之脈道中。反覺空虛。故脈芤也。若脈微澁而緊者。氣猶滯着。斂實未化膿也。下之足以蕩其留結之邪。若脈緊滑數。熱已沸湧消熔。膿已成也。下之反以奪其生新之力。即癰瘍未潰。宜瀉實。已潰。宜補虛義。

附方

薏苡附子敗醬散。治腸癰為病。其身甲錯。腹皮急。按之濡。如腫狀。腹無積聚。身無熱。脈數。此腸內有癰膿也。此方主之。

薏苡仁十分 附子二分 敗醬五分

右三味。杵為末。取方寸匕。以水二升煎減半。頓服。小便當下。

大黃牡丹湯。治腸癰少腹腫痞。按之痛如淋。小便自調。時時發熱。自汗出。復惡寒。其脈遲緊者。膿未成。可下之。當有血脈洪數者。膿已成。不可過下。總以此方主之。

虛寒用
附子有
附子之
力則寒
藥又易
行真妙
方也
佑賢曰
熱壅於
腸自當
攻下此
正法

大黃四兩 牡丹皮一兩 桃仁五十 瓜子半升

芒硝三合

右五味。以水六升。煮取一升。去滓。內芒硝再煎沸。頓服之。有膿當下。如無膿。當下血。

萬氏治腸癰方

桃仁承氣湯。加秦艽、連翹。桃仁承氣湯見第二十一

薏苡仁湯。治腸癰。腹中疔痛。煩毒不安。或脹滿不食。小便澀。婦人產後虛熱。多有此病。縱非癰。但疑似間。便可服。

薏苡仁

瓜蒌仁各三

牡丹皮去骨

桃仁各二

右作一服。水二鍾。煎一鍾。不拘時服。

按此方。藥品和平。其功且速。常治腹痛。或發熱。或脹滿不食。水道澀滯。產後多有此證。或月經欲行。或行後作痛。尤效。
四聖散。一名神效瓜蒌散。治腸癰。癰疽生於腦髑背腋。及便毒。服之神效。

生黃瓜萐一枚粉草四錢沒藥三錢乳香研末
右用好紅酒二大碗。慢火煎至一碗。分作兩服。兩日服盡。大便順導惡
物妙。若乾瓜萐。則用兩三枚。一方。若病在上。食後服。在下。食前服。毒已
結成。即膿化為水。毒未成。即於小便中出。疾甚。再合服。以退為度。

神仙蠟礬丸見第十四

雲母膏 治一切癰疽瘡癤。折傷等證。

蜀椒去目及閉口者微炒

赤芍藥

肉桂

白芷

沒藥

菖蒲

麒麟竭

黃耆

白芍

芎藭

木香

龍膽草

白欬

防風

厚朴

麝香

桔梗

柴胡

松脂

人參

蒼朮

黃芩

乳香

附子

茯苓

良薑

合歡皮各五錢

硝石

甘草

佑賢曰 癰疽折 傷皆屬 氣血混 一榮衛 不分雲 母生雲 使氣歸 天氣升 則血行 榮衛自 分矣諸 藥皆為 臣佐鹽

花之用 能化雲 母耳 佑賢曰 諸香細 料須將 成離火 投之否 則香散 功滅

雲母各四兩

桑白皮

槐枝

柳枝

柏葉

水銀以絹另包待膏成以手彈在上名養膏母

陳皮各二兩

清油四十兩

黃丹二十兩

右除雲母、硝石、麒麟竭、乳香、沒藥、麝香、鹽花、黃丹八味，另研外。餘藥並細切，入油浸七日。文火煎，以柳枝不住手攪，候匝沸，乃下火。沸定，又上火。如此者三次，以藥黑色為度。去滓，再熬。後入丹與八味末，仍不住手，以槐柳枝攪，滴水中成珠，不軟不硬為度。磁器收貯。候溫，將水銀彈上用時，先刮去水銀，或服或貼，隨宜用之。其功甚大也。

排膿散

治腸癰、小腹脹痛、脈滑數，或裏急後重，或時時下血。

黃耆鹽水拌炒

當歸酒拌

金銀花

白芷

穿山甲蛤粉炒

防風

連翹

瓜蒌杵

甘草各一錢

作一劑。水二鍾，煎八分。食前服。若膿將盡，去穿山甲、連翹，加當歸、川芎。或為末，每服三錢，食後蜜湯調下，亦可。

醫燈續焰 卷十四 腸癰脈證第七十六

醫燈續焰

明	明	明
錢塘	錢塘	錢塘
王	潘	王
紹隆	楫碩甫	紹隆
著	註	著
錢塘	王佑賢	錢塘
鄞縣	曹赤電	鄞縣
炳章	炳章	炳章
校	校	校

卷十五

胎產脈證第七十七

婦人之脈。以血爲本。血旺易胎。氣旺難孕。少陰動甚。謂之有子。尺脈滑利。妊娠可喜。滑疾不散。胎必三月。但疾不散。五月可別。左疾爲男。右疾爲女。女腹如箕。男腹如釜。欲產之脈。其至離經。水下乃產。未下勿驚。新產之脈。緩滑爲吉。實大弦牢。有證則逆。

男爲陽。女爲陰。陽主氣。陰主血。一定之常理也。故女人以血爲本。血旺。

生陽自
無不勁
亦陰陽
相搏之
義

是爲本足。本足而施之以陽。則生化自全。而成胎亦易易矣。氣旺。則血反衰。是爲本不足。且失常理。未有理失常而能孕者也。又人之身。陰靜陽動。陰體陽用。則血固陰靜也。亦體也。凝胎結孕。必動由靜始。體成用先。是知女人以血勝氣者爲貴。少陰動甚者。心手少陰之脈動甚也。心主血。動甚則血旺。血旺易胎。故云有子。卽素問平人氣象論所謂婦人手少陰脈動甚者。妊子也。有子者。有妊之謂。男女之通稱。非獨指男子。如下文所辨。則有男女之分矣。尺脈者。左右腎脈也。腎爲天一之水。主子宮以繫胞。孕胎之根蒂也。滑利。則不枯澹。而且有替替含物之象。故喜其妊娠。卽素問陰陽別論所謂陰搏陽別。謂之有子。叔和脈經所謂尺中之脈。按之不絕。法妊娠。上文所謂動甚妊子者。同義也。卽此滑利之脈。應指疾而不散。滑爲血液。疾而不散。乃血液斂結之象。是爲有胎三月矣。若但疾而不散。是從虛漸實。從柔漸剛。血液堅凝。轉爲形體。故不滑耳。此妊娠五月之脈狀也。其疾左勝於右。是爲男孕。以男屬陽居左。胎氣鍾於陽。故左勝。右勝於左。是爲女孕。以女屬陰居右。胎氣鍾於

總不外陰陽爲釜爲箕已見成

陰。故右勝。勝者。甚不甚之謂。非左疾右不疾也。更視其腹。如箕者爲女胎。如釜者爲男胎。蓋男女之孕於胞中。女則面母腹。男則面母背。雖各肖父母之形。亦陰陽相抱之理。女面腹。則足膝抵腹。下大上小。故如箕。其播箕也。前後異。男面背。則背脊抵腹。其形正圓。故如釜。釜食鍋也。深覆之。則高下異。一說女動於腹。動不一處而動甚。男動於腹。舉腹動而動微。動不一者。四肢也。舉腹動者。背也。歷觀數說。則男女在胞之仰覆。信不誣矣。及其欲產也。其脈與十月懷妊平嘗見者。忽異。假如平日之脈原浮。臨產則脈忽沉。平日之脈遲。臨產則脈忽數。至如大小滑濇。臨產皆忽然而異。蓋十月胎氣安定。一旦欲落。氣血動蕩。胞胎迸裂。自與經常離異。而脈亦非平昔之狀貌矣。雖然。亦必有水先下。俗謂之胞漿。養胎之液也。水下。則胞裂而產。不爾。猶未卽下。勿認爲產難而驚訝也。及其已產也。氣血兩虛。其脈宜緩滑。緩則舒徐。不因氣奪而急促。滑則流利。不因血去而濇枯。均吉兆也。若脈實大弦牢。非產後氣血俱虛者所宜。實爲邪實。大爲邪進。弦爲陰斂。而宣布不能。牢爲堅着。而瘀凝不解。是皆相逆之

脈。設外有證。又豈能順乎。

胎產雜述

胎屬十二經所養

古人有胎教觀此知養胎之法關於經絡極爲鄭重

虞氏曰。脈經云。診其脈。手少陰之脈動甚者。姪子也。蓋手少陰。心脈也。心主血脈故也。又腎爲胞門子戶。尺中腎脈按之不絕。當姪子也。又婦人妊娠一月之時。足厥陰脈養之。二月足少陽脈養之。三月手厥陰脈養之。四月手少陽脈養之。五月足太陰脈養之。六月足陽明脈養之。七月手太陰脈養之。八月手陽明脈養之。九月足少陰脈養之。十月足太陽脈養之。是以諸經脈各養三十日也。若夫至期當養之經。虛實不調。則胎孕爲之不安。甚則下血而墮矣。夫手足十二經。氣血盈虧不同。如手足厥陰。太陽少氣多血。手足太陰。少陰少血多氣。手足少陽。氣多血少。手足陽明。氣盛血多。安胎之法。宜各按月依經。視其氣血虛實而調之。庶無胎墮之患。其或感冒風寒。別生異證。又宜各按法而調治之。

治難產三禁

調理諸
法母之
死生子
之壽夭
係焉胡
可草草

潔古云。治胎產之病。從厥陰經論之。是主氣生化之源也。厥陰與少陽。爲表裏。故治法無犯胃氣。及上二焦。有三禁。不可汗。不可下。不可利。小便。發汗則傷上焦之陽。利大便則脈數而動脾。利小便則內亡津液。胃中枯燥。製藥之法。能不犯此三禁。則榮衛自和而寒熱止矣。如氣弱則黃耆。血刺痛而和以當歸。腹中疼而加之芍藥。大抵產病天行。從小柴胡增損。雜證從四物增損。宜詳察脈證而用之。

胎前調理法

集略云。母之腎藏係於胎。是母之真氣。子之所賴也。受妊之後。宜令鎮靜。則血氣安和。須內遠七情。外薄五味。大冷大熱之物。皆在所禁。使露風邪。不得投間而入。亦不得交合陰陽。觸動慾火。謹節飲食。若食兔缺脣。食犬無聲。食雜魚而致瘡癬。心氣大驚而癲疾。腎氣不足而解顛。脾氣不和而羸瘦。心氣虛乏而神不足。兒從母氣。不可不慎也。苟無胎動。胎痛瀉痢。及風寒外邪。不可輕易服藥。不得已。在審度疾勢輕重。藥性高下。不必多品。然父少母老。產女必羸。母壯父衰。生男必弱。氣受偏

此治胎產大法
圖機之
士自不
膠柱鼓
瑟

萃。與之補之。補羸女。則養血壯脾。補弱男。則壯脾節色。羸女宜及時而嫁。弱男宜待壯而婚。昔人論年老有子者。男不過八八。女不過七七。則知血氣在人。固自有量。夫豈逃陰陽之至數哉。丹溪曰。胎前當清熱養血。產婦因火逼動胎。逆上作喘急者。急用條芩、香附之類。為末調下。條芩水中取沉者為佳。黃芩安胎。乃上中二焦藥。能降火下行。天行不息。所以生生而無窮。芫薺子治血行氣。有補陰之妙。命名益母。以其行中有補也。故曰胎前無滯。產後無虛。難產可煎作膏。條芩、白朮。乃安胎聖藥。俗以黃芩為寒而不用。反謂溫熱藥能養胎。殊不知胎孕宜清熱養血。使血循經而不妄行。乃能養胎。懷妊嗜物。乃一藏之虛。如愛酸。乃肝藏不能養胎而虛也。

孕婦食忌

雞肉合糯米食。令子生寸白蟲。食犬肉。令子無聲。鯉魚同雞子食。令子生疳多瘡。食兔肉。令子缺脣。食羊肝。令子多厄。食鯊肉。令子項短縮頭。雞子與桑椹同食。令子倒生心寒。鮮魚同田雞食。令

子瘖啞。雀肉同豆醬食。令子面生黥黯黑子。食螃蟹。令子橫生。
食生薑。令子多指。食水漿。令絕產。食雀肉飲酒。令子多淫無恥。
食苳菰。消胎氣。食驢馬肉。過月難產。豆醬合藿香食。墮胎。食山
羊肉。令子多病。食鰕鱧無鱗魚。難產。食諸般菌。生子驚風而夭。
食雀腦。令子患雀目。

孕婦藥忌

歌曰。玃班水蛭及蟲蟲。烏頭附子配天雄。野葛水銀并巴豆。牛膝薏苡
與蜈蚣。三稜代赭荒花麝。大戟蛇脫黃雌雄。牙硝芒硝丹皮桂。槐花牽
牛阜角同。半夏南星與通草。瞿麥乾薑桃仁通。硃砂乾漆蟹腳爪。地膽
茅根莫用好。

孕婦起居忌

便產須知云。勿亂服藥。過飲酒。勿針灸舉重。登高涉險。心有大驚。犯之
產難。子必顛癇。勿多臥。時時行步。勿勞力過傷。使腎氣不足。生子解顛。
腦破不合。衣毋太溫。食毋太飽。若脾胃不和。榮衛虛怯。子必羸瘦多病。

若自家及鄰家修造動土。犯其胎氣。令子破形殞命。刀犯者形必傷。泥犯者竅必塞。打擊者色青黯。繫縛者相拘攣。此皆驗如影響。

候胎法

脈經曰。婦人懷軀七月而不可知。時時衄血而轉筋者。此爲軀也。脈經曰。妊娠初時。寸微小。呼吸五至。三月而尺數也。脈滑疾。重以手按之散者。胎已三月也。脈重手按之不散。但疾不滑者。五月也。尺脈左偏大爲男。右偏大爲女。左右俱大。產二子。大者如實狀。婦人妊娠四月。欲知男女法。左疾爲男。右疾爲女。俱疾爲生二子。胎經曰。若胎病不動。欲知生死。令人摸之。如覆杯者則男。如肘頸參差起者女也。觀此說。則前如箕如釜之義了然。

逐月養胎法

徐之才云。妊娠一月。名胎胚。宜飲食精熟。酸羹大麥。毋食腥辛。是謂纔正。足厥陰肝養。不可針灸其經。如大敦行間太衝中封肝主筋及血。血行否澀。不爲力事。寢必安。無令恐懼。

妊娠二月。名始膏。母食辛臊。居必靜處。男子勿勞。百節皆痛。是為胎始結。足少陽膽養。不可針灸其經。外丘陽陵泉等穴是也。膽主精。兒精成。常慎護。勿驚動。

妊娠三月。名始胎。當此之時。未有定儀。見物而化。欲生男者。操弓矢。欲生女者。弄珠璣。欲子美好。數視璧玉。欲子賢良。端坐清虛。是謂外象而內感者也。手心主包絡養。不可針灸其經。使如中衝勞宮大陵內關間。包絡主脈。母悲哀思慮驚動。

妊娠四月。始受水精以成血脈。食宜稻粳。羹宜魚雁。是謂盛血氣以通耳目而行經絡。手少陽三焦養。不可針灸其經。如關衝陽池內關三。也是時兒六府成。宜靜形體。和心志。節飲食。

妊娠五月。始受火精以成其氣。臥必晏起。沐浴浣衣。深其居處。厚其衣服。朝吸天光。以避寒殃。其食稻麥。其羹牛羊。和以茱萸。調以氣味。是謂養氣以定五藏。足太陰脾養。不可針灸其經。三陰交漏谷陰陵泉等穴是也。脾主四肢。兒四肢成。母大饑甚飽。母食乾燥炙熱。母大勞倦。

妊娠六月。始受金精以成其筋。身欲微勞。毋得靜處。出遊於野。數觀走犬行馬。食其鷙鳥猛獸之肉。是謂變腠理。紉筋以養其力。以堅背脊。足陽明胃養。不可針灸其經。如厲兌豐隆等穴是也兒口目成。調五味。食甘美。毋太飽。

妊娠七月。始受木精以成其骨。勞身搖肢。毋使定止。動作屈伸。以運血氣。居處必燥。飲食避寒。常食稻粳以密腠理。是謂養骨而堅齒。手太陰肺養。不可針灸其經。如少商魚際列缺尺澤天府等穴是也肺主皮毛。兒皮手已成。勿大言。勿號哭。勿薄衣。勿洗浴。勿寒飲。

妊娠八月。始生精以成膚革。和心靜息。毋使氣極。是謂密腠理而澤顏色。手陽明大腸養。不可針灸其經。如商陽二間合谷上下廉三里曲池肩井肩髃等穴是也陽明主九竅。兒九竅成。勿食燥物。及失食。勿忍大便。

妊娠九月。始受石精以成皮毛。六府百節。無不畢備。飲醴食甘。緩帶自持而待之。是謂養毛髮。致才力。足少陰腎養。不可針灸其經。如湧泉太谿等穴是也腎主續縷。兒脈絡續縷皆成。勿處溫冷。勿着炙衣。

妊娠十月。五藏俱備。六府齊通。納天地氣於丹田。關節人神皆備。但俟時而生。

妊娠一月始胚。二月始膏。三月始胞。四月形體成。五月能動。六月筋骨力。七月毛髮生。八月藏府具。九月穀氣入胃。十月諸神備。卽產矣。宜服滑胎束胎等藥。入月卽服。

臨產調理

妊娠臨月。最要安神定慮。常步履。勿多睡飽食。過飲酒。及雜藥。宜先貼產圖。依位鋪床帳。預請老練穩婆。備辦湯藥器物。欲產時。不可多人喧闐。但用老婦二人扶行。及凭物站立。若見漿水。腰腹痛甚。是胎離經。令產母仰臥。令兒轉身。若兒頭向產門。方可用藥催生坐草。若心煩。用水調服白蜜一匙。覺饑。喫糜粥少許。勿令饑渴。恐乏其力。不可強服早服。催生滑胎等藥。及早於坐草。使穩婆亂動手。

薛氏曰。欲產之時。覺腹內轉動。卽當正身仰臥。待兒轉身向下。時作痛。試捏產婦手中指中節。或本節跳動。方與臨盆。卽產矣。若初覺。不仰臥。

以待轉胞。或未產而水頻下。此胞衣已破。血水先乾。必有逆生難產之患。若胎衣破而不得分娩者。保生無憂散。以固其血。自然生息。如血已耗。用八珍湯料一斤。益母草半斤。水數十碗。煎熟不時飲之。亦有得生者。凡孕婦只腹痛。未產也。若連腰痛甚者。將產也。蓋腎候於腰。胞繫於腎故也。凡孕家宜預請有仁心知事穩婆。先與說知。倘有生息不順。只說未產。或遇雙胎。只說胞衣未下。恐驚則氣散。愈難生息。產值盛暑。或血暈血溢。當飲清水解之。冬末春初。產室用火和煖。下部衣服當溫厚。方免胎寒血結。若臨月洗頭足。亦致難產。胞漿先破。惡水來多。胎乾不得下。須先與四物湯補養血氣。次濃煎葱湯放溫。令坐婆洗產戶。須是款曲洗。令氣上下通暢。更用酥油滑石末塗產口裏。次服神妙乳硃丹。或葵子如聖散。

楊子建十產論

一曰正產。十月滿足。忽腰腹作陣。疼痛相似。胎氣頓陷。至於臍腹痛極。乃至腰間重痛。穀道挺進。繼之漿破血出。兒乃遂生。

二曰傷產。蓋人之生。各有時日。不可改易。今有未產一月前。忽然臍腹疼痛。有如欲產。仍無事。是名試月。非正產也。但產母未有正產之候。不可令人抱腰。產母亦不可妄亂用力。蓋欲產之時。臍腹疼痛。兒身未順。收生者。却教產母早用力。兒身纔轉動。即使用力一逼。使兒錯路。忽橫忽倒。不能正生。皆緣產母用力未當所致。必須待兒順身逼戶。方始用力一送。令兒下生。此方是母之用力當也。若未有正產之候。而用力早。妄服藥。譬如揠苗助長。無益有害。

三曰催產。欲產時。漿破血下。臍腹作陣疼痛。腰重穀道挺進。已見正產之候。但未生下。可服藥以催之。或有經及數日。產母困苦。明是正產之候。但兒難生。亦可服藥以助母正氣。兒乃得下。

四曰凍產。冬月天冷。經血得冷則凝。以致兒不能下。此害最深。若冬月產者。下部不可去綿衣。并不可坐臥冷處。當滿房着火。常有煖氣。令母背身向火。令臍下腿膝間常煖。血煖則流利易生。

五曰熱產。盛夏之月。要溫涼得所。勿恣意取涼。致傷胎氣。亦不可人多。

熱氣逼母。使母血沸。致有發熱頭疼。面赤如醉。不知人事者。

六曰橫產。兒先露手。或先露臂。此由母未當用力而用之太過也。兒身未順。用力一逼。遂至身橫。不能生下。當令母安然仰臥。後令看生人先推其手。令入直上。漸漸逼身。以中指摩其肩。推上正之。或以手攀其耳而正之。須是母仰臥。然後推兒直上。徐徐正之。候其身正。服催生藥一盞。方用力令兒下生。

七曰倒產。產母胎氣不足。關鍵不牢。用力太早。致兒不能迴轉。便直下先露其足。當令母仰臥。令看生人推其足入。不可令母用力。亦不得驚恐。使兒自順。

八曰偏產。兒身未正。母用力過早。致兒頭偏在左。或偏在右。故頭雖露。偏在一畔。不能生下。當令母仰臥。次令看生人輕輕推兒近上。以手正其頭。令兒頭端正。然後令母用力一送。即便生下。若是小兒頭後骨偏在穀道。只露其額。當令看生人以綿衣炙溫裹手。於穀道外。輕輕推兒頭正。便令母送兒生也。

九曰礙產。兒身已順而露正頂。不能生下。蓋因兒身回轉。肚帶絆其肩。以此露正頂而不能生。當令母仰臥。令看生人輕推兒近上。徐徐引手以中指按兒肩下。撥其肚帶。仍須候兒身正順。方令母用力送。令兒生下。

十曰坐產。兒將生。其母疲倦。久坐椅褥。抵其生路。急於高處。繫一手巾。令母以手攀之。輕輕屈足坐身。令兒生下。非坐在物上也。

更有盤腸產者。臨產母腸先出。然後兒生。若產後腸不收。甚楚。卽以醋半盞。新汲水七分調勻。喫母面。每喫一縮。三喫縮盡。此良法也。

交骨不開。產門不閉。皆元氣素弱。胎前失調。以致血氣不能運達而然。交骨不開。陰氣虛。宜加味芎歸湯補中益氣湯龜殼散之類產門不閉。氣血虛。宜十全大補湯

胎死腹中。子死腹中者。多因驚動太早。或犯禁忌。致令產難。胞漿已破。無血養胎。枯涸而死。須驗產母舌青黑。其胎死矣。當下之。宜平胃散金神造湯半夏陽之類大法寒者熱以行之。熱者涼以行之。燥者滑以潤之。危急

者。毒藥下之。下宜朴硝之類。

臨產束胎

臨產束胎

瘦斂則易生。

宜束胎丸達生散張氏方保生無憂散神寢丸之類

臨產催生

催生大法

滑以流通

澀滯苦以驅逐

閉塞香以開竅

逐血。

氣滯者行氣。胞漿先破。疾困者固血。

宜佛手散三合濟生湯黑神散黃金膠赤小豆湯兔腦丸如神散黃金

散之類

產後調理

凡產畢。飲熱童便一盞。不得便臥。宜閉目坐。須臾上牀。宜仰臥。不宜側。宜豎膝。未可伸足。高倚牀頭。厚鋪衲褥。遮圍四壁。使無孔隙。免致賊風。及以醋塗鼻。或用醋炭。及燒漆器。更以手從心掩按至臍下。使惡露不滯。如此三日。以防血暈血逆。不問腹痛不痛。有病無病。以童便和酒半盞。溫服五七服。酒雖行血。亦不可多。能發昏暈。宜頻食白粥少許。一月後。宜食羊肉豬蹄少許。仍慎言語。七情寒暑梳頭洗足。以百日為度。若氣血素弱者。不計日月。否則患手足腰腿痠痛等證。名曰蓐勞。最難治療。初產時。不可問是男是女。恐因言語而洩氣。或以愛憎而動氣。皆能

致病不可獨宿。恐致虛驚。不可刮舌。恐傷心氣。不可漱齒。恐致血逆。須氣血平復。方可治事。犯時微若秋毫。成病重如山嶽。可不戒哉。產婦將息如法。藏府調和。庶無疾苦。須先服黑神散。四物湯。若壯熱頭痛。此乳脈將行。頭目不清。是血暈。用清魂散。粥食不美。是胃氣虛。當歸建中湯。陳藏器云。續芎汁與產婦服之。將芎麻與婦人枕之。止血暈。產婦腹痛。置芎於腹上。則止。產後宜補。丹溪曰。產後當大補氣血。雖有雜證。以末治之。產後補虛用參朮黃耆陳皮當歸川芎炙甘草。如發熱。輕則加茯苓淡滲之。其熱自除。重則加乾薑。凡產後有病。先固氣血。產後一切病。多是血虛。皆不可表。

新產三病。仲景云。問新產婦人有三病。一者病瘕。二者病鬱冒。三者大便難。何謂也。師曰。新產血虛。多汗出。喜中風。故令病瘕。亡血復汗。寒多。故令鬱冒。亡津液。胃燥。故大便難。鬱冒。即今所謂血暈也。千金云。凡產後滿百日。乃可會合。不爾。至使虛羸。百疾滋長。慎之。凡婦人患風氣。臍下虛冷。莫不由此。早行房故也。

產後脈法。脈經曰。婦人生產之後。寸口脈洪疾不調者死。沉微附骨不絕者生。婦人新產乳子。脈沉小滑者生。實大堅弦急者死。丹溪曰。產前脈細小。產後脈洪大者多死。又曰。產前脈當洪數。既產而脈洪脈如故者主多死。

胞衣不下。胞衣不下者。謂之息胞。由產初用力。比兒出而體已疲憊。不復能用力。產胞停留間。而或外冷乘之。則血道澀。故不下。須急以方藥救治。不妨害於兒。所奈者。胞繫連兒臍。胞不出。即不得以時斷臍。浴洗冷氣傷兒。則成病也。舊法胞衣不出。恐損兒者。依法截臍而已。產處須順四時方向。并避五行禁忌。若有觸犯。多令產婦難產。

郭稽中曰。胞衣不下。亦有流血入衣中。衣爲血所脹。故不得下。治之稍緩。脹滿腹中。以次上衝。心胸疼痛。喘急者難治。但服奪命丹。以逐去衣中之血。血散脹消。衣自下也。牛膝湯亦效。

薛氏曰。有因惡露入衣。脹而不能出。有因元氣虧損而不能送出。其惡露流衣中者。腹中脹痛。用奪命丹。或失笑散。并胡氏法之類。以消瘀血。

緩則不救。其元氣不能送者。腹中不脹痛。用保生無憂散。以固補元氣。或用草麻子肉一兩。細研成膏。塗母右足心。衣下卽洗去。緩則腸亦出。如腸不收。仍用此膏塗腦頂。則腸自入。或加桂芎歸丸。紅花酒之類。血暈附厥逆。大全云。產後血暈者。由敗血流入肝經。以致眼黑頭旋。不能起坐。甚至昏悶。不省人事。謂之血暈。以細酒調黑神散服。若作暗風中風治之。誤矣。有血熱乘風。逆上淩心。以致昏迷不省。氣閉欲絕者。服童便最好。然其由有三。有用心使力過多而暈者。有下血過多而暈者。有下血少而暈者。其暈雖同。治之則異。當審詳之。下血多而暈者。昏而煩亂。當以補血清心。下血少而暈者。乃惡露不下而上搶心。下滿急。神昏口噤。絕不知人。當以破血行血藥。古法云。產婦分娩訖。預將秤錘。或黃石硬炭。燒令通赤。置器中。急於床前以醋沃之。得醋氣。可除血暈。產後一月內。時作爲妙。崔氏云。凡暈者。皆是虛熱。血氣奔迸。腹中空虛所致。欲分娩者。第一須先取醢醋以塗口鼻。仍置醋於傍。使聞其氣。兼細細飲之。此爲上法。如覺暈。卽以醋噴面。甦來卽飲醋。仍少與解之。仍少云。

與水一法燒乾漆令烟濃熏產母面即醒。如無乾漆取舊漆血暈用藥。
宜清魂散失笑散芎歸湯荊芥散白微湯之類。

惡露不下 惡露不下由產後藏府勞傷氣血虛損或胞絡挾宿冷或產後當風取涼風冷乘虛而搏血則壅滯不宣積蓄在內故令惡露不下也宜失笑散花蕊石散起枕散。

血露不絕 大全云產後血露不絕者由產後損傷經血虛損不足或分解之時惡血不盡留停腹中致氣血不攝故令淋瀝不絕也。

薛氏曰若前證肝氣熱而不能主血宜六味地黃丸若肝氣虛而不能藏血宜逍遙散若脾氣虛而不能攝血宜六君子湯若胃氣下陷而不能統血宜補中益氣湯若脾經鬱熱而血不歸源宜加味歸脾湯若肝經怒火而妄行宜加味四物湯若氣血俱虛宜十全大補湯若肝經風邪而血沸騰宜四物加防風他如烏金散蒲醋飲子宜俱審證用之。

附方

釋曰此保生無憂散 治妊娠身居安逸口厭甘肥憂樂不常食物不節致胞胎

方以當
歸芎芍
草補氣
血固矣
復以枳
殼木香
利氣乳
香血餘
利血守
使兩得
方也

肥厚。根蒂堅牢。或瘦人血少胎弱。臨蓐難產。入月服之。則易生也。

當歸

川芎

白芍藥

枳

殼

木香

甘草

各一乳

香另研

血

餘燒存性另

右作一服水煎。入乳香、血餘和勻。不拘時服。

八珍湯

見第六

四物湯

見第二

神妙乳砂丹

治難產。

明乳香為末。以猪心血為丸。如桐子。硃砂為衣。日乾。每服一丸。嚼碎冷酒下。良久未生。再服。或以蓮葉蒂七個。水煎化服二丸。良久未生。再服。

葵子如聖散

催生。

黃蜀葵子。不拘多少。焙乾為末。熱酒調下二錢。神效。如無子。花亦可。

若胎漏血乾難產。痛極者。并進三服。良久腹中氣寬。胎滑即產。須見正

產候。方可服之。如打撲死胎。紅花酒下。

加味芎歸湯

產後血氣虛。感風寒。頭疼寒熱。

當歸

川芎各二錢

紫蘇

乾葛各一錢

右剉。加生薑三片。煎服。

補中益氣湯見第三十九

龜殼散 治交骨不開。不能生產。

當歸

川芎

敗龜板酥炙一個

婦人頭髮生長過者一握燒存性

右爲散。每服五錢。水煎服。約人行五里卽生。如胎死不下。灼過龜板亦可。

十全大補湯見第十六

平胃散見第四十四

千金神造湯 治動胎及產難。子死腹中。或姙娠兩兒。一死一生。服之令

死者出。生者安。神驗莫測。

蟹爪一升 甘草二尺 阿膠三兩

右三味。以東流水一斗。先煮蟹爪。甘草得三升。去滓。次內膠令烊。頓服

擇曰蟹爪尖利破壞胎而甘草和緩冀中土以安

生阿膠 滑潤養 陰為催 產聖藥 至若一 二三四 數之順 升尺秤 取動用 不怠東 流水取 順下東 向竈取 生氣葦 薪取輕 脫巧出 意外信 神造也 梓曰羊 孕七月 曰牽牽 即達也 達生即 羊生也 甚言其

之。不能下。再服。若人昏牙緊。搥口內藥。藥入即活。煎藥作東向竈。用葦薪煮之。

半夏湯 治胎衣不下。或子死腹中。或血衝上昏悶。或血暴下。及胞乾而不能產者。

半夏 麴半一兩

桂 錢半皮七

大黃 五錢

桃

仁三十粒去

右為粗末。先服四物湯一二服。次用此藥一錢。生薑三片。水煎服。如未效。次服下胎丸。

束胎丸 胎瘦易生。服至產則已。

白朮

枳

殼各等分

為末。燒飯丸。如桐子大。八月一日。食前服三五十丸。溫水下。

達生散 八九個月內。服十數帖。易產。

大腹皮 三錢

人參

陳皮

紫蘇莖葉

各五

歸身尾

白朮

白芍藥

各一

甘

草

錢二

右作一服。入青葱五葉。黃楊腦七個。少胎瘦者。不須用。兒食水煎服。或

加枳殼、砂仁。春加川芎。夏加黃芩。秋加澤瀉。冬加砂仁。氣虛倍參朮。氣實加香附、陳皮。血虛加當歸、地黃。形實倍紫蘇。性急多怒加黃連、柴胡。熱甚加黃芩。濕熱加滑石、半夏。食積加山查。食後易饑倍黃楊腦。腹痛加木香、官桂。

張氏方 治妊娠胎肥壅隘動止艱辛臨月服之縮胎易產兼治腸中諸疾下氣寬膈。

枳殼五兩 甘草半兩 香附子三兩
去毛炒

右爲末。薑湯點服。如丈夫婦人冷氣攻刺脇肋疼痛者用葱白三寸同煎服。婦人脾寒血氣成塊作痛熱酒調服。大小便不通白牽牛湯調服。

神寢丸 瘦胎滑利易產臨月服之神效。

通明乳香半兩 枳殼一兩
炒

爲末煉蜜丸如桐子大每三十丸空心溫酒下。

佛手散 治妊娠因事仆跌子死腹中惡露妄行疼痛不已口噤欲絕用

苦惱無
邊佛手
救授自
能脫離

此藥探之。若子死腹中。立便逐下。若腹痛隨止。子母俱安。又治臨產艱難。胞衣不下。及產後血暈。不省人事。狀如中風。血崩惡露不止。腹中血刺。疔痛。血滯浮腫。血入心經。語言顛倒。如見鬼神。血風相搏。身熱頭痛。或似瘧非瘧。一切胎前產後。危急狼狽。垂死等證。並皆治之。丹溪云。催生只用佛手散。最穩當。又效捷。

當歸酒洗去川芎各七錢一方

右細剉。分作四分。每服先用水一盞。煎將乾。投酒一盞半。煎五七沸。溫服。如口噤。撬開灌之。如人行五里許。再灌一服。盡此四服。便產神驗。如產難倒橫。子死腹中。先用黑豆炒熟。入白水童便各一盞。用藥四錢煎服。如胞產五七日。不下垂死。及矮石女子。交骨不開者。加龜板并生育過婦人頭髮。燒灰爲末。每三錢酒調服。

三合濟生湯 以枳殼芎歸達生三方。抽其精粹而成。合此湯。治臨產艱難。雖一二日不下者。服此自然轉動下生。

當歸三錢 川芎 枳殼熟炒各二錢 香附子錢炒一

蘇葉八分 粉草七分 大腹皮薑汁洗一錢半

右用水煎。待腰腹痛甚。服之即產。一方加白芷一錢。

黑神散一名催生如神散

治橫生逆產。其功甚大。並治胎前產後虛損。月水不

止。崩漏等證。

百草霜

白芷不見火

右為末。每服二錢。以童便米醋和如膏。加沸湯調下。或童便酒煎進二服。然血得黑則止。此藥大能固血。又免血涸。甚妙。一方加白滑石煎。芎歸湯調下。

阿膠赤小豆湯 治難產累日。氣力乏盡。不得生。此是宿有病者。宜此方。

阿膠二兩 赤小豆二升

右水九升。煮豆熟去滓。內膠令烊。每服五合。不覺更服。不過三服即出。

兔腦丸一名催生丹 治產難及橫生逆產。

兔腦臘月者去皮

明乳香二錢半 母丁香為末一錢

麝香一字另

右研勻。用兔腦髓和爲丸。如雞頭大。陰乾。油紙封裹。每一丸破水後。溫水下。卽產。隨男左女右手握藥出。

如神散 催生累效。理則難通。

用路上草鞋一雙。取鼻梁上繩。洗淨燒灰。童便和酒調下三錢。一名千里馬。

黃金散 治生產一二日。難分娩者。服之如神。

真金箔。大者五片。小者七片。以小磁鍾。將水少許。去紙入箔在內。用指研勻。後再添水至半鍾。一面先令一人扶產婦虛坐。又令一婦人用兩手大指。按定產母兩肩井穴。前藥溫服。其胎卽下。此催生聖藥。如產月未足。又能安之。

清魂散 產後血暈者。氣血暴虛。未得安靜。血隨氣上。迷亂心神。故眼前生花。極甚者。令人悶絕。不知人口噤神昏。氣冷。宜先取乾漆。或漆器。燒鼻中熏之。頻置醋炭房內。次進此藥卽醒。

澤蘭葉

人參

川芎

芍藥

荊芥穗

右爲細末。每服二錢。用溫酒熱湯各半盞。或入童便調。急灌之。下咽眼即開。氣定即醒。

六君子湯見第六

當歸建中湯 治產後勞傷。虛羸不足。腹中疼痛。呼吸少氣。小腹拘急。痛連腰背。時自汗出。不思飲食。產訖直至月滿。一日三服。令人身壯強健。

當歸四兩 白芍六兩 桂心三兩 黃耆一兩

右剉。每服四錢。加薑棗水煎。入飴糖一塊再煎。稍熱服。如崩中衄血。加阿膠、地黃。

奪命丹 治胎衣不下。蓋兒之初生。惡血流入衣中。爲血所脹塞。故不得下。須臾衝上。逼心即死。急服此藥。

黑附子炮五錢 牡丹皮一兩 乾漆炒煙盡二錢五分

右爲細末。用米醋一升。大黃末一兩。同煮成膏。和前藥爲丸。如桐子大。每服五七丸。溫酒下。

牛膝湯 治胞衣不出。臍腹堅脹急痛。即殺人。服此藥。胞即爛下。死胎亦

下。

牛膝

瞿麥

各四兩

當歸尾

通

草各六兩

滑石

八兩

葵子

五兩

一方有桂心二兩。

右細切。以水九升。煮取三升。分三服。

失笑散 產後惡血上攻。心腹疼痛欲死。及兒枕痛。或牙關緊急。一服可愈。

蒲黃

妙

五靈脂

各一錢

右爲細末。作一服。用醖醋調膏。入水一盞煎服。

胡氏法

治產後胞衣不下。惟有花蕊石散一件。最爲要緊。若鄉居藥局遠者。倉卒無之。今有一妙法。產訖胞衣不下。稍久。則血流胞中。爲血所脹。上衝心胸。喘急疼痛。必致危篤。若有此症。宜急斷臍帶。以少物繫帶。必用力牢固繫之。然後絕斷。使其子血脈不潮入胞中。胞衣自當痿縮而下。縱

淹延數日。亦不害人。累驗。

加桂芎歸湯 有胞衣不下。因產母元氣虛薄者。以此溫之。自下。

川芎 當歸 各二錢 官桂 四錢

右剉一服。水煎服。

紅花酒

紅花 一兩

酒煮濃汁服。如口噤。幹開灌之。速效。

芎歸湯 即佛手散

荆芥散 治產後風虛血暈。精神昏昧。

荆芥 三錢 桃仁 錢五

右爲細末。溫水調下三錢。微喘。加杏仁炒。甘草各三錢。

白薇湯 治產後胃弱不食。脈微多汗。亡血發厥。鬱冒等症。

白薇 當歸 各六錢 人參 三錢 甘草 半錢

右切分作二帖。水煎服。

花蕊石散見第十四

起枕散 治產後惡血不行。心腹及兒枕作痛。甚危。

當歸 白芍藥酒炒各三錢 川芎二錢 官桂

玄胡索 牡丹皮 蒲黃炒 五靈脂炒

沒藥各一錢 白芷一錢

右剉水煎。入童便。空心服。

六味地黃丸見第十六

逍遙散見第五十一

加味歸脾湯即歸脾湯加柴胡杜

加味四物湯 治產後血崩如豆汁紫黑過多者。

當歸 川芎 芍藥 生地黃

蒲黃 阿膠 薊根 白芷

右水煎服。

烏金散 治產後血迷血暈。敗血不止。淋瀝不斷。臍腹疔痛。昏眩多汗無

力及崩中下血不止。

麒麟竭

男子亂髮灰

松

墨

煨醋

百草霜

當歸

肉桂

赤芍

延胡索

鯉魚鱗

燒存性
各等分

右爲末。每服二錢。空心溫酒調下。

蒲醋飲子

治新產瘀血。逐敗滋新。此藥治血神效。又非黑神散之可比。

也。月內每日一二服尤良。及療一切惡露與血積。

真蒲黃不拘多少。熬米醋令稠。研藥成膏。每服一彈子大。食前醋湯化。

開服。

陰陽和而後孕。孕固有巧合自然之妙也。不諳者。乃一意珍護。時或亂投醫藥。氣血偏勝。反致胎氣不安。及半產漏下諸症候。故胎前諸方不備錄。然有不得已者。可於胎產驗過方中求之。

外附胎產驗過方

益母丸

又名千金保胎丸

凡女人受孕後。三月而胎墮者。雖氣血不足。乃中衝

脈動。任與衝脈。即陽明胃經供應胎孕。至此時。必須節飲食。絕慾。戒怒。庶免小產之患。服此可以保全。

白朮土炒

熟地黃薑汁炒

杜仲薑汁炒當歸酒洗

續斷酒洗

阿膠蛤粉炒

香附米四製益母草

條芩炒各二兩

陳皮

川芎

艾葉醋炙各一兩

砂仁炒五錢

右為細末。煮棗肉為丸。如桐子大。每服百丸。空心米飲下。

金匱當歸散。此方清熱安胎。娠婦宜常服之。如瘦人血少血熱。血虛氣弱。每致半產者。皆宜服之。以清其源。而無鬱熱難產之患。

當歸

川芎

白芍藥

黃芩各一兩

白朮二兩

右為末。每服二錢。酒飲調服方寸匕。或用酒糊為丸。如桐子大。每服五十丸。溫酒化下。日三服。

白朮湯。治胃虛惡阻吐水。甚至十餘日。水漿不入者。

白朮炒一 人參五錢 丁香二錢 甘草一錢

右為細末。每服二錢。加生薑五片。水煎。食前溫服。

縮砂散 治妊娠胃虛氣逆。嘔吐不食。

縮砂仁為末。每服二錢。生薑汁和米飲調服。

三物解毒湯 治誤服毒藥。

甘草 黑大豆 淡竹葉各等分

右用水煎濃服。

白扁豆散 治妊娠帶下。誤服毒藥。動胎欲墮。

白扁豆。生去皮為細末。每服方寸匕。神效。或濃煎亦可。

豆淋酒 治產後。猶有餘血不淨者。

黑豆五升。熬令烟盡。投磁器內。以酒一斗。淬之。飲。蓋豆淋酒治汚血。又

能發表也。

枳實芍藥散 金匱云。產後腹痛煩滿。不得臥。此方主之。

枳實炒太 芍藥各等分

枳實曰餘 血水氣 不淨腎 家大虛 黑大豆 腎 豆包粒 甚固非 去弦不 出胞能 如之豈 憂墮乎 枳曰餘 血水氣 不淨腎 家大虛 黑大豆 腎

之穀補
腎而復
以酒行
其餘得
理之方

右杵為散。服方寸匕。日三服。並主癰膿。以麥粥下之。

羊肉湯 治產婦脾虛。為寒氣所乘。以致腹痛。及寒月生產。寒氣入於產門。肚腹疼痛。手不可犯。

精羯羊肉 四兩 當歸 二兩 川芎 一兩 生薑 一兩

右以水十盞。酒一大杯。煎一碗。分四次。空心服。加葱、鹽亦可。

衍義云。一婦人產後。致寒氣入於產門。臍滿。手不得犯。此寒疝也。醫者以其腹痛當臍。謂其有瘀血耳。予教之曰。非其治也。此寒疝耳。用羊肉湯少減。作二服愈。

同生丹 治產後瘀積等症。

大黃 一斤為末 蘇木 三兩剉用河水煎汁三碗 黑豆 三兩煮熟取汁三碗

紅花 三兩酒四碗煎汁三碗

右將大黃末。以好醋二斤攪勻。以文武火熬成膏。次下三項汁。攪開大黃膏。再熬成膏。如有鍋巴。焙乾入在後藥。

當歸 川芎 熟地黄 白茯苓

蒼朮米泔水浸炒 烏藥 玄胡索 桃仁另研

蒲黃 牛膝 香附各二兩 甘草

陳皮 羌活 三稜 五靈脂

木香 地榆 山茱肉各五錢 人參

白朮土炒 木瓜 青皮各三錢 良薑四錢

乳香 沒藥各一錢 白芍酒炒

同末。大黃膏和丸。如彈子大。每服一丸。黃酒燉化下。

艾附煖宮丸 治婦人經水不調。小腹時痛。赤白帶下。子宮寒冷。

香附四製一斤 艾葉醋炒 當歸 川芎

白芍藥酒炒 熟地黄薑汁炒 玄胡索炒 甘草生用

右為細末。醋煮米和丸。如梧子大。每服三錢。米湯酒任下。

神方驗胎散 兩三個月經水不行。孕否不決。此藥探之。

真雀腦芎 一兩 全當歸重一兩 用七錢

爲細末。分作二服。濃煎。好艾湯一盞調下。或好酒調服亦得。可於服後
二三時內覺臍腹微動而煩。卽有胎也。動罷卽愈。如不動卽知不是胎。
卽不動。所帶惡物自下。不應再煎紅花湯調下。

醫燈續焰 卷十五 胎產脈證第七十七

醫燈續焰

明 錢塘 王紹隆 著

明 錢塘 潘楫碩甫註

明 錢塘 王佑賢聖翼評

鄞縣 曹赤電炳章校

卷十六

小兒脈證第七十八

小兒之脈。七至爲平。更察色證。與虎口文。

三歲以下小兒。純陽之體。形質小。呼吸促。脈之周行。駛而應指疾。大約以七至爲平。非若大人四至爲平也。其太過爲數爲熱。不及爲遲爲寒。則與大人無異矣。雖然脈至七八。難全爲準。必察其色。與所見之證。更視虎口之文。而病情始無隱匿。蓋五藏之列於面。各有定部。如左腮屬

說風氣
命三字
明透

肝。右腮屬肺。額上屬心。鼻屬脾。頰屬腎是已。諸邪之見於部。亦各有定色。如赤爲熱。白爲寒。黃爲積。青黑爲痛是已。虎口者。食指內側。連大指作虎口形。故曰虎口。是處肌皮嫩薄。文色顯明。卽肺手太陰經脈之盡處。諸脈大會此經。察色者。卽所以察脈也。故色赤爲熱。在脈則數。色白爲寒。在脈則遲。色黃爲積。在脈則緩。色青黑爲痛。在脈則沉弦。此皆自然之理。非可牽會。雖無五部之分。而有三關之別。指初節曰風關。二節曰氣關。三節曰命關。文色見風關者輕。再進。則上氣關爲重。再進。則直透命關爲最重。甚則主死。由風邪而干正氣。正氣不能勝而迫及於命。漸進漸深之象也。至如外證。肝病主諸風顛掉。實則目直叫呼。脇痛項急。呵欠頓悶。二便閉塞。虛則咬牙多欠。目閉羞明。心病主驚。實則發搐叫喊。或笑發熱。欲飲水。頻吐舌。虛則悸臥不安。畏見人。舌痿不能乳。脾主困。實則困頓。身重肌熱。腹脹硬。脣腫而渴。虛則吐瀉不食。慢風。四肢不收。口流涎。肺主喘。實則胸滿喘促悶亂。虛則哽氣。呵欠寒慄。腎主恐怖。畏明。不能立。二便清泄。足冷。但有虛證。而無實證。已上諸證。不過言

其大概耳。至於傾移傳變。何可勝紀。唯圓機之士。參合色脈。識本知標。溯流窮源。錯綜體認。縱不能臻聖神之域。諒亦不在工巧之下矣。

小兒雜述

襁褓 千金論云。小兒宜用父故絮。女用母故絮爲衣。勿用新綿。及過厚。令壯熱生瘡。發癩。又令筋骨緩弱。宜時見風日爲佳。乳哺 乳者奶也。哺者食也。乳後不得便與食。哺後不得便與乳。小兒脾胃弱。乳食相併。難以尅化。周歲已上。必成乳癖食癖。作熱作疼。疳病從此始。丹溪曰。小兒腸胃薄窄。一切酸鹹甜辣。魚肉水果。濕麵煎炒。俱是發熱難化之物。皆宜禁絕。只與熟菜白粥。非唯無病。且不縱口。可以養德。婦人無知。唯務姑息。畏其啼哭。無所不與。積成癰疾。雖悔何及。乳母尤宜謹節。飲食下咽。乳汁便通。情欲中動。乳脈便應。兒得此乳。疾病立至。不吐則瀉。不瘡則熱。驚搐夜啼。口糜腹痛諸疾。所由來矣。病之初來。其溺必少。便須詢問。隨證治母。可消患於未形也。乳母亦不宜用狐臭。癭癰。喘嗽。疥癬。頭瘡。聾啞。鬚鼻。癰證之人。

肘後云。兒生三日。宜助穀神。碎米作飲如乳。與兒大豆許。令嚥之。頻與三豆許。三七日可哺。

千金云。兒哺早。不勝穀氣。令頭面體生瘡。愈而復發。疳羸難養。一月後。雖哺勿多。不嗜食。勿強與之。寶鑑云。兒五十日。可哺如棗核。百日彈丸。早晚二哺。莫當風解衣澡浴。及帶哭而乳。冒冷而哺。又不可在神佛驢馬畔。及各房異戶。皆令兒爲病。

錢乙云。惜兒過當。三兩歲。猶未飲食。致脾胃弱。一生多病。半年後。宜煎陳米稀粥。時與之。十月後。漸與稠粥。助中氣。自然易養。少病。外臺崔氏。初哺兒。用平定成日。丑寅辰巳酉日吉。男忌戊己。女忌丙丁日。

小兒四五歲。當斷乳而不肯斷者。宜晝斷後。肉食宜少。少漸進。則無疳癖之患。

田氏曰。大凡小兒過煖生熱。熱極生風。提抱生癰。餵飼生癖。盛夏浴後。勿卽乳兒。兒啼勿卽與乳。令兒成胃毒。或秋成痢。浴後良久。身體燥。兒

啼後。俟氣息平。方可乳。盛啼卽乳。多令氣逆成呃。
千金論曰。乳兒勿過飽。飽則溢而吐。若乳來多猛。取出接後再乳。或先
捏去宿汁乳之。乳母欲寐。當以臂枕兒頭。與乳平。母欲睡熟。卽奪其乳。
恐其不知飽足。亦成嘔吐。父母交合。兒臥於側。或驚起。勿與乳。蓋氣亂
未定。亦能害兒。

顱顱經曰。夏不去熱乳。令兒嘔吐。冬不去寒乳。令兒瀉痢。侵早乳兒。皆
須捏去宿乳。乳汁勿投於地。蟲蟻食之。令乳無汁。宜沃東壁上。

張渙曰。乳母須每日三時。摸兒項後風池。若壯熱者。卽須熨之。使微汗
卽愈。風池在頭項切不可妄鍼灸。亦不可輒吐下。蓋鍼灸傷兒經絡。吐
下動兒藏府也。

嬰兒半歲。尻骨已成。乳母當教兒學坐。二百日外。掌骨成。教令地上匍
匐。三百日。臍骨成。教令獨立。周歲膝骨成。教令行步。此皆一定之法。世
人惜兒。懷抱過時。柔痿筋骨。爲害非淺。

初生 兒在胎。藉胎液以生藏府。分娩時。口含血塊。啼聲出。卽嚥下。此

毒內伏命門。外感天時。多發爲驚風瘡疹等病。須於未啼時。用綿裹指。急挖去。用黃連、豆豉、硃、蜜、甘草解之。後出痘亦輕。又或難產。或冒風寒垂危者。勿卽斷臍帶。急烘綿絮。包抱懷中。以胎衣置火中。更用火紙捻。於臍帶上下往來燎之。使煖氣入腹。必自甦。尤戒浴。恐腠理泄而外邪乘也。看舌下有膜如榴子連舌。致啼不出。聲不轉。速以指爪斷。或用葦刀割之。微有血出卽活。若血出多。燒髮灰。猪脂和塗之。兒上下脣與齒齦連處。皆有一筋牽引。若上脣筋緊。卽生上煉。下脣筋緊。卽生下煉。上煉生瘡滿頭。或眉間如癰狀。瘙癢不已。復流黃汁。至處生瘡。下煉起腰背。漸至四肢。患亦如上。若不治。或頭面相通。累年不輕。令夭折。或成大病。唯每早拭口佳。

兒生三日。以桑槐榆桃柳嫩枝。各三寸。長者二三十節。煎湯適冷熱。入猪膽汁一枚浴之。勿久。浴湯用猪膽、益母草。不生疥瘡。用金銀花、虎頭骨、麝丹砂。辟惡氣。客忤驚癇。用桃梅李楮根葉。解體熱溫疫。須臨浴時。賁紀用經浴法。用寅卯酉日吉。壬午丁未癸巳凶。不能上三日。勿犯下。

三日。又三日五日七日宜浴。

小兒浴。勿先斷臍帶。恐水濕侵臍。有臍風臍瘡等證。用清油調髮灰傅臍佳。

千金云。臍勿以刀割。隔單衣咬斷。以煖氣呵七遍。卽纏結。所留帶。致兒足趺上。斷訖。看臍帶中多有蟲。急剔去。不爾。入臍成疾。臍當長六寸。長則傷肌。短則傷藏。不以時斷。及按汁不盡。煖氣漸微。卽生寒。令兒臍風。寶鑑論斷臍。若用剪刀。先於懷中令剪煖。又水入臍。多天釣。痛苦啼叫。面青黑。臍傷動。久不乾。傷外風。卽口噤不可救。聖惠云。兒生一宿。抱近明無風處。看臍上有赤脈直上者。卽於脈盡頭灸三壯。赤散卽無患矣。裹臍必用軟練帛。若十許日。怒啼不止。必臍燥刺腹。或衣中有刺物。或換衣。或換裹。須細察之。

崔氏云。兒衣須清水洗。勿令污濁。新瓶盛。密蓋。置便宜處。三日後。依月吉地向陽處埋之。入土三尺。須牢築。令兒壽。若不謹。或爲蟲畜傷食。主兒不壽。或橫亡。宜天德月空處埋吉。

正月天德在辛月空在丙辰餘詳官本曆日

若遇反支。

宜挂宅外福德上。向陽高燥處。待過月。然後依法埋藏吉。甲乙日生。丙丁日藏。丙丁日生。戊己日藏。戊己日生。庚辛日藏。庚辛日生。壬癸日藏吉。

集驗方云。小兒初剃頭。不擇日。皆於滿月日剃之。蓋俗所尚。前產婦未得出房。於滿月。即與兒俱出。謂胎髮穢惡。有觸神竈。令兒不安。故於此日剃頭而出。凡剃頭須避風就煖。剃後以杏仁三枚。去皮尖研碎。入薄荷三葉。再同研。却入生麻油三四滴。膩粉拌和。頭上擦。免生瘡疥熱毒。初生輒死。千金云。兒初生輒死。視口中懸壅。前上齦有泡者。以指甲摘取頭。決潰去血。勿令入咽。

不能啼。三因云。兒初生不能啼者。必難產冒寒所致。急用綿絮包抱懷中。勿斷臍帶。將胞衣置爐炭中燒之。再撚大紙條蘸油點火。於臍帶下熏之。令火氣入臍。更以熱醋湯盪洗臍帶。須臾氣回啼哭。方可浴。浴後斷帶。又或有泡在上齦。即如上救初生輒死法治之。眼不開。兒初生。眼不開呻吟。胎熱故也。宜天竺黃散。生地黃湯。及與

乳母喫。亦有洗拭不淨。使穢汁漬於皆中。致赤爛。長亦不瘥。宜真金

不喫乳。此亦拭口不淨。惡穢入腹。令兒腹滿氣短。不能吮乳。或母取

冷過度。胎中受寒。令兒腹痛也。宜外臺方之類灸

不小便。此多因母恣食熱物。熱毒入胎所致。如臍腹腫脹。四旁青黑

色。及口撮。即不可救。如未見色。宜外臺方豆

不大便。由胎中受熱。熱結肛門燥澀。所以如此。若三日不通。急令乳

母以溫水漱口。啞兒前後心。并臍下手足心。共七處。凡四五次。仍以輕

粉半錢。蜜少許。溫水化開。時時服少許。以通為度。如仍不通。須透而通

之。金簪玉簪俱可。須刺入一二寸。內少蘇合丸於內。糞出為快。若腹膨

脹。呻吟不乳。至一七則難救。用硬葱鍼絰肛門亦好。

鵝口。初生口中舌上。白屑如鵝之口。由在胎受穀氣盛。心脾熱氣熏

發。用髮纏指。蘸井花水揩拭之。睡時。煨黃丹出火氣。摻舌上。如屑不脫。

可濃煮栗荻汁。綿纏指蘸拭。如無栗荻。栗木皮代之。

撮口。其證舌強脣青。聚口撮面。面目黃赤。喘急聲不出。飲乳有妨。若

口出白沫。四肢冷。不治。其或肚腹青筋。弔腸卵疝。內氣引痛。皆腸胃鬱結不通所致。治宜疎利。過七日乃免。宜散之類

臍風。臍濕。臍瘡。氣臍。凸臍。此皆因斷臍不慎。為風冷水濕所乘。入於

臍。流入心脾。令腹脹臍腫。四肢不收。多啼不乳。甚者發搐。久不瘥。為臍

瘡。入於經脈。多變為癰。若臍凸肚緊。微有青色。口撮不開。肝氣盛而尅

脾土。不可施治。縱使得安。亦非長壽。宜五苓散之類又法。小兒七日內。患臍風

撮口。百無一愈。但看兒齒齦上。有小泡子。如粟米狀。以熟帛裹指。蘸溫

水。輕輕擦破。即安。又灸然谷穴。在內踝前。大骨下陷中。灸三壯。鍼入三

分。不宜見血。顛顛經治臍濕。用枯礬。龍骨為末。入麝少許。拭臍乾用。避

風。絳帛灰。傅妙。蓋破屋爛草。為末。摻之。亦好。氣臍。大如栗。虛腫而軟疼。

用竹瀝塗。日數上消。臍瘡。宜龍骨散。凸臍。因兒有熱在胸。頻頻伸引。厄

呃作聲。努張其氣。抑入根本之中。所以凸起。虛大可畏。不必以藥傅之。

恐反為害。宜白芍藥湯加米仁煎湯空

天釣。亦驚風之類。但發時頭面仰視。翻眼抬睛。故名天釣。宜雙金散

看舌大
法盡此
數語

大拇指兩甲內相半男先灸左女先灸右及兩足
大拇指中間各三五壯又灸前後手心各五壯妙頭目不仰乃驚風之
類。宜辰砂
抱龍丸

遺尿 原病式謂遺尿不禁為冷。內經云。不約為遺溺。仁齋曰。小便者。
乃津液之餘也。腎主水。膀胱為津液之府。腎與膀胱俱虛。而冷氣乘之。
不能拘制。其水出不禁。謂之遺尿。睡裏出者。謂之尿牀。此皆腎與膀胱
俱虛。而挾冷所致。宜雞腸散
外臺方亦有熱結於腎部。干於足厥陰之經。庭孔
鬱結。氣血不能宣通。則痿痺而神無用。故液滲入膀胱而溺遺失。宜六
味丸
舌。齟齬諸病。楫師王紹龍先生云。心為一身君主。神識之舍。外候於
舌。無論外感內傷。皆當察之。其色紅潤而淨者吉。有胎者病。胎薄少。色
鮮明者輕。厚滿。色黑闇者危。色枯燥不澤。圓縮強硬者死。至於傷寒痘
疹。更宜細察。又脾之脈絡絡舌本。心脾有熱。無處疏泄。而發證於舌者。
如弄舌。重舌。木舌。舌白。舌黃。舌瘡。舌血之類。弄舌者。時時微吐其舌。如
火之焰。心脾積熱所致。兼脾證者。宜瀉黃散兼心證宜導赤
散或大黃黃連瀉心湯重舌者。舌
下有形如舌。宜刺出血及服瀉黃散數次木舌者。舌腫漸大。塞滿口。不

治殺人。

宜黃散。

舌白者。舌上有厚白胎也。

宜桑白皮汁敷之。薄荷汁生薑煎擦亦妙。

舌黃者。即

舌上黃胎也。

宜黃散。

舌瘡者。舌上生瘡也。

宜白礬足法。

舌血者。舌上黑有孔出

血不止。心火熾盛故也。

宜蒲黃末敷之。

重齩重齩者。齩上腫也。總不外一

熱。俱宜刺決洗拭。

宜雞內金爲末。乾糝或服五福化毒丹。

鼻衄。

小兒鼻衄者。因肺胃熱盛。迫血妄行。出於上竅。春冬衄者。宜用

生地黃汁。加生蒲黃末少許。砂糖并花水浸服之。秋夏宜用車前草一

握。洗淨。同生薑一處研取汁。入白蜜一匙。先拌查塞鼻。次用新汲水和

蜜并車前薑汁飲之。又生蘿蔔搗汁。仰頭滴入鼻。卽止。次以新汲水和

蜜蘿蔔汁飲之。又宜服膠黃散。

語遲。

應語不語。田語遲。由母受驚怖。內動兒藏。邪乘於心。舌乃心苗。

心氣不和。舌痿無力故也。

宜菖蒲丸或灸心俞三壯。

無辜疳。

巢氏云。古謂天上有鳥。名無辜。晝伏夜遊。小兒衣衲。夜露失

收。鳥從上過。小兒親體。染其毒氣。遂致面黃髮直。壯熱能飲食而不生

肌肉。累積月日而死。故名無辜。漢東王先生非之曰。此由入邪所乘。入

邪者何。謂饑、飽、勞、役、風、驚、暑、積也。若然。是皆有因而成。不得名無辜矣。楫謂夜露陰沉。百邪皆出。狐狸梟鵂之類。何所不有。衣染其氣。小兒氣虛體薄者。理應成病。以其不在八邪之內。無辜而得。故名無辜。非獨因鳥名也。宜肥兒丸布

鶴節 小兒稟賦不足。血氣不榮。肌肉瘦瘁。骨節聳露。如鶴膝之節。乃腎虛不生骨髓耳。宜錢氏地黃丸

哺露 小兒哺乳不節不消。致脾胃衰弱。弱則愈不能消。令肌肉疳羸。骨如柴露。吸吸苦熱。以其得之乳哺。故曰哺露。宜大啓丸

丁奚 小兒脾胃尙弱。若哺食過度不消。水穀之精減少。不榮肌肉。日漸瘦削。其頸項四肢骨立零丁。而腹則獨大如奚囊也。故名丁奚。與哺

露大同小異。其證吐泄不時。色慘潮熱。或黃瘦。顙開顙陷。手足如筒。宜啓脾丸散大

滯頤 俗名口水。流滯於頤下。故名。由脾虛冷液多。不能收攝耳。亦有脾虛挾熱而流者。宜審證施治。宜虛令宜益黃散熱

啼哭 有驚啼、夜啼、軀啼、驚啼者。精神不定。睡臥不安。如驚而啼。屬藏熱。夜啼者。入夜即啼。陰寒相感。屬藏寒。軀啼者。腹中痛甚。張氣促眉。身軀而啼。屬食不消。或有積滯。驚啼宜安神丸。涼膈散。夜啼宜花火膏。蟬花散。茅先生抹脣膏。軀啼宜白朮當歸煎丸之類。

龜胸、龜背 龜胸者。母食五辛。或兒食宿乳。熱熏於肺。肺氣不寧。以致欬逆上氣。壅滿胸中。久則胸亦高腫。如龜之胸也。龜背者。是強兒坐。或坐風中。邪乘於脊。或乘於督脈。不能解散。漸如偃僂。而背高如龜狀也。龜胸者。宜寫白散。外治塗龜尿。亦宜塗龜背者。宜羌活。防風。及龜鹿膠等藥。外亦宜塗龜尿。

解顙、顙陷、顙填 解顙者。小兒數歲。顙不合。而頭顙開也。顙陷者。顙門深陷也。顙填者。顙門腫起也。皆屬腎虛。髓少。骨氣不實。多主夭折。間有藏府有熱。熱上衝而成者。然腎虛固本病耳。宜補中益氣湯。錢氏地黃丸。小兒益氣湯。錢氏地黃丸。麝茸丹之類。行遲 腎主骨。主髓。虛則髓少。骨柔。故行遲耳。宜錢氏地黃丸。齒遲 亦腎虛也。夫齒為骨之餘。藉髓榮養。腎髓虛少。不能充骨。又安能及齒。故久不生也。宜六味地黃丸。

髮遲髮黃。亦少陰腎藏虛耳。腎主藏精。其華在髮。少陰氣血不足。即

髮疎薄不生。亦有因頭瘡而禿落者。宜千金椒葉方榆末散聖惠黑豆膏選用

錢氏曰。小兒長大不行。行則脚弱。齒久不生。生則不固。髮久不生。生則

不黑。皆屬氣血虛也。宜大劑補之。髮黃宜千金翼大豆方

齒牙頰車。齒者骨之餘。其本在腎。而經則屬胃與大腸。病在本者。多

屬虛。在經者。多實火。宜細察形脈兼證治之。宜清胃湯雄黃丸千金白鹽方靈苑生齒方

耳。耳者心腎之竅。肝膽之經也。心腎主內。屬精血不足。肝膽主外。屬

風熱有餘。或聾聵。或鳴響者。稟賦虛也。或脹痛。或膿癢者。邪氣客也。虛者

宜六味地黃丸風熱客者宜柴胡清肝散其他諸證不一宜後方對證選用若諸蟲入耳宜

立驗散

五軟。五軟者。頭項軟。手軟。脚軟。肌肉軟。口軟是也。頭軟。頭不舉。項脈

軟而難收。治雖暫差。他年必再發。手軟。則手垂。四肢無力。亦懶抬肩。若

得聲圓。還進飲食。乃慢脾風候也。尙堪醫治。脚軟者。五歲不能行。虛羸

脚細小。不妨榮衛。但服參耆等藥。併錢氏地黃丸。長大自然肌肉充滿。

肌肉軟。則肉少皮寬。自離飲食。不長肌肉。宜錢氏橘連丸。若瀉利頻者。難治。口軟則虛。舌出口。脣青氣喘。則難治。薛氏曰。頭項軟者。天柱骨弱。藏府骨脈皆虛。諸陽氣不足也。手足軟者。脾主四肢。中州不足。不能榮養四肢。故肉少皮寬。而飲食不為肌膚也。口軟者。口為脾竅。上下齟屬。手足陽明。陽明主胃。脾胃氣虛。舌不能藏。而常舒出也。此五者。皆因五藏氣弱。不能滋養充達。原其要。則總歸於胃。以胃為水穀之海。五藏六府之大源。故治必先以脾胃為主。皆宜用補中益氣湯。以滋化源。頭項手足三軟。兼服地黃丸。

五軟 五軟者。仰頭取氣。難以動搖。氣壅作痛。連於胸膈。手足心冷而軟。此陽氣不營於四末也。經曰。脾主四肢。又曰。脾主諸陰。今手足冷而軟者。獨陰無陽也。故難治。若肚筋青急者。木乘土位。急用六君子湯。加炮薑肉桂柴胡升麻。以復其真氣。若係風邪。當參驚風治之。此證從肝脾二藏受患。補脾平肝。

魛病 魛。小鬼也。乳兒未能行。而母復有娠。其兒忽微下利。寒熱往來。

毛髮擊鬚。爲有惡鬼神。導腹中之胎。妬嫉而爲此。故名魃病也。以他兒食其乳。亦能相繼而病。故俗又名繼病。雖然。妊娠乳兒。不必悉致魃。亦偶有此耳。女子氣血上爲乳汁。下爲經水。小兒飲交乳且病。况氣血既榮於胎。而乳汁必自滴薄。兒飲之。能無病乎。鬼神之咎。似無稽也。

客忤 客忤者。是小兒神氣輭弱。忽有非常之物。或未經識見之人。觸之。與兒氣相忤而發病。謂之客忤。亦名中客。又名中人。其狀吐下青黃白色。水穀解離。腹痛。反倒夭矯。而變易五色。狀似癇。但眼不上插耳。其脈弦急數者是也。失時不治。久則難治。若乳母飲酒過度。醉及房勞。喘後乳者。最劇。能殺兒。凡兒衣布綿帛鞋襪中。不得有頭髮。凡小兒中客。急視其口中。懸癰左右。當有青黑腫脈核。如麻豆大。或赤。或白。或青者。便宜用針速刺。或爪摘決之。并以綿纏釵頭。拭去血能愈。宜豆豉大丸聖治客忤方三物燒髮散之類

中惡 小兒中惡者。是卒中鬼邪之氣也。其證先無他病。卒然心腹刺痛。悶亂欲死是也。此必精氣衰弱。而後鬼惡得以中之。若腹大而滿。脈

緊大而浮者死。緊細而微者生。治之餘邪不盡。留滯藏府。更發變為疰病矣。宜先下蘇合香丸未醒以皂角末搐鼻取嚏次服沉香降氣湯又宜慈刺鼻法肘後灸法管吹下部法以上救客忤中惡法及一切卒死皆可參用

卒死 小兒卒死者。是三虛而遇賊風。故無病倉卒而死。三虛者。乘年之衰。逢月之空。失時之和也。詳靈樞人因此三虛復遇賊風。令陰氣偏竭於內。陽氣阻隔於外。榮衛壅閉。陰陽不通。故暴絕而死。若藏府未竭。良久乃甦。亦有挾鬼神氣者。皆須治令邪退乃生。若有餘邪留蓄。再發則成疰病矣。其證眼合。齟齒。遍身綿軟。面青黑。口鼻冷。宜蘇合香丸。冠方治卒魘方。皂角搐鼻法。雞血方。灸人中及心下之類。

鬼持 小兒鬼持者。乃神氣弱。為鬼所持。其狀無他疾。乃痿黃啼喚。口氣常臭是也。宜圖經治鬼持方。外臺師五邪丸之類。

疰病 疰者。注也。亦言住也。謂風邪鬼氣。住人身內。又復注易旁人。無問人之大小。若血氣衰弱。則陰陽失守。風邪鬼氣。因而客之。留住肌膚。連着藏府。或皮膚掣動。遊易不常。或心腹刺痛。或體熱皮腫。沉滯至死。

死後注人。小兒襁褓居室。無因觸冒風邪。多緣乳母解脫之時。不避溫涼暑濕。或抱持出入早晚。其神魂軟弱。為鬼氣所傷故耳。宜太乙備急散尸注。尸注者。是五尸之中。一尸注也。人無問大小。腹內皆有尸蟲。尸蟲為性忌惡。多接引外邪。共為患害。小兒血氣衰弱者。精神亦羸。故尸注因而為病。其狀沉默不的。知病之所在。或寒熱淋漓。涉引歲月。遂至於死。死又注易旁人。故曰尸注也。宜聖惠木香散之類蟲注。蟲注者。人以蛇蟲諸毒。聚於器中。令相噉飲。食盡存一物。最惡最毒。名曰蟲。能隨飲食變化。入腹還生。食人五臟。小兒中者。證與大人無異。其狀心腹多刺痛懊悶。急者即死。緩者延涉歲月。羸困下血。藏爛乃死。死又注易旁人。故為蟲注也。宜苑汪十七味紫參丸。又羊角散。雄黃散。小兒五種蟲毒方。敗鼓皮。

附方

畫眉膏

山梔三個雄黃少許硃砂少許

右為細末。入麻油、輕粉各少許。調勻。候兒睡着。濃抹於兩眉上。醒便不

食乳未效。再用。加黃丹一錢。

金硃飲

本名天竺黃散

治驚壯熱。傷寒伏熱。上焦虛熱。重舌。口鼻生瘡。赤眼。

川鬱金

剉細者如臍狀佳

天竺黃

甘草炙

馬牙硝

各半

硃砂

蟬殼

洗十四個水

麝香

少許

右爲末。每服半錢。至一錢。蜜湯調下。

生地黃湯 治初生兒眼不開。

乾地黃

赤芍藥

川芎

當歸去蘆

瓜蒌根

甘草

各等分

右爲細末。少許。用燈心煎湯調。抹口中。

真金散 治兒初生。洗眼不淨。穢汁浸漬。眼皆赤爛。至長不瘥。母食熱物。

熱藥。名曰胎赤。

黃連去鬚

黃柏

當歸

赤芍藥

錢各一

杏仁

去皮尖半錢

右剉散。乳汁浸一宿。晒乾。爲極細末。用生地黃汁調一字。頻頻點眼。新綿裹荊芥。湯浸溫。時時洗浴。母服洗心湯。

外臺方

乳兩合。葱白一寸。煎一兩沸。去葱喫卽乳。

豆豉膏

黑豆一斗。田螺十九個。葱把一大。

右搗爛。芭蕉汁調。貼臍下。

蘇合香丸

見第八

辰砂殭蠶散。治初生撮口。

辰砂水飛半錢殭蠶真的去絲嘴炒一錢

蛇蛻皮錢炒一

麝香研半錢

右爲極細末。少許。用蜜調。傅脣口。

五苓散

見第十七

龍骨散。治臍中瘡。

龍骨煨 輕粉各半錢 黃連去鬚一錢半

右爲極細末。少許乾摻臍。

白芍藥湯 治冷疝腹痛。及誤汗下。卽壞症傷寒是也。並宜先服。次投對

證之劑。

白芍藥半兩 澤瀉去粗皮七錢半 甘草炙二錢 薄荷 桂去粗皮一錢半

右件咬咀。每服二錢水一盞。煎七分。空心溫服。誤汗誤下。加人參、南木香各二錢。臍下痛。入生薑及鹽同煎。或加鉤藤亦好。

外消散 治兒初生臍突。或痛或不痛。痛則啼不已。及小兒因感濕熱。陰囊浮腫。

大黃 牡蠣各半兩 朴硝二錢

前二味。剉焙爲末。仍入朴硝鉢內同杵勻。用一二錢。先取田螺淨洗。水半碗活過宿。去螺。用水調塗腫處卽消。其螺放生勿害。治陰囊腫。用車前子煎湯。候冷調傅。

雙金散 治天釣驚風。日久不下。

蜈

蜈蚣一個去頭足尾用真酥塗慢火炙黃置砒子上面南立用竹

刀子當脊縫中亭剉作兩半個左邊者入一貼子內寫左字右邊者亦入一貼子內寫右字不得錯誤

麝

香

一錢細研先將左邊者同於乳鉢內研作細末却入在左字貼內收起別用乳鉢將右邊字者入麝香同研極細却入在右字貼內收不得相犯每有病者用此藥法治之

右用細葦筒子取左字貼內藥少許吹在左邊鼻裏右亦如之用藥不可多若眼未全下更添些小以意量度其眼即下

神砂抱龍丸

治小兒驚風痰喘風寒

膽

星四兩

硃

砂五錢

麝

香五分

雄

黃二錢

天竺黃一兩

右為極細末甘草膏和丸硃砂為衣一方加金箔十張

雞腸散

治因膀胱有熱服冷藥過多小便不能禁止或遺尿病

雞

腸

一具男用雌雞女用雄雞燒存性

牡

蠣

茯

苓去皮

桑螵蛸

炒各五錢

桂皮

龍

骨各二錢半

右為極細末仍以雞脍脰一具雞腸一具燒存性研極細末每用和前

藥末一錢。用溫酒調化。食前服。

外臺方 療小兒睡中遺尿。不自覺。

桂末、雄雞肝等分搗丸。一豆大。溫水下。日三服。

六味地黄丸見第十六

瀉黃散見第十四

導赤散見第十七

大黃黃連瀉心湯見第十五

清液散 治小兒重舌及口瘡。

青黛 朴硝各一錢 龍腦一字

右爲細末。用蜜調。鵝翎蘸少許傅之。

五福化毒丹 治積熱驚惕。狂譫。煩渴。頰赤咽乾。脣口生瘡。夜臥不寧。頭

面遍身瘡癤。及小兒驚風痰熱。潮搐等證。如大人口臭。及小兒瘡疹。上

攻口齒。涎血臭氣。用生地自然汁化一丸。以雞翎刷口內。熱疳黃瘦雀

目者。陳粟米泔下。食後臨臥服。

玄參 桔梗各二兩 人參 牙硝

青黛各一兩 甘草五錢 麝香一分

蜜丸。芡實大。金銀箔各四十片為衣。每一丸作四服。薄荷湯下。

膠黃散 治小兒大紐口鼻耳出血不止。十五六歲兒陽盛多此病。

阿膠一兩 蒲黃半兩

右為末。三歲半錢。生地黄汁微煎。調服。食前。

菖蒲丸 治小兒心氣不足。五六歲不能言。

石菖蒲二錢 人參切去蘆半兩 丹參二錢 天門冬去心

麥門冬各一兩 赤石脂三錢

直指有當歸、川芎、硃砂。

右為細末。煉蜜丸如菉豆大。或麻子大。溫水下。五七丸。至一二十丸。不

拘時。日三服。久服取效。又有病後腎虛不語者。宜兼服錢氏地黄丸。

肥兒丸 治小兒腦後項邊有物如彈子。按之轉動。軟而不痛。名無辜疳。

久服神效。

胡黃連 神麴炒 麥 藥錢各五 檳榔三錢

木香二錢 肉豆蔻煨裏 使君子錢各二

右爲細末。蒸餅丸如黍米大。用米飲。食遠服。

布袋丸 治諸疳疾。面黃腹大。飲食不調。肌肉枯瘁。

夜明砂揀淨陶 蕪荑炒去皮 白茯苓去皮 白朮無油者

人參去蘆 甘草 蘆薈細末各 使君子肥白者微炒

右爲末。湯浸蒸餅和丸。如彈子大。每服一丸。以生絹袋盛之。次用精猪

肉二兩。同藥一處煮。候肉熟爛。提取藥於當風處懸掛。將所煮肉并汁。

令小兒食。所懸之藥。第二日仍依前法煮食。只待藥盡爲度。

錢氏地黃丸 治頭顱不合體瘦。骨露如鶴膝。皆腎虛也。并治腎疳天柱

傾倒。腎主骨故。

熟地黃洗焙 澤瀉洗去 牡丹皮去心 白茯苓錢各三

山茱萸肉 牛膝 鹿茸酥炙 山藥錢各四

右爲末。煉蜜丸如梧子大。三歲已下三二丸。溫水空心化下。

神曰脾 色黃合 肌肉納 飲食腹 乃其府 蟲是方 以四君 補脾運 土治其 本藥使 蘆砂殺 蛔清熱 治其標 食肉不 食藥者 收藥味 於肉并 肉并味

從類而歸脾若脾疳面黃腹大飲食不調肌肉枯痺每見蛔者服之自效恐諸疳則未必也

大啓脾丸即資生丸見第五十一

參苓白朮散見第四

益黃散又名補脾散

治脾胃虛寒。泄瀉嘔吐。腹痛。口鼻氣冷。有熱證。不可服。

陳橘皮 一兩

青橘皮

訶子肉

甘草各半兩剉炒

丁香 二錢

白茯苓 一兩

右爲細末。每服二錢。水一盞。煎至六分。食前溫服。

瀉黃散見第四

安神丸見第九

涼膈散 治小兒藏府積熱。煩躁多渴。頭昏。脣焦咽燥。舌腫喉閉。目赤鼻

衄。頰頰結硬。口舌生瘡。痰實不利。涕唾稠粘。睡臥不寧。譫語狂妄。腸胃

燥結。便溺赤澀。一切風腫。並宜服之。方見第九

花火膏 取燈花一顆。塗乳上。令兒吮之。

蟬花散 治小兒夜啼不止。狀若鬼祟。用蟬蛻下半截爲末。一字。薄荷湯

入酒少許調下。或者不信。將上半截爲末。煎湯調下。即復啼也。古人立

方。莫知其妙。

茅先生抹脣膏 主小兒夜啼。內有驚熱。

蟬
殼去一個足
燈
花雨朵
硃
砂少許

右爲末。如小兒夜啼。遇夜用雞冠血調藥。抹兒上下兩脣。卽止。夾硃砂膏與服。

白朮當歸煎丸。治胎寒腹痛。遇夜啼叫。身體軀張。有如癰狀。吐乳不止。大便酸臭。乳食雖多。不生肌膚。

白朮 當歸 木香

右等分。爲細末。煉蜜爲丸。如桐子大。每服一丸。煎木香湯化下。

瀉白散見第四十九

塗龜尿法 取龜置荷葉上。鏡照之。則自尿。一法以髮搐其鼻。亦自出。

補中益氣湯 見第三十九

小兒錮頤藥

白芍藥粉

服 緇陽

楫曰晝
 則蟬鳴
 曉則雞
 鳴息聲
 於夜冠
 則最高
 殼則最
 表出邪
 於陽正
 南靈石
 定驚安
 神草火
 焚餘清
 心散熱

肝經藏血二脈。會於頤。頂二脈。虛亦能。令頤解。白芍藥。益肝斂。而透頂。雄雞冠。助陽高。而聳顛。腎虛不。合者無。效。

右取黃雄雞。臨兒頤上。刺其冠。以血滴頤上。血止。以芍藥末傅上。掩血。令不見。一日立瘥。不愈。再如法傅之。

麝茸丹 治數歲不能行。

麝 香別研

鹿 茸黃酥炙

生乾地黄

虎脰骨酥塗炙黃

當 歸洗焙

黃 耆剉

右件各一兩。為細末。用羊髓四兩煮爛。和成膏。如黍米大。每服十粒。磨沉香湯下。乳食前。日三服。

千金楸葉方 治少小頭不生髮。以楸葉搗取汁。傅頭上立生。

榆末散 治小兒白禿髮不生。搗榆皮末。苦酒調塗。

聖惠神效黑豆膏 治兒腦疳。髮連根作穗。脫落不生。或白禿瘡髮不生者。兼能黑鬚。

黑 豆

巨 勝

訶黎勒皮一兩

右件藥。搗羅末。水拌令勻。內於竹筒中。以亂髮塞口。塘灰內煨。取油貯瓷器中。先以米泔皂莢湯洗頭。拭乾塗之。日再用。十日髮生。

千金翼大豆方 治髮黃。以醋煮大豆爛。去豆煎令稠。塗髮。

清胃湯 治胃火牙痛或連頭面。方見第九

雄黃丸 治小兒牙齒黑蛀。氣臭疼痛。

雄黃二錢 麝香半錢

右爲細末。軟飯和爲挺子。安在牙內。

千金白鹽方 常以白鹽末封齒齦上。日三夜二。

靈苑生齒方

右用雄雌雞糞。各十四顆。焙乾同研如粉。入麝香少許。仍先以針挑破損齒脚下血出。將散子傅之。年高者。不過二十日生。年少者。十日不計傷損。及少自退落。並再生。

柴胡清肝散 治肝膽三焦風熱怒火。或乍寒乍熱。往來寒熱。發熱或頭發瘡毒等證。

柴胡半錢

黃芩炒

人參

川芎各一錢

山梔錢半

連翹

甘草各五分

桔梗八分

右水煎服。

湯氏龍黃散

治小兒聾耳。汁出不止。

枯白礬

龍骨末

黃丹各半兩

麝香一錢

右同研細。先以綿杖子振膿水盡。用散一字半。分爲兩處入耳內。日二次。

立驗散

治蚰蜒及諸蟲入耳。

川芎

白芷

夜明砂炒

猪牙皂角炙

南星

炮各七分

白丁香

藜蘆各四錢

草烏

半兩

砒霜另研

華撥各二錢

海金砂半二錢

右爲細末。研勻。臨時更用鉛丹調色勻。磁器收。如蚰蜒入耳。取少許。以醋一滴調化。以細翎蘸藥入耳竅。微吹。令藥氣行。立出。藥不得多。多則蚰蜒成水不出。如蠍螫。先點少醋在螫處。搽藥半字許。擦令熱即效。

錢氏橘連丸

治疳瘦。久服消食和氣。長肌肉。

橘皮一兩

黃連

米泔浸一宿一兩半

右爲細末。另研入麝香五分。用猪膽七個。分藥入膽內。漿水煮。候臨熟。以針微刺破。以熟爲度。煮粟米粥和丸。如菉豆大。每服十丸。至二三十丸。米飲下。量兒加減無時。

豆豉大丸摩法 用豉數合。水拌溼。搗熟。丸如鷄子大。摩兒顙上足心各五六遍。又遍摩兒心及臍上下。食頃。破視其中。當有細毛。卽擲丸道中。譚氏殊聖治客忤方

驚啼哭不休。壯熱脈如鉤。莫識爲何病。傷心不自由。犀角雄黃搗。桃符煎水稠。參苓芡苡子。三粒化無憂。

張渙辟邪膏 兒血氣未實。神氣軟弱。除父母及乳養人外。勿令見生人。及抱往別房異戶。及見牛馬畜獸等。其父母家人之類。自外夜行歸家。亦勿令見。恐經履鬼神惡氣犯兒。令吐下五色。水穀解離。狀似發癇。但眼不上戴。脈不弦急。名曰客忤。

真降香剉

白膠香

沉香

虎頭骨 微炒

鬼白 去毛

草龍膽

人參

白茯苓

右各半兩。搗羅細末。次入水磨雄黃半兩。細研水飛。次研麝香一錢拌勻。煉蜜和丸。雞頭大。每一粒。煎乳香湯化下。及別丸如彈子大。用綠絹袋盛。佩兒衣上。仍臥內常燒神妙。

竈中黃土方 客忤因而驚忤者。治法用竈中黃土。研二兩。雞子一枚。去殼。二件相和。入少許水調。先以桃柳枝湯浴兒。後將此藥塗五心及頂門上。陳無擇法用竈中黃土。蚯蚓屎等分。如此法塗之。

三物燒髮散 治小兒見生人驚忤啼不止。

即用來人頤上髮十莖。斷兒衣帶少許。合燒灰細末。和乳飲兒愈。

皂莢搐鼻法

見第七十三

沉香降氣湯

即前辟邪膏

葱刺鼻法

右取葱黃心。刺其鼻。男左女右。入七八寸。小兒量度之。若使目中血出佳。扁鵲法同是。

葛氏肘後灸法 以繩圍其死人肘腕。男左女右畢。伸繩從背上大椎度

以下。又從此灸橫行。各半繩。此法三灸各三。即起。又令爪其病人人中。取醒不起者。捲其手灸下文頭。隨年壯。又灸鼻中三壯也。又灸頤下宛。宛中名承漿穴。十壯大效。又灸兩足大指爪甲聚毛中七壯。此華陀法。一云三七壯。又灸臍中百壯也。

管吹下部法 以管吹下部。須數人互吹。氣通則活。

千金牛舐方 治卒死無脈。無他形候。陰陽俱竭故也。

用牽牛臨兒鼻上。二百息。牛舐必差。牛不肯舐。着鹽汁塗面上。牛即肯舐。

熨兩脇法 右炙熨斗。熨兩脇下。備急方云又治尸厥

治鬼魘死方 搗韭汁灌鼻孔中。劇者灌兩耳。張仲景云灌口中

雞冠血方 治小兒不知所病。便死絕方。

右取雄雞冠。臨兒口上。割血滴入口下。即活。

灸法 卒死而四肢不收。屎便者。灸心下一寸。臍上三寸。臍下四寸。各一百壯。兒小者隨年。

禪曰生 陽起死 陰附子 桂心蜀 椒雄黃 丹砂是 也大毒 剗小毒 芫花藜 蘆巴豆

圖經治鬼持方 用虎睛爪。并指骨毛。繫兒臂上。辟惡鬼。外臺深師五邪方 療鬼魅。妄言狂走。恍惚不識人。此爲鬼忤。

丹砂 雄黃各別 龍骨 馬目毒公

鬼箭各五 鬼臼二兩 赤小豆三兩 芫青一枚

桃仁百枚去皮

右搗末。細絹篩。合諸藥拌令勻。後內蠟。和如彈丸。絳囊盛繫臂。男左女右。小兒繫頸。合時勿令婦人雞犬見。服者蜜和圓如桐子大。一服三丸。日三服。忌五辛生血物。

太乙備急散。療卒中惡。客忤。五尸入腹。鬼刺鬼排。及中蠱疰。吐血下血。及心腹卒痛。腹滿。傷寒陰毒病。六七日。

雄黃 芫花 桂心各一 丹砂

蜀椒各一 藜蘆 巴豆各一 附子炮裂去皮

野葛三分

右九味。巴豆別治如脂。餘合治下篩。以巴豆合和。更搗令勻。以銅器密

野葛是也。又藜蘆涌於上。巴豆泄利。於下吐。利。汗。一。得。則。生。所。以。然。者。運。樞。轉。而。三。焦。通。正。氣。內。張。邪。氣。外。散。故。耳。

貯之。勿泄。有急疾。水服一字匕。可加至半錢匕。老小半之。病在頭。當鼻。衄。在膈上吐。在膈下利。在四肢當汗出。神效。聖惠木香散 治小兒尸疰。心腹脹痛。不可忍。

木香

鬼箭羽

桔

梗頭去蘆

當

歸剉微炒

紫蘇莖葉

各半

檳

榔三分

右搗為粗散。每一錢。以水一小盞。入生薑少許。煎五分。去滓。不計時溫服。更量兒大小加減。

范汪方十七物紫參丸

療大人小兒蠱疰。癥瘕積聚。瘦削。大小便不利。

卒忤惡風。臚脹腹滿。淋水轉注。殫門盡戶。延及子孫。醫不能療者。

紫參

人參

半

夏湯洗

藜

蘆

代赭石

桔梗

白

薇

肉從蓉

各一分

石膏

大黃

牡

蠣熬

丹

參各一分

蝦

蟆燒灰

烏

頭炮各分

狼

毒七分

附

子炮五分

巴豆

心皮熬去

右藥搗篩。蜜和爲圓。以飲下如小豆一九。日三服。老小以意減之。蜂螫所螫。塗上神良。忌猪羊肉冷水一方無蝦蟆。有乾薑四分。

羚羊角散 治小兒中蠱。腹內堅如石。面目青黃。小便淋瀝。變易無常。

羚羊角屑

蘘

荷各一兩

梔子仁七枚

赤芍藥

牡丹皮

黃

連

去鬚各一分

犀

角兩半

右搗粗末。羅爲散。每服一錢。以水一小盞。煎至五分。去滓溫服。日三四服。更量兒大小加減與之。

雄黃散 治小兒飛蠱。狀如鬼氣者。宜服。

雄黃

麝

香各細研

犀

角末各兩

右藥都研令勻。每服以溫水調下半錢匕。日四五服。量兒大小加減。小兒五種蠱毒方

右搗馬兜鈴根。羅爲散。每服一錢。水一盞。煎五分。去滓。空腹頓服。當隨吐蠱出。未吐再服。

敗鼓皮方

右用敗鼓皮一片。燒灰。細研爲粉。空心粥飲調服一錢。病人須更呼蟲主姓名便愈。

醫燈續焰

明 錢塘 王紹隆 著

明 錢塘 潘楫碩甫 註

明 錢塘 王佑賢聖翼 評

鄞縣 曹赤電炳章 校

卷十七

奇經八脈脈證第七十九

奇經八脈。其診又別。直上直下。浮則爲督。牢則爲衝。緊則任脈。寸左右彈。陽蹻可決。尺左右彈。陰蹻可別。關左右彈。帶脈當訣。尺外斜上。至寸陰維。尺內斜上。至寸陽維。督脈爲病。脊強癰癩。任脈爲病。七疝瘕堅。衝脈爲病。逆氣裏急。帶主帶下。臍痛精失。陽維寒熱。目眩僵仆。陰維心痛。胸脇刺築。陽蹻爲病。陰緩陽急。陰蹻爲病。陽緩陰急。癰癩瘕瘕。寒熱恍惚。八脈脈證。

各有所屬。

經絡為識病之要奇經十二乃總持八脈至要今人於正經尚自憤憤乎潘予此注按部無不條貫真主司人命者所當共寶也

奇經八脈者。在十二經脈之外。無藏府與之配偶。故曰奇。夫藏府之脈。寸關尺有定位。左寸心。右寸肺。左關脾。右關胃。左尺腎。右尺膀胱。左命門。右三焦。浮中沉有定體。難經以三菽六菽九菽十二菽按之至骨分肺心脾肝腎弦鈞毛石有定形。春弦。夏鉤。秋毛。冬石。腎水。心火。此則另為一脈。形狀固異。而隧道亦殊。病證不同。而診治自別。蓋督任衝三脈。皆起於胞中。一源而三派。督行於背。總督諸陽。任行於腹。總任諸陰。衝則後行於背。前行於腹。上行於頭。下行於足。以至谿谷肌肉。無處不到。誠十二經內外上下之要衝也。故靈樞順逆肥瘦篇曰。衝脈者。五藏六府之海也。五藏六府皆稟焉。二脈直行上下。發源最中。故見於脈。亦皆直上直下也。直上直下者。即三部俱長透之義。若直上下而浮。則氣張揚。陽象也。故屬督。若直上下而緊。則勢斂束。陰象也。故屬任。若直上下而牢。則體堅實。有餘之象也。故屬衝。陽蹻陰蹻者。皆起於足跟。人身之超越矯捷者。亦莫過於足跟。故曰蹻。一則為足太陽之別。循外踝上行。入風池。合於太陽。故名陽蹻。一則為足少陰之別。循內踝上行。至

維持得
力全在
交會處

入脈之
病虛可
補當用

咽喉。交貫衝脈。故名陰蹻。寸以候陽。寸左右彈者。言在寸左右。皆有彈石搏手之勢。是陽蹻脈也。尺以候陰。尺左右彈者。言在尺左右。皆有彈石搏手之勢。是陰蹻脈也。二經之起。以踝之內。外分陰陽者。外踝屬太陽。而內踝屬少陰也。二經之脈。以尺寸分陰陽者。以陽蹻入風池。合太陽至頭。故以寸候之。陰蹻合少陰而不至頭。故以尺候之也。帶脈者。圍身一周。不上不下。如束帶然。故彈搏之脈。唯見於左右中關耳。陽維陰維者。維持一身。陽維維陽。起於諸陽之會。陰維維陰。起於諸陰之交。夫人身經脈繁密。二脈能於陰交陽會處。加一紮縛。舉綱齊目。而陰陽斯得維持之力矣。其見於脈。自尺至寸。皆刺斜而上。陰則自外入內。陽則自內出外。蓋其經亦皆自下而起。陽自外踝。出肩至腦。陰自內踝。入腹至喉。故也。此八經之脈狀。病則見。不病則不見。難經二十八難曰。人脈隆盛。入於八脈。而不環周。故十二經亦不能拘之。不能拘之者。謂十二經不能拘此八脈。在環周之內。然而八脈之元元。已寓於十二經中矣。故平和。不病。則不見也。其脈曰浮。曰牢。曰緊。曰左右彈。曰斜上。雖皆各

藥餌實
宜瀉施
以砭射

醫燈續焰 卷十七 奇經八脈脈證第七十九

四

因其陰陽道路呈象。而脈狀則俱似有邪而實者。本難云。畜則砭射。良有以哉。其病督脈脊強癰癩者。蓋督脈起於少腹以下骨中央。女子入繫庭孔之端。絡陰器。繞纂繞臀。至少陰。與太陽少陰合。入股內。貫脊。屬腎。與太陽起目內眥。上額交巔。上入絡腦。還出別下項。循肩膊內。夾脊。抵腰中。入循膂。絡腎。自目內眥上額下循膂絡腎皆合太陽而並行者也其男子循莖下至纂。與女子等。其少腹直上者。貫臍中央。上貫心入喉。上頤環脣。上繫兩目之下中央。其脈之別名曰長強。俠脊上項。散上頭。下當肩胛。左右別走太陽。入貫臀。二十八難亦曰。督脈者。起於下極之俞。並於脊裏。上至風府。入屬於腦。由是觀之。則督脈與太陽合行者十九。故邪客則脊強。以其貫脊也。督與太陽皆主表。而督為諸陽之總。太陽為諸陽之長。又曰。巨陽風邪從類傷陽。表必先受。故留則為癰癩疾也。癰癩時發時止。或筋脈牽引。或項背反張。雖云風傷督脈。亦太陽主筋故耳。宜羌活勝濕湯丸之任脈為病。七疝瘕堅者。蓋任脈總諸陰之會。其脈起於胞中。循腹裏。為經絡之海。其浮而外者。循腹裏。上行於咽喉。別而絡脣口。難經亦

諸疝之
有風名
者總不
離厥陰
氣耳

婦人衝
任有病
經不調
經不調
者不受
孕能精
心此義
便可廣
嗣人間

云。起於中極之下。以上毛際。循腹裏。上關元。至咽喉。七疝者。在巢氏則曰厥疝、癥疝、寒疝、氣疝、盤疝、肘疝、狼疝。張子和非之。另立七名。曰寒疝、水疝、筋疝、血疝、氣疝、狐疝、癰疝。而諸經所載。如素問四時刺逆從論所云狐疝風、肺風疝、脾風疝、心風疝、腎風疝、肝風疝、骨空論所云衝疝。脈解篇所云癰疝。玉機真藏論所云疝瘕。少腹冤熱而痛。出白。一名曰蠱。靈樞邪氣藏府病形篇所云。小腸病者。小腹痛。腰脊控舉而痛。時窘之後。此亦疝類也。名雖多種。總不能出於七疝之外。蓋七疝之發。必在前陰少腹之間。任脈所經之地。雖屬他經。未有不以任為原者。瘕者。假也。氣聚則堅。氣散則平。亦似疝之時作時止。發則亦在任脈界分。多屬血凝經滯。女子之病也。宜東垣丁香棟實丸三類衝脈為病。逆氣裏急者。衝之與任。皆起胞中。上循背裏。為經絡之海。亦名血海。其浮而外者。亦循腹上行。會於咽喉。別而絡脣口。強半與任脈同。素問骨空論曰。衝脈者。起於氣衝。並足少陰之經。俠臍上行。至胸中而散。二十八難則曰。起於氣衝。並足陽明之經。俠臍上行。至胸中而散。痿論亦曰。衝脈者。經脈之

帶下人所忽疾亦難受孕故越人亦為帶下醫於邯鄲也雖索隱鉤玄而字字皆出醫理

海主滲灌谿谷。與陽明合於宗筋。二論所並。雖有少陰陽明之不同。要知自臍至胸。與陽明則並於前。與少陰則並於後也。故與陽明皆得稱為五藏六府之海。其氣不順。血不和。則胸腹之氣。循經壅逆而裏急矣。宜蘇子降氣湯黑錫丹震靈丹之類帶脈為病。帶下。臍痛。精失者。以帶脈起於季脇。迴身如帶。藏府十二經絡。皆過於此。若飲食不節。勞慾縱傷。致令濕熱下流。邪火內鬱。外或風入胞宮。邪凝臍腹。帶脈不任。與邪俱陷。或赤或白。如涕如膿。或青黃雜色。或濁黑異形。溢漏不時。淋瀝不淨。其兼證。則腰腹痠疼。足膝痿軟。頭目暈眩。經脈參差。甚或寒熱往來。容顏枯瘁。然而發源於衝。任脾胃者多。以衝為血海。任總諸陰。脾胃司水穀故耳。是以骨空論曰。任脈為病。女子帶下。瘕聚。又痿論曰。衝脈與陽明合於宗筋之會。而陽明為之長。皆屬於帶脈。帶脈起於季脇。章門前。則當臍上。故又或為臍痛。靈樞經別篇曰。腎足少陰。當十四椎。出屬帶脈。蓋腎主藏精。帶固腰脊。虛則一不能藏。一不能固。而精有自失者矣。宜金匱桂枝龍威喜丸陽維為病。寒熱目眩。僵仆者。以陽維維絡一身之陽。陽主衛主

管子曰
四維不
張國乃
滅亡人
身陰陽
無維亦
猶是也

氣主表。病則不能維陽。是陽無護持。而衛氣亦因之不固。故在表則生寒熱。其脈氣所發。別於金門。在足太陽外踝下以陽交為郄。足少陽外踝上與手足太陽及蹻脈會於臑俞。肩後太陽與手足少陽會於天髀。缺盆上少陽又會於肩井。足少陽上其在頭也。與足少陽會於陽白。足少陽上於本神。及臨泣。足少陽上眉上少陽。上至正營。足少陽上及腦空。枕骨下少陽下至風池。足少陽後與督脈會於風府。髮際後啞門。督脈後風觀此。則知本脈之維於頭目手足。頸項肩背諸陽。無一不到。其脈不榮。則不能維在頭目無維。則眩。在頸項肩背無維。則僵。在手足無維。則仆矣。宜東垣退熱湯之類陰維為病。心痛。胸腹刺築者。以陰維維絡一身之陰。陰主榮。主裏。不能維陰。則陰無約束。而榮氣因之不和。故在裏則心痛。又榮主血。血合心。故心痛也。其脈氣所發。陰維之郄。名曰築賓。足少陰內踝上與足太陰會於腹哀。足太陰乳下大橫。足太陰陰腹又與足太陰會於府舍。足太陰少腹下期門。足厥陰乳下與任脈會於天突。任脈下廉泉。任脈舌本下觀此。則知本脈之維於胸腹諸陰。亦無一不到。其脈不榮。則不能維。在胸脇失所維。則動築而刺痛矣。宜本事枳實散奇效陽

足之舉
止矯捷
蹻服爲
之也惟
此經有
二脈又
迭爲經
絡亦大
奇矣
先以陰
陽總揭
於前而
後條析
甚得詮

蹻爲病。陰緩陽急。陰蹻爲病。陽緩陰急。及癰癰瘰癧。寒熱恍惚者。蓋二蹻之脈同發一源。難經二十八難曰。陽蹻脈起於跟中。陰蹻脈亦起於跟中。不唯同起於跟。而又同終於目。靈樞脈度篇曰。蹻脈者。少陰之別。起於然骨之下。上內踝之上。直上循陰股入陰。上循胸裏入缺盆。上出人迎之前。入頰。屬目內眥。合於太陽。陽蹻而上行。氣并相還。則爲濡目。濡潤榮。又曰。男子數其陽。女子數其陰。當數者爲經。不當數者爲絡。觀此。則知二蹻之脈。雖以男女分陰陽。而實則迭爲經絡。是一本也。故其爲病。亦不似前六脈。逐經分屬。本文以癰癰瘰癧。寒熱恍惚。總系二經之下。以二經均可病此。證雖云四。而病機可分爲八。陰陽緩急之義。自是顯然。夫人之身。背爲陽。腹爲陰。開爲陽。闔爲陰。外爲陽。內爲陰。熱爲陽。寒爲陰。癰則目閉。俛首。陰急而陽緩也。瘰則目直。僵仆。陽急而陰緩也。大惑論所謂。衛氣不得入於陰。常留於陽。留於陽。則陽氣滿。陽氣滿。則陽蹻盛。不得入於陰。則陰氣虛。故目不瞑。衛氣留於陰。不得行於陽。留於陰。則陰氣盛。陰氣盛。則陰蹻滿。不得入於陽。則陽氣虛。故目閉。脈

入種脈
證洞若
琉璃內
外明徹
自陽慶
以來無
以道破
一字構
思落筆

度篇亦云。蹻之陰脈榮其藏。陽脈榮其府。又云。內溉五藏。外濡腠理。又陰出陽。則交於足太陽。陽入陰。則交於足少陰。雖一為太陽之別。一為少陰之別。而實則隨衛氣相終始者。故衛氣之行留。即可徵二蹻之虛盛。瘕者。挈也。筋脈挈向裏拘。陰急而陽緩也。瘕者。縱也。筋脈縱從外弛。陽急而陰緩也。寒則氣收斂。從裏從陰。陰急而陽緩也。熱則氣散漫。從表從陽。陽急而陰緩也。恍者。目前恍然。若有所見。繆刺論曰。邪客於足陽蹻之脈。令人目痛。從內眥始。且合太陽上行而并濡於目。病屬目而從外。陽蹻之病。陽急而陰緩也。惚者。胸中惛惚。若有所失。脈度篇曰。蹻脈者。少陰之別。起於然骨之後。循陰股入陰。上循胸裏入缺盆。二十八難曰。陰蹻脈者。亦起於跟中。循內踝上行至咽喉。交貫衝脈。病屬胸腹而從內。陰蹻之病。陰急而陽緩也。二脈一為經。一為絡。病在經。則經急絡緩。病在絡。則經緩絡急。總之皆可言經。皆可言絡。但以男女分陰陽之所屬。緩急證病邪之所在。而正文以諸證為二經所共。義良深矣。胃風湯交加散。海藏愈風湯加味。逍遙散。十全大補湯之類。

疑有神助

八脈方

羌活勝濕湯見第六十五

生鐵落飲 治肝木有餘。或大怒諸火上炎。上盛下虛。發為癲狂。神氣不寧。渴煩譫妄。

生鐵四十斤。入火燒赤沸。砧上煅之。有花出如蘭如蛾。紛紛墜地者。是鐵落。用水二斗。煮取一斗。入後藥。

石膏三兩

龍齒研

白茯苓

防風去蘆各一兩半

玄參

秦艽各一兩

右為粗散。入鐵汁中。煮取五升。去滓。入竹瀝一升和勻。溫服二合。無時。日五服。

瀉青丸見第四十九

東垣丁香楝實丸見第六十四

三因散聚湯 治九氣積聚。狀如癥瘕。隨氣上下。發作心腹絞痛。攻刺腰脇。小腹脹。大小便不利。

半夏七次洗 檳榔 當歸各七錢 陳皮去白

杏仁去皮尖 桂心各二兩 茯苓 炙甘草

附子炮去皮臍 川芎 枳殼去穢 厚朴薑製

吳茱萸湯浸各一兩

每服四錢。水一盞。薑三片。煎七分。食前溫服。大便不利。加大黃。

三因化氣湯 治息積。

砂仁 桂心 木香各二錢五分 甘草

茴香炒 丁香皮 青皮 陳皮

乾薑 蓬朮炮各半兩 胡椒 沉香各一錢

右爲細末。每服二錢。薑蘇鹽湯調下。婦人醋湯下。

蘇子降氣湯見第十

黑錫丹見第十

震靈丹紫府元君南嶽魏夫人方出道藏一名紫金丹 治男子真元衰憊。五勞七傷。臍腹冷疼。

肢體酸痛。上盛下虛。頭目眩暈。心神恍惚。血氣衰微。及中風癱瘓。手足

不遂。筋骨拘攣。腰膝沉重。容枯肌瘦。目暗耳聾。口苦舌乾。飲食無味。心腎不足。精滑夢遺。膀胱疝墜。小腹淋瀝。夜多盜汗。久瀉久痢。嘔吐不食。八風五痺。一切沉寒痼冷。服之如神。及治婦人血氣不足。崩漏虛損。帶下。久冷胎藏無子。

禹餘糧火煨醋淬不計遍數手擦得碎為度

紫石英

赤石脂

丁頭代赭石如禹餘糧炮製各四兩

已上四味。並作小塊。入甘鍋內。鹽泥固濟。候乾。用炭十觔。煅通紅。火盡為度。入地埋。出火毒二宿。

滴乳香另研 五靈脂去砂 沒藥去砂石研各二兩

硃砂水飛過一兩

右八味。並為細末。以糯米粉煮糊為丸。如雞豆大。晒乾出光。每一丸。空心溫酒。或冷水任下。常服鎮心神。駐顏色。溫脾胃。理腰臍。除尸疰蠱毒。辟鬼魅邪厲。久服輕身。漸入仙道。忌猪羊血。恐減藥力。婦人醋湯下。孕婦不可服。

金匱桂枝龍骨牡蠣湯 金匱要略云。夫失精家。少腹弦急。陰頭寒。目眩

髮落。脈極虛芤遲。清穀亡血失精。脈得諸芤動微緊。男子失精。女子夢

交。桂枝龍骨牡蠣湯主之。小品云。虛弱浮熱。汗出者。除桂加白微附子各三分。名二加龍骨湯。

桂枝 芍藥 生薑各三 甘草二兩

大棗十二 龍骨 牡蠣各三

右七味。以水七升。煮取三升。分溫三服。

和劑威喜丸 治丈夫元陽虛憊。精氣不固。餘瀝常流。小便濁。夢寐頻泄。

及婦人血海久冷。白帶。白淫。下部常濕。小便如米泔。或無子息。

黃蠟四兩 白茯苓去皮四兩作塊用猪苓二錢半同於磁器內煮二十餘沸出日乾不用猪苓

右以茯苓為末。熔黃蠟搜為丸。如彈子大。空心細嚼。滿口生津。徐徐嚥

服。以小便清為度。忌米醋。尤忌使性氣。只吃糟醋。

東垣柴胡升陽湯 治陽虛下陷發熱。

柴胡 升麻 葛根 獨活

羌活各半 防風二錢 甘草生二錢人參

白芍藥各半兩

右咬咀。每服半兩。水三大盞。煎一盞。去滓。稍熱服。忌冷物冰水月餘。

東垣退熱湯 治表中虛熱。或遇夜則甚。

黃耆一錢

柴胡七分

生甘草

黃連酒製

黃芩

芍藥

地骨皮

生地黄

蒼朮各五分

當歸身

升麻各三分

右咬咀。作一服。水二盞。煎一盞。去滓。食遠溫服。

本事枳實散 治男子兩脇疼痛。

枳實一兩

白芍藥炒

雀腦芎

人參各半兩

右細末。薑棗湯調二錢。酒亦得。食前日三服。

奇效拈痛丸 治九種心痛。

五靈脂

蓬莪朮煨

木香

當歸各等分

右爲末。煉蜜和丸。如桐子大。每服二十丸。食前用橘皮煎湯下。

四七湯見第七

胃風湯

白芷二錢

升麻二錢

葛根

蒼朮

蔓荊子

當歸身錢各一

甘草

柴胡

藁本

羌活

黃蘗

草豆蔻

麻黃

各五分

水二鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。溫服。

交加散 治瘰癧。或顫振。或產後不省人事。口吐痰涎。

當歸

荊芥

右爲細末。每服二錢。水一盞。酒少許。煎七分。灌下神效。

海藏愈風丹一名舉卿古拜散

治一切失血。筋脈緊急。產後及汗後搐搦。

荊芥

末爲細

先以炒大豆黃卷。以酒沃之。去黃卷。取清汁。調前末三五錢。和滓服之。

輕者一服。重者二服。三服卽止。氣虛者忌服。童便調亦得。

加味逍遙散

見第五十一

十全大補湯見第六

反關脈第八十

平人無脈。移於外絡。兄位弟乘。陽谿列缺。

此種脈須詳審勿認爲脈脫而驚訝也
平人無脈者。非無脈也。謂寸口脈不應指。而反從尺傍過肺之列缺。大腸之陽谿。刺斜出於外絡。其三部定位。九候淺深。俱與平常應見於寸口者無異。若兄固有之位。弟竊而乘之。此反常異衆之脈。千百中僅一見也。

真藏脈第八十一

病脈既明。吉凶當別。經脈之外。又有真脈。肝絕之脈。循刀責責。心絕之脈。轉豆躁疾。脾則雀啄。如屋之漏。如水之流。如盂之覆。肺絕如毛。無根蕭索。麻子動搖。浮波之合。腎脈將絕。至如省客。來如彈石。去如解索。命脈將絕。蝦遊魚翔。至如湧泉。絕在膀胱。真脈既形。胃氣已無。參察色證。斷之以臆。

以平脈形病反使自明非善於詮解者不能也切解最明

已上正文之論脈。首先源派。次及流行。次則左右男女定位。次則五藏陰陽合時。寒熱則屬之遲數。內外則別之浮沉。以至虛實異形。正邪各狀。因脈知病。因病識脈。病則該於瘡瘍女幼。脈則窮於奇經反關。可謂明且詳矣。然而諸脈之外。更有所謂真脈者。大關生死。故又審別於卷末焉。夫人稟五行而生。則五行原吾身之固有。外與天地通。內與穀神合。是得以默運潛行而不顯然彰露。設五藏之元真敗絕。穀神不將。則五行之死形。各隨藏而見矣。在肝如循刀責責。按之勁弦急所謂輕虛而滑。端直以長者。無有也。在心如轉豆躁疾。前曲後居所謂累累如連珠。如循環玕者。無有也。在脾如雀啄粒。堅銳如屋之漏。許久一滿二如水之流。去而返。如杯之覆。止揚。所謂和柔相離。如雞踐地者。無有也。在肺如毛。無根蕭索。上則微茫麻子動搖。微散浮波之合。無根所謂厭厭聶聶。如落榆莢者。無有也。在腎至如省客。省問之客來如彈石。彈搏而盡去如解索。欲藏無入所謂喘喘累累如鈞。按之而堅者。無有也。在命門右腎與左腎同。但內涵相火。故其絕也。如蝦之游。如魚之翔。忽爾靜

中一躍。火欲絕而忽焰之象也。在膀胱。至如湧泉。不反收以其藏津液而為州都之官。故絕形如此。蓋脈之和柔得體者。胃氣與之俱耳。胃氣者。即生生水穀之氣也。胃氣微少。亦成病。何況於無。無則生生之根本先絕。而五藏欲自持久。不可得矣。若能再察色證而以臆斷之。理當不爽。

醫燈續焰

明 錢塘 王 紹 隆 著

明 錢塘 潘 楫 碩 甫 註

明 錢塘 王 佑 賢 聖 翼 評

鄞縣 曹 赤 電 炳 章 校

卷十八 補遺

入。正文病類多矣。考之方書。尙缺多種。皆屬常見之疾。何可竟無方治。今補

嘈雜

嘈雜一證。有火。有痰。有飲。有蟲。雖云多種。而源則不離乎脾胃。膏粱之人。每多患此。其發也。如饑之欲食。甚則煩沸雜亂。與吞酸吐酸乾嘔胃痛等

疾。皆為噎膈反胃之漸。宜三聖丸越鞠丸之類挾痰者二陳加枳連飲者丹溪導飲丸挾蟲者烏梅圓酒煮黃連丸之類

附方

三聖丸 治嘈雜神效。

白朮四兩 橘紅一兩 黃連炒五錢

右為細末。神麴糊丸。如菉豆大。每服七八十丸。食遠津唾下。用薑湯亦待。

越鞠丸見第四十一

二陳湯見第十六

丹溪導飲丸 治水飲嘈雜。

吳茱萸三錢 白茯苓一兩 黃連五錢 蒼朮炒一兩

獨活七錢

石為細末。神麴糊丸服。

烏梅圓見第六十三

酒煮黃連丸見第五十五

吞酸吐酸

吞酸與吐酸。大同小異。吞酸酸在胸胃。忽作忽止。蜇胃刺心。吐酸酸水酸物。隨吐而出。味如醃醋。蜇喉輒齒。是皆形寒胃冷。食鬱飲停。穀氣不分。中焦鬱。正猶釀酒不發。過時而成酸味也。吞吐之所以異者。吞則胃中飲少。吐則胃中飲多耳。間有屬火者。乃熱不得散。屬木者。乃氣不得伸。火不散者。發之。木不伸者。達之。故統宜溫中散寒。令鬱滯開而病自愈矣。宜發

方甚妙

香安胃散加減二陳湯三因齋求丸二陳加茱連神麴蒼朮方酒黃連丸

附方

藿香安胃散見第十

加減二陳湯 治痰飲為患。嘔吐。頭眩。心悸。或因食生冷。脾胃不和。吞酸吐酸等證。

丁香 一兩 半夏 陳皮各五 茯苓 三兩
甘草 半兩

右噎咀。每服四錢。水煎。入生薑三片煎服。

三因麴朮丸 治中脘宿食留飲。酸蜇心痛。口吐清水。

神 麴炒三 蒼 朮日乾三宿洗淨

右爲末。生薑汁別煮神麴糊爲丸。薑湯送下。

二陳加萊連神麴蒼朮方

陳 皮一錢 白茯苓一錢 蒼 朮炒一分 黃 連吳茱萸汁

神 麴錢炒一

水二鍾。生薑一片。煎八分服。

酒煮黃連丸見第五

噎膈

噎者。食入不利。或捱塞而下。或負痛而納。其病在喉。膈者。食雖入膈。或氣逆。或滿悶。或隱痛。或得噯少寬。或得吐反快。其病在膈。二疾多並見。噎者必膈。膈者必噎也。卽翻胃之先驅。積鬱沉憂。氣結不散。久久成此。張雞峰

方論曰。此病不在外。不在內。不屬冷。不屬熱。不是實。不是虛。所以藥難取效。多緣憂思恚怒。動氣傷神。氣積於內。動則諸證見。氣靜疾平。手捫之而不得疾之所在。目視之而不知色之所因。耳聽之而不知音之所發。故鍼灸藥石。皆不獲效。乃神意間病也。旨哉言乎。宜生薑半夏湯香砂寬中湯旨補氣。運脾湯代抵當丸之類。選用。

附方

生薑半夏湯 止嘔吐。開胃消食。

半夏 生薑各三錢

右咬咀。水二盞。煎七分服。

統旨香砂寬中湯 治氣滯。胸痞噎塞。或胃寒作痛。

木香臨服時磨水入藥三四匙 白朮炒 陳皮

香附各一錢五分 白豆蔻去殼 砂仁去殼 青皮

檳榔 半夏麵 白茯苓各一錢 厚朴薑製一分

甘草三分

水二鍾。薑三片。煎八分。入蜜一匙。食前服。

和劑五膈寬中散。治七情四氣。傷於脾胃。以致陰陽不和。胸膈痞滿。停痰氣逆。遂成五膈。并治一切冷氣。

白豆蔻

去皮二兩

甘草

五兩

木

香

厚

朴

去皮薑汁炒一斤

縮砂仁

去殼

丁香

青

皮

陳

皮

去白各四兩

香附子

炒去毛十六兩

右爲細末。每服二錢。薑三片。鹽少許。不拘時。沸湯點服。

和劑穀神嘉禾散。治脾胃不和。胸膈痞悶。氣逆生痰。不進飲食。或五噎五膈。

白茯苓

去皮

縮砂仁

去皮

薏苡仁

炒

枇杷葉

去毛薑汁炙香

人參

去蘆各一兩

白朮

炒二兩

桑白皮

炒

檳榔

炒

白豆蔻

炒去皮

青皮

去白

穀

藥炒

五味子

半兩各

沉香

杜仲

去皮薑汁炙

石

斛

丁香

香

藿香

隨風子

石

斛

半

夏

薑汁搗和作餅炙黃色

大腹子炒

木

香各半

甘

草酸二

陳皮去白

神麴炒各二錢半

每服三錢。水一盞。薑三片。棗二枚。煎七分。不拘時溫服。五噎。入乾柿一枚。膈氣吐逆。入薤白三寸。棗五枚。

統旨補氣運脾湯 治中氣不運。噎塞。

人參二錢

白

朮三錢

橘

紅

茯苓各一錢

黃耆一錢蜜炙

砂

仁去皮

甘

草炙四分

有痰加半夏麴一錢。

水二鍾。薑一片。棗一枚。煎八分。食遠服。

代抵當丸 治瘀血噎膈。食下疼痛。方見第

自汗

自汗者。不因勞動。不因天暑。不因熱飲食。時時汗自出。故曰自汗也。乃衛氣虛而不能固密。心液因之漏泄。宜當歸補血湯倍黃耆玉屏風若表中

風邪者。亦能令衛腠空疎。而汗時自出。此邪去則汗止。宜桂枝湯

附方

當歸補血湯見第六

得效玉屏風散 治自汗。

防風 黃耆各一兩 白朮二兩

每服三錢。水二盞。薑三片。煎六分。不拘時溫服。

保元湯 治自汗無休止。

黃耆三錢 人參二錢 甘草一錢

水二盞。煎七分。溫服。

黃耆建中湯見第三

桂枝湯見第九

盜汗

盜汗者。睡中偷出。多發於夜。如盜之乘人不覺而夜出也。屬陰虛。蓋人之

衛氣。晝行於陽。出外。夜行於陰。入內。入內則內熱。內熱則不足之陰受其蒸。入內則表虛。表虛則蒸泄之液無從固。於是陰失其守。陽失其衛。而汗淋漓於睡夢間者有矣。宜當歸六黃湯大建中湯之類

附方

當歸六黃湯 治盜汗久不愈。面白黃。肌瘦。或夜熱骨蒸。飲食減少。四肢無力。足膝酸疼。發無虛夜。服此神效。

當歸

生地黃

熟地黃

黃藥

黃芩

黃連

黃耆

右作一服。水二鍾。煎一鍾。臨臥服。

大建中湯 治虛熱盜汗。百節酸疼。肢體倦怠。日漸羸弱。口苦舌澀。心怔短氣。

綿黃耆

遠志

去心

當歸

酒洗

澤瀉

各二錢

白芍藥

龍骨

煨

人參

各一錢

炙甘草

右作一服。水二鍾。薑五片。煎一鍾。食前服。氣弱加炮附子二錢。腰痛筋

急。加官桂去皮一錢。

悸怔忡

準繩云。悸卽怔忡。今歷觀病狀。則二證少有分別。悸則心中微動。如恐如驚。怔忡則心胸振築。莫知其來。忽爾寧寂。莫知其去。甚則頭目眩暈。神氣若浮。蓋悸之重者也。大抵因痰積飲停。氣衝火擊所致。宜導痰湯溫膽湯類之。亦有中氣虛而忡悸者。宜補中益氣湯四君子湯六君子湯亦有中氣虛而忡悸者。宜小建中湯黃耆建中湯之類亦有中氣虛而忡悸者。宜四物湯朱丹丸當歸補血湯經驗定心丹之類亦有中氣虛而忡悸者。宜炙甘草湯耗汗多亡陽。脈代而忡悸者。宜炙甘草湯

附方

導痰湯見第四十一

溫膽湯見第二十

茯苓甘草湯 治心下停水忡悸。

白茯苓去皮

桂枝各三錢

生

薑半兩

甘草二錢

水二鍾。煎一鍾。不拘時服。

薑朮湯 治停飲怔忡。

白薑生

白朮

茯苓

半夏麴各一

辣桂

甘草各五

水一鍾。薑三片。紅棗一枚。煎六分。不拘時服。

補中益氣湯見第二

四君子湯見第六

六君子湯見第六

小建中湯見第六

黃耆建中湯見第三

四物湯見第二

朱雀丸見第五

當歸補血湯見第六

經驗定心丹輯自製

茯神去皮木一兩 遠志酒浸軟去心五錢

人參去蘆八錢

沉香黑重沉水者三錢不見火

龍骨煨七錢

懷生地洗去土一兩半

當歸身酒洗一兩

白芍藥酒炒八錢

丹參去蘆一兩

桂枝去骨三錢

甘草炙二錢

荷蕊出水而未開者焙乾一個

為極細末。煉蜜為丸。如菉豆大。用上好水飛過。硃砂為衣。每服二錢。食

遠白湯下。午後勿服。此方驗過多人矣。

炙甘草湯見第三十三

健忘

道過之言。行過之事。久不記憶曰忘。若當下即不能記。索之胸臆。了不可得者。健忘也。乃心虛腎憊。水火不交。精血之府空。榮衛之道澀。致令機關不利。靈巧不開。高年衰朽者。多得之。宜歸脾湯讀心散。朱雀類亦有痰血癖積。礙其機關而成者。此又不以年高論也。宜抵當丸。導痰湯。

附方

歸脾湯見第五十八

讀書丸

石菖蒲

兔絲子酒煮

遠志

酒浸去心各一兩

地骨皮淨去骨洗二兩生地黄

五味子

川芎

各一兩

右爲末。薄糊丸。桐子大。每服七八十丸。臨臥白湯下。

朱雀丸見第五十一

二參丸 治健忘。養神定志。和血安神。外華腠理。

天門冬去皮

熟地黄酒蒸

丹參

各一兩

白茯苓

去皮

麥門冬去心

甘草各一兩

遠志

酒浸去心

人參

去蘆各半兩

右爲細末。煉蜜和丸。如桐子大。以硃砂研極細。水飛過半兩。爲衣。每服

五十丸。加至百丸。空心煎愈。風湯送下。愈風湯係潔古方。其方三十三

只以白湯送之

開心散 治好忘。

石菖蒲一兩

白茯苓去皮二兩

遠志

去皮

人參

去蘆各二錢半

右爲細末。每服一錢。食後米飲調下。

壽星丸 治痰滯經絡多忘。方見第八

導痰湯見第四十一

代抵當丸 治瘀血喜忘。方見第二十

不寐

難經四十六難曰。老人寤而不寐。少壯寐而不寤者。何也。然經言少壯者。血氣盛。肌肉滑。氣道通。榮衛之行。不失其常。故晝日精。夜不寤。老人血氣衰。肌肉不滑。榮衛之道澀。故晝日不能精。夜不寐也。故知老人不得寐也。宜八珍湯歸脾湯之類。虛勞虛煩不得眠者。宜仲景酸膽虛驚悸不寐者。宜溫膽湯。類之痰飲停中。煩惑不合目者。宜內經半夏湯。

八珍湯見第十六

歸脾湯見第五十八

仲景酸棗仁湯 治虛勞虛煩不得眠。

半夏轉
樞見之
內經信
不誣矣

酸棗仁二升 甘草一兩 知母 茯苓

芎 藭各有生薑二兩

右五味。以水八升。煮酸棗仁得六升。內諸藥。煮三升。分溫三服。

溫膽湯見第二十

六君子湯見第十六

內經半夏湯 治陰陽之氣偏勝。不相和諧。陽不得入陰。故不暝不寐。服

此陰陽通。臥可立至。黃帝所謂決瀆壅塞。經絡大通。陰陽和得者也。亦

治痰氣阻塞。陽不入陰。成上證。大抵轉動樞機。則陰陽自諧矣。其湯方。

以流水千里以外者八升。揚之萬遍。取其清五升。煮之。炊以葦薪火。沸。

置秫米一升。秫米北人謂之釀酒製半夏五合。徐炊。令竭為一升半。去其滓。

飲汁一小杯。日三。稍益。以知為度。故其病新發者。覆杯則臥。汗出則已。

久者。三飲而已也。

導痰湯見第十四

呃

呃。即噦也。有火。有痰。飲有寒。有蟲有食。有胃虛。有腎虛。種種不同。但虛寒者十九。然必細察得之久暴。聲之遠近。形之盛衰。及病之所由起。則施治自多效也。蓋潛行默運。無聲無臭者。中氣之常也。若有所激。氣即為火。易其常性。卒暴上衝。仍欲其潛行默運。無臭無聲。安可得乎。至若痰飲停中。礙其清道。陰寒迫裏。遏其陽升。或蛔卒動。而氣阻。或食暴入。而氣壅。或胃氣虛於上。而氣不舒。或腎氣虛於下。而氣不續。皆能撓挫運機。行不順利。而呃呃之聲。有自來矣。故因於火者。其聲頻以促。兼面赤而脈數。宜二陳而梔黃連之類。因於痰飲者。其聲緩勻。兼吞酸面澤而脈滑。宜二陳湯之類。因於陰寒者。其聲短而聲扼扼不揚。兼面色青白。惡寒而脈緊。宜二陳湯之類。因於蟲者。其聲或作或止。或緩或促。兼面色不一。胃中或痛。或吐清水。冷涎。或心中嘈雜。脈遲數大小不定。宜二陳湯之類。因於食者。其聲濁而類嘔。兼噯逆酸腐。惡食。面黃脈緊滑。宜和劑之類。因於食者。其類因胃氣虛寒者。其聲促而無力。或得食少止。面青白。畏寒。脈緩弱無力。宜六君子湯之類。因腎氣虛寒者。其聲遠而長。或作或止。半

刻一聲。臍下或動築。面黑。腰疼。或足冷惡寒。脈沉微。宜參附湯之類

附方

二陳湯見第十六

溫膽湯見第二十

導痰湯見第四十一

和劑枳實半夏湯

枳實麸炒 半夏各等 加麥蘖炒

每服七錢。水二盞。薑五片。煎八分。溫服無時。

麴蘖枳朮丸見第二十

法製陳皮 消食化氣。寬利胸膈。美進飲食。

茴香炒 甘草炙各二兩 青鹽炒一兩 乾生薑

白梅肉各半 白檀香二錢

右六味爲末。外以陳皮半斤。湯浸去白。淨四兩。切作細條子。用水一大盃。煎藥末三兩。同陳皮條子一處。慢火煮。候陳皮極軟。控乾少時。用乾

藥末拌勻。焙乾。每服不拘多少。細嚼。溫薑湯下。無時。

法製檳榔 治酒食過度。胸膈膨滿。口吐清水。一切積聚。

雞心檳榔 作一兩切

砂 取仁

白豆蔻 取仁

丁香 香 切作粉

草 切作塊

陳皮 去白切

生薑 各半斤

鹽 二兩

右用河水二碗。浸一宿。次日用慢火。砂鍋內煮乾。焙乾。入新瓶收。每服一撮。細嚼酒下。或為細末。湯調服亦可。

六君子湯 見第六

四君子湯 見第六

橘皮竹茹湯 治胃虛寒。嘔逆。或呃。

陳皮 二升 竹茹 二升 大棗 三十枚 生薑 半斤

甘草 五兩 人參 一兩

以水一斗。煮取三升。溫服一升。日五服。

理中湯 見第七

潔古柿錢散 治胃虛寒呃逆。

柿錢

丁香

人

參各等分

右爲細末。水煎。食後服。

金匱腎氣丸

見第六

良方參附湯 治陽氣虛寒。自汗惡寒。或手足逆冷。大便自利。或臍腹疼

痛。呃逆不食。或汗多發瘧等證。

人

參一兩

附

子

錢炮五

右薑棗水煎。徐徐服。去人參。加黃耆。名耆附湯。

面

夫手足六陽之脈。皆上至頭。而面爲諸陽之會。胃足陽明之脈。又起於鼻之交頰中。故面獨能耐寒也。設反惡寒。及面寒者。胃寒惡熱。及面熱者。胃熱面寒者。面多青白。面熱者。面多赤。面黃而斑駁者。胃中蟲積。面黃而已。食如饑者。胃疸。面腫者。胃風。面瘡者。胃火。膏粱積熱。以胃脈起於面。故面

病多屬胃。亦有面瘡之屬脾肺風熱。面塵之屬肝膽燥熱。面黧黯之屬風濕痰飲。又不獨一陽明胃也。宜後方選對證者主治之。

附方

升麻胃風湯 治胃風面腫。或麻木。牙緊目瞤。

升麻二錢

白芷

當歸

葛根

蒼朮各一錢

甘草一錢

柴胡

藁本

羌活

黃藥

草豆蔻各三分

麻黃不去節五分

蔓荊子二分

薑一片。棗一枚。水二盞。煎七分。食後服。

升麻順氣湯 治憂思。飲食失節。面色黧黑。心懸氣促。

升麻半錢

乾葛

防風

白芷

黃耆

人參各一錢

白芍藥六分

甘草

蒼朮各五分

水二盞。薑一片。大棗一枚。煎七分。食遠溫服。

犀角升麻湯 治陽明經絡受風熱。口脣頰車髮鬢腫痛。及鼻額間連頭面痛。口不可開。雖能言語。有妨飲食。亦治面熱。

犀角半錢

川升麻半兩

防風

黃芩各半錢

香白芷

白附子

川芎各半錢

羌活三錢

生甘草半錢

右咬咀。都作一服。水五盞。煎至三盞半。去滓。分作三服。一日一服。訖。其證必減。如藏府有些滯不妨。足陽明胃經也。經云。腸胃為市。又云。陽明多血多氣。胃之中。腥羶五味。無所不納。如市廛無所不有也。六經之中。血氣俱多。腐熟飲食之毒。聚於胃。故此方以犀角為主。升麻佐之。入胃經。餘藥皆滌除風熱。用之有效也。

補胃湯 治胃虛脛寒。面目浮腫。亦治面寒。

柏子仁

防風

細辛

桂心

陳皮各一錢

川芎

吳茱萸

人參各半錢

甘草五分

水二鍾。煎七分。食遠溫服。

茯苓桂枝五味子甘草湯加大黃 治欬逆倚息不得臥。面熱如醉。此為

胃熱上衝。熏其面故耳。

七白散 治面黥面垢。

白 薺 白 朮

白牽牛

白附子

白 芷 白芍藥

白殭蠶各等分

為末。每用五錢。煎湯洗之。

洗面藥 治面生黥黷。或生小瘡。或生癰瘰。粉刷。皮膚瘙癢。面垢。

皂 角三斤

升 麻八兩

褚實子五兩

萊 豆

白 芨

白 芷

天花粉各一兩

甘 松

砂 仁

白丁香各五錢

三 奈三錢

右為末。糯米飯搗丸。如彈子大。量用洗面。

面上五色瘡方

用鹽湯綿浸搗瘡上。日五六度。

面上豆痕或斑黥醫方

用密陀僧細末。夜以人乳汁調敷。

面上粉刺方

用不語唾塗之。或搗兔絲子汁塗。或以白礬末少許。酒調塗。是不語唾末

言語先者

斗門方 治黑黥令面色好。

白殭蠶

黑牽牛

北細辛各等分

為粗末。作澡豆。又去小兒胎穢。

指爪破面方

用生薑自然汁。調輕粉敷破處無癢瑕。

又方

橄欖汁敷之。無痕。

平胃散

面瘡。水調平胃散塗之。

白附子散 治面上熱瘡似癬。或生赤黑斑點。

白附子

密陀僧

白茯苓

白芷

定粉等分

右爲末。先用蘿蔔煎湯洗面淨。後用羊乳調。至夜敷患處。次早洗去效。
祛風白芷散 治面上風癬瘡。

白芷三錢

黃連

黃蘗

黃丹各二錢

茯苓五錢

輕粉一錢

右爲細末。用油調搽癬瘡上。或加孩兒茶二錢。麝香二分。亦可。

目

靈極大惑論曰。五藏六府之精氣。皆上注於目而爲之精。精之窠爲眼。者。窠也。聚精成。骨之精爲瞳子。筋之精爲黑眼。血之精爲絡。赤絡小。其窠氣。之精爲白眼。肌肉之精爲約束。裏。上下。約。裏。筋骨血氣之精而與脈并。爲系。以系于目。上屬於腦後。出於項中。又曰。瞳子黑眼法於陰。白眼赤脈。

法於陽。故陰陽合轉而精明也。觀是論。則後人診眼疾而分五輪入廓者。蓋本乎此。其所云氣輪者。金精之騰結也。即經所謂稟氣之精爲白眼。白眼屬肺。肺主氣。故曰氣輪。肺在行爲金。金至堅。故白珠獨堅實。風輪者。木精之騰結也。即經所謂筋之精爲黑眼。黑眼屬肝。肝主筋。在行爲木。而應風。故曰風輪。風性動。故黑精左右不定而色帶青也。血輪者。火精之騰結也。即經所謂血之精爲絡。絡屬心。心主血。故曰血輪。心在行爲火。火有君相二種。故岐分於兩角。無正輪也。肉輪者。土精之騰結也。即經所謂肌肉之精爲約束裏膜。屬脾。脾主肌肉。故曰肉輪。脾在行爲土。土包萬物。該四藏。四藏皆爲裏束。故開則動而萬用。閉則靜而萬寂矣。水輪者。水精之騰結也。即經所謂骨之精爲瞳子。瞳子屬腎。腎主骨。在行爲水。故曰水輪。水爲天一之精。故獨得居中。內有大絡六。以通心、肺、脾、肝、腎、命門。中絡六。以通膽、胃、大小腸、三焦、膀胱。外有小細之絡。莫知其數。其絡向明視之了了。有此皆血貫於腦。下連藏府。通暢血氣。往來以滋於目。故凡病目。則有形色經絡顯見。而可驗內之何藏何府受病。外有二竅。以通其氣。內涵諸液。

出而爲淚。更有神膏、神水、神光、真氣、真精。皆滋目之源液也。神膏者。目內包涵膏液。破則黑稠水出。由膽中滲潤精汁積成。涵養瞳神。衰則有損。神水者。由三焦發源。先天真一之氣所化。在目之內。不可得見。觸物損破。則見黑膏。形如稠痰。在目之外者。即目上潤澤之水也。水衰。則有火勝燥暴之患。水竭。則有目輪大小之疾。耗澀。則有昏眇之危。虧者多。盈者少。神光者。目自視之精華也。心火發源。膽火用事。夫神之於人也。亦大矣。不獨一視爲然。即行走執捉。言笑聽聞。無神宰率。則塊然一形而已。真血者。職藏在肝。升以滋目。指五藏六府經絡之血。非肌腠散漫之血。故曰真也。真氣者。以經絡滋養。必先氣响而後血濡。即發生真一之元氣也。真精者。即先後二天。真元化汁。根於腎。施於膽。以及瞳仁之精也。凡此數者。一有所損。則目病矣。大概目形圓而長。外有堅殼數重。中含清脆。內包神膏。膏外神水。水外皆血。血以滋水。水以滋膏。膏內一點黑瑩。即是腎膽所聚之精華也。唯此一點。空明淨徹。燭照無窮。是曰水輪。然必三者具而後靈明全。三即膽汁、腎精、心神也。五輪足而外應溥。五即氣、風、血、肉、水也。合之渾然。分

之井然。水爲體。火爲用。氣爲運動。神爲維持。妙合陰陽。光同日月。午前小。午後大。隨天地之盈虧。男左勝。女右勝。別陰陽之稟賦。至若剛柔壽夭。詐直智愚。皆能以目驗知。神哉寶乎。更有八廓。其說以八卦八方。內配藏府。分別經絡。似亦有理。前五輪說中。已悉其義。今不更贅。唯錄八廓之名。以備考證。一曰傳送廓。應乾卦。位居西北。絡通大腸而屬肺。二曰津液廓。應坎卦。位居正北。絡通膀胱而屬腎。三曰會陰廓。應艮卦。位居東北。絡通上焦。而配屬命門。四曰清淨廓。應震卦。位居正東。絡通膽而屬肝。五曰養化廓。應巽卦。位居東南。絡通中焦。而配屬肝絡。六曰胞陽廓。應離卦。位居正南。絡通小腸而屬心。七曰水穀廓。應坤卦。位居西南。絡通胃而屬脾。八曰關泉廓。應兌卦。位居正西。絡通下焦。而配屬腎絡。以六配八。餘二無配。重肝絡腎絡配之者。蓋目根源於腎。專竅於肝。故較他藏爲獨勝焉。已上五輪八廓之生成配合也。知此。則知內傷者。內動藏氣。災及五輪。外感者。不從藏變。外邪先襲於絡。由絡及廓。由廓及輪。故內傷見證。不腫不痛。痛亦不甚。或視物漸覺不明。或遇晚卽爲矇眊。俗名雞盲或羞明畏日。或不能

只此數
節能胸
中領略
眼科專
門却功
倍矣

久視遠視。或澀不欲開。或眼胞收小。或倒睫拳毛。或青翳白膜。或白珠黃色。黑睛藍色。或瞳仁散大。或緊小。或欹側。或兩眦脂糊。或弦爛。或淚流。或視物以一爲二。以紅爲白。以正爲斜。以曲爲直。種種由漸而成者。屬內傷。藏也。陰也。外感見證。則發如風火。癢痛不堪。或中如砂石。或外見瘡瘍。或脂淚不時。或星障卒起。或向天日如針刺。或近燈燭如火烘。或兼鼻塞齒疼。或兼身熱頭痛。種種卒暴而來者。屬外感。府也。陽也。是故病府者易愈。病藏者難瘳。藏則視其何藏。何因。府則視其何邪。何絡。而後調之。散之。補之。瀉之。溫涼升降。在圓機者。自爲斟酌也。選方。

附方

簡易補肝散 治肝虛目睛疼。冷淚不止。筋脈痛。及羞明怕日。

夏枯草五錢 香附子一兩

右爲末。每服一錢。臘茶調下。服無時。

本事菊花散 治肝腎風毒氣上衝。眼痛。

甘菊花

牛蒡子八兩

防風三兩

白蒺藜一兩

甘草五錢

右爲細末。每服二錢。熟水調下。食後臨臥。

瀉青丸 治眼暴發赤腫疼痛方見第九

局方湯泡散 治肝經風熱上壅。眼目赤澀。睛疼多淚。

赤芍藥 當歸 黃連各等分

右爲末。每二錢湯頓調熱洗。日三五次。御藥院方。加荊芥。

湯泡散 治肝經風熱攻睛。赤腫羞明。漸生翳膜。

杏仁 防風 黃連去鬚 赤芍藥

當歸尾各半 銅青二錢 薄荷葉三錢

右剉散。每用二錢。極沸湯泡。乘熱先熏後洗。冷則再煖用。日兩三次。一

方入白鹽少許。閉目沃洗。鹽亦散血。

分珠散 治眼患血灌瞳神。惡血不散。

槐花 白芷 地黃 梔子

荊芥 甘草 黃芩 龍膽草

赤芍藥

當

歸

各一兩

右水煎服。春加大黃瀉肝。夏加黃連瀉心。秋加桑白皮瀉肺。

清涼散 冰瑕深翳。

蔓荊子

荊芥

苦竹葉

甘

草

各半兩

梔子

二錢半

右薄荷水煎服。

二黃散 治努肉攀睛。

黃芩

大黃

防風

薄

荷

各等分

右水煎。入蜜少許。食後服。

照水丸 治翳神驗。

海螵蛸

蛤

粉

南康真者各五分

片

腦

半分

黃

蠟

五分

右末。先熔蠟攪微冷。入末和爲丸。如麻子大。帶匾些。臨臥納眼中翳膜

上。次日照水自落。

此方效
通亦得
理

千金磁硃丸 治神水寬大漸散。昏如霧露中行。漸覩空中有黑花。漸覩物成二體。久則光不收。及內障。神水淡綠色。淡白色者。

磁石者吸針

辰砂

神麴

先以磁石置巨火中煨。醋淬七次。晒乾。另研極細。二兩。辰砂另研極細。一兩。生神麴末三兩。與前藥和勻。更以神麴末一兩。水和作餅。煮浮為度。搜入前藥。煉蜜為丸。如梧桐子大。每服十丸。加至三十丸。空心飯湯下。按此方磁石法水入腎硃砂法火入心而神麴專入脾胃乃道家黃婆媒合嬰蛇之理或加沉香半兩升降水火尤佳

煮肝散 治內外障翳眼。

右用猪肝二兩。批開。以夜明砂末二錢匕。摻在肝內。麻繩縛定。用水一盞。煮令肝轉色白。取出爛嚼。用煮肝湯送下。食後服。

洗眼方 治內外障翳膜赤脈昏澀。

右以桑條。於二三月間採嫩者。曝乾。淨器內燒過。令火自滅。成白灰。細研。每用三錢。入磁器。或銀石器中。以沸湯泡。打轉候澄。傾清者入於別器內。更澄。以新綿過。濾極清者。置重湯內令熱。開眼淋洗。逐日一次。但

是諸眼疾皆效。

菊睛丸 治肝腎不足。眼昏。常見黑花。多淚。

枸杞子三兩

菴 蓉酒浸

巴

戟去心各一兩

甘菊花四兩

右爲末。煉蜜爲丸。如梧子大。每服五十丸。溫酒鹽湯食遠任下。余太宰方。加熟地黃二兩。

駐景丸 治肝腎虛。眼昏翳。

熟地黃

車前子各三兩

兔絲子

酒煮五兩

爲末。煉蜜丸。桐子大。每服五十丸。食前白茯苓、石菖蒲湯任下。又方加枸杞子一兩半。尤佳。

枸杞子酒 治肝虛當風眼淚。

右用枸杞子最肥者二升。搗破。內絹袋。置罐中。以酒一斗浸訖。密封勿泄氣。候三七日。每日取飲之。勿醉。

地芝丸 治能遠視。不能近視。亦能治脈風成癰。

生地黃焙

天門冬

去心各四兩

枳

殼炒

甘菊花

去蒂各二兩

右爲細末。煉蜜丸如桐子大。每服一百丸。茶清送下。

定志丸 治能近視。不能遠視。

遠志去苗

菖蒲各二

人參

白茯苓去皮各

爲細末。煉蜜丸。以硃砂爲衣。每服十丸。加至二十丸。食後米飲下。

耳

素問陰陽應象大論曰。腎主耳。在竅爲耳。靈樞脈度篇曰。腎氣通於耳。腎和則耳能聞五音矣。五閱五使篇曰。耳者。腎之官也。金匱真言又曰。南方赤色入通於心。開竅於耳。是耳一也。爲兩藏共開之竅。豈非心腎交通。水火相濟之義乎。若二藏不和。虛實寒熱。皆能上致耳疾。卽經絡之過於耳者。亦皆能作疾。如靈樞經脈篇曰。小腸手太陽之脈入耳中。其病耳聾。三焦手少陽之脈從耳後入耳中。出走耳前。其病耳聾。渾渾惇惇。大腸手陽明之別脈入耳。合宗脈。實則齟齬。口問篇曰。耳中鳴者。宗脈之所聚也。胃中空則宗脈虛。虛則下溜而脈竭。故上虛而鳴。選方四首。

附方

清神散 治風氣壅上。頭目不清。耳常重聽。

殭蠶 菊 花各一 荆芥 羌活

木通 川芎 香附 防風

菖蒲 甘草各二

爲末。每三錢。食後臨臥茶清下。

磁石湯 治腎虛耳聾。面黑。饑不欲食。腰脇背痛。

磁石 五味子 杜仲 白朮

白石英各二 黃耆 白茯苓各一

水煎服。

益腎散 治腎虛耳聾。

磁石 巴戟 沉香 菖蒲

川椒各一

爲末。每二錢。用猪腎一枚。細切。和以葱、鹽并藥。用濕紙十重包裹。煨熟。

空心細嚼。酒下。

犀角飲子 治風熱上壅。耳聾腫痛。膿水流出。

犀角

菖蒲

木通

玄參

赤芍藥

赤小豆

甘菊花各五分

甘草二分

薑煎溫服。

鼻

素問金匱真言曰。西方色白。入通於肺。開竅於鼻。陰陽應象大論曰。肺主鼻。在竅爲鼻。脈度篇曰。肺氣通於鼻。肺和則鼻能知香臭矣。五藏別論曰。五氣入鼻。藏於心肺。心肺有病。而鼻爲不利也。氣厥論曰。膽移熱於腦。則爲辛頰鼻淵。經脈篇曰。胃足陽明之脈。起於鼻之交頰中。其病爲鼽衄。大腸手陽明其病亦爲鼽衄。膀胱足太陽亦爲鼽衄。又曰脾熱者。鼻先赤。選方七首

附方

通氣湯 治鼻塞不聞香臭。

羌活 獨活 蒼朮 防風

升麻 葛根各六分 白芷 甘草

川椒各二分

冬月加麻黃二分。薑棗葱白煎服。

防風散 治鼻淵腦熱滲下濁流不止。

防風五分 黃芩 人參 甘草

川芎 麥門冬各二分

為末。食後沸湯調服。

單南星飲 治風邪入腦。宿冷不消。鼻內結物。壅塞腦氣。遂流濁髓。

南星為細末。每二錢。用棗七枚。甘草少許同煎。食後服三四服。其物自出。涕自收。外貼葶撥餅。

葶撥餅

葶撥 香附 大蒜等分

搗作餅。紗襯炙熱。貼顙門上。用熨斗火熨透。其涕自止。

瓜礬散 治鼻痔肉。化水自下。

瓜 蒂四錢 甘 遂一錢 白 礬枯 螺 殼四錢

草烏尖各五

爲末。真麻油調。丸如鼻孔大。每日一次。以藥入鼻內。令着痔肉上。

芷萸散 治鼻流濁涕。

白 芷一兩 辛 夷五錢 蒼耳仁三錢 薄荷五分

爲末。每二錢。葱茶清調服。

鼻衄不止方

鮮生地搗汁。飲之立止。蘿蔔汁無灰酒和服。陰煉人中白溫湯調服。及單飲童便俱妙。

口脣

金匱真言論曰。中央黃色。入通於脾。開竅於口。五藏生成論曰。脾之合肉

也。其榮脣也。六節藏象論曰。脾胃之華。在脣四白。脈度篇曰。脾氣通於口。脾和則口能知穀味矣。經脈篇曰。大腸手陽明之脈。挾口交人中。其病爲口乾。胃足陽明之脈。挾口交承漿。其病口喎脣診。字通即脣疹足少陽病爲口苦。足太陰終者脣反。衛氣失常篇曰。脣青黃赤白黑。黑者。病在肌肉。選方四首。

附方

瀉白湯 治大腸實熱。便結臍痛。口瘡。

橘皮 竹茹 黃芩 山梔

黃藥各五 芒硝 茯苓各一 生地黄三錢

薑棗煎服。

黃藥散 治繭脣。

黃藥二兩 五倍子 密陀僧各二錢 甘草二分

爲末。水調塗黃藥上。炙乾再塗。藥盡爲度。後將黃藥切作薄片。貼繭脣上。

五福化毒丹見第七十八

冰蘖丸 治口舌生瘡。

黃蘖 薄荷

硼砂各等 冰片減半

爲末。蜜丸彈子大。每噙化一丸。

舌

陰陽應象大論曰。心主舌。在竅爲舌。脈度篇曰。心氣通於舌。心和則舌能知五味矣。夫言出於心。非舌不能發。故云舌者心之苗。其色赤。其形尖而善動。火之象也。經脈篇曰。脾足太陰之脈。連舌本。散舌下。其病舌本強。及舌本痛。腎脈循喉嚨挾舌本。其病口熱舌乾。口問篇曰。少陰脈至則嚙舌。已上目耳鼻口舌爲藏之開竅。固當見五藏之變病。所謂五藏不和。則七竅不通。然而經絡病多。藏氣病少。若識別不真。卽有毫釐千里之謬。唯諦審而治之。則善矣。選四方與第七十八小兒門參看。

附方

薄荷煎 治口舌生瘡。咽喉腫痛。痰涎壅塞。

薄荷半兩 川芎二錢 甘草

砂仁各半

片腦五分

各另爲末和勻。蜜調成膏。任意嚼嚥。

黑參丸 治口舌生瘡。久不愈。

玄參 天門冬 麥門冬 各等

爲末蜜丸。彈子大。每一丸。綿裹嚥化。津液下。

薏苡仁湯 治風熱在脾。脣口瞤動。或結核。

薏苡仁 防己 赤小豆 甘草等分

加生薑煎服。

舌血舌腫舌出方

炒槐花細末。搽之即止。腫脹者。蒲黃末搽之。患熱病多舌出不能入者。冰片搽之愈。

齒

齒者。骨之餘。骨不外露。齒質乃骨而外露。故曰餘。如脣爲肉餘。爪爲筋餘。髮爲血餘。俱內藏者。餘出而外露也。氣則不言餘。以氣呼出可見耳。腎主骨。故齒屬腎。言其本也。胃足陽明之入上齒齦。大腸手陽明之入下齒齦。言其經也。是故本病者多病齒骨。經病者多病齒齦。然有虛實風火蟲蝕之不同。在診之細爲分別。則無不效。選方七首。

附方

清胃湯

見第四十九

香鹽散 治蟲牙及腎虛宣露。一切齒疾。

香

附三兩

青鹽五錢

謝傅笑去散 治牙疼。

乳香

沒藥

雄黃

胡椒

烏藥

兩頭尖

各等分

爲末擦牙。初時甚痛。良久涎出便愈。

白蒺藜散 治風虛牙疼。齒齦搖動。

白蒺藜生搗去刺。篩末擦牙。或煎水入鹽一捻。帶熱時漱。

青白散 治一切牙疼。及漱水洗目尤妙。

青 鹽二兩 白 鹽四兩

用川椒四兩。煎汁拌炒二鹽。爲末擦之。

齒縫出血牙宣

唯以白鹽擦之妙。

齒肉壅出

鮮生地黃汁一碗。牙皂角數挺。火上炙熱。蘸汁。再炙再蘸。盡汁。焙燥末之。傅上立消。

鬚髮

素問五藏生成論曰。腎之合骨也。其榮髮也。上古天真論曰。腎氣實。齒更髮長。是髮爲屬腎。又心主血。髮者血之餘。是髮又屬心。髮生上指象火。用心過度者。髮早白。皆心之驗也。巢氏云。膽之榮在鬚。又靈樞曰。衝任二脈。

不榮於口脣者。故鬚不生焉。是鬚髮雖殊。總不外榮血之爲潤養也。選方五首。

附方

天寶單方

治丈夫婦人。久患頭風眩悶。頭髮乾落。胸中痰壅。每發。卽頭旋眼昏。不覺欲倒者。是其候也。先灸兩風池。各二七壯。并服此酒及散。永瘥。其法春末夏初。收白菊軟苗陰乾。搗末。空腹取一方寸匕。和無灰酒服之。日再服。漸加三方寸匕。若不飲酒者。但和羹粥汁服亦得。秋八月合花收暴乾。切取三大斤。以生絹袋盛。貯三大斗酒中。經七日服之。日三次。常令酒氣相續爲佳。

巨勝丸 治風眩。能返白髮爲黑。

巨勝子

白茯苓

甘菊花等分

煉蜜丸如桐子大。每服三錢。清晨白湯下。

旱蓮膏 黑鬚髮。益腎陰。

旱蓮草。用泉水煮汁熬膏。日服外。卽以膏搽之。

地黃膏 久服烏鬚髮。

生地黃取汁

搗

苦

草

汁

一斤

水

五

大

碗

煎

絞

取

汁

合二汁。緩火煎如膏。以瓶盛之。每日空心溫酒服。半匙。一月鬚髮如漆。

鷄峰雜興方

用何首烏雌雄各半斤。分作四分。一分用當歸汁浸。一分生地黃汁浸。一分旱蓮汁浸。一分人乳浸。三日取出。各暴乾。瓦焙。石臼搗末。蒸棗肉和丸。梧子大。每服四十丸。空心百沸湯下。

附擬補內外因第九六淫方

陰淫 上下厥逆 中外寒慄

附子理中湯

見第七

四逆湯

見第二

陽淫 狂譫煩渴 血泄浸淫

白虎湯見第三

犀角地黃湯 治小腸淋瀝。出血疼痛。及心血妄行。吐血衄血等疾。食後臨臥服。

犀角如無以升麻代之半兩

白芍藥二錢 牡丹皮半兩

生地黃二錢

右剉作一服。水一盞。煎八分。空心服。

風淫 肢廢毛落 熱習癰瘕

寶鑑醉仙散 治癘風遍身麻木。

胡麻子炒

牛蒡子炒

枸杞子

蔓荊子炒各一兩

白蒺藜

苦參

防風

瓜蒌根錢各五

右爲細末。每一兩四錢。入輕粉二錢拌勻。每服一錢。茶清調。晨午各一服。至五七日。於牙縫中出臭涎。令人如醉。或下膿血。病根乃去。仍量病之輕重。人之虛實用。病重者。須先以再造散下之。候元氣將復。再用此藥。忌一切炙煇厚味。止可食淡粥時菜諸蛇。以淡酒蒸熟食之。可以助

藥力。

通天再造散 治大風惡疾。

鬱 金半兩 大黃煨一兩 皂角刺炒黑一兩 白牽牛生六兩半

爲末。每服五錢。日未出面東。無灰酒調下。

雨淫 腹滿腫脹 腸鳴濡瀉

平胃散見第七

五苓散見第七

胃苓湯見第七

晦淫 百合狐惑 熱中藏燥

金匱百合病論曰。百合病者。百脈一宗。悉致其病也。意欲食。復不能食。常默默欲臥。不能臥。欲行不能行。飲食或有美時。或有不用。惡聞食臭。時如寒無寒。如熱無熱。口苦小便赤。諸藥不能治。得藥則劇吐利。如有神靈者。身形如和。其脈微數。每溺時頭痛者。六十日乃愈。若溺時頭不痛。漸然者。四十日愈。若溺快然。但頭眩者。二十日愈。其證或未病而預見。或病四五

日而出。或病二十日。或一月微見者。各隨證治之。

百合知母湯 百合病發汗後者。主此方。

百合七枚 知母三兩切

右先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。別以泉水二升。煎知母。取一升。去滓。後合和煎。取一升。五合。分溫再服。

滑石代赭湯 百合病下後者。主此方。

百合七枚 滑石三兩碎 代赭石如彈丸大一枚碎綿裹

右先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。別以泉水二升。煎滑石。代赭取一升。去滓。後合重煎。取一升。五合。分溫再服。

百合雞子湯 百合病吐後者。主此方。

百合七枚 雞子黃一枚

右先水洗百合。漬一宿。當沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。

內雞子黃攪勻。煎五分溫服。

百合地黃湯 百合病。不經吐下發汗。病形如初者。主此方。

百合七枚 生地黃汁一升

右以水洗百合。浸一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。內地黃汁。煎取一升五合。分溫再服。中病勿更服。大便當如漆。狐惑之為病。狀如傷寒。默默欲眠。目不得閉。臥起不安。蝕於喉。為惑。蝕於陰。為狐。不用飲食。惡聞食臭。其面目乍赤。乍黑。乍白。蝕於上部。則聲喝。作一。更甘草瀉心湯主之。

甘草瀉心湯

甘草四兩 黃芩 人參 乾薑各三

黃連一兩 大棗十二枚 半夏半升

蝕於下部。則咽乾。苦參湯主之。蝕於肛者。雄黃熏之。

雄黃

右一味爲末。筒瓦二片合之。燒向肛熏之。

脈經云。病人或從呼吸。上蝕其咽。或從下焦蝕其肛陰。蝕上爲惑。蝕下爲狐。狐惑病者。猪苓散主之。

病者脈數無熱微煩。默默但欲臥。汗出。初得之三四日。目赤如鳩眼。七八日目四眦黑。若能食者。膿已成也。赤小豆當歸散主之。

赤小豆當歸散

當歸

赤小豆三升浸令芽出曝乾

右二味。杵爲散。漿水服方寸匕。日三服。

金匱甘麥大棗湯 治婦人喜悲傷。欲哭。象如神靈所作。數欠伸。名曰藏躁。

甘草三兩

小麥一升

大棗十枚

右三味。以水六升。煮三升。溫分三服。亦補脾氣。

明淫 恍惚動悸 錯妄失神

金匱桂枝去芍藥加龍骨牡蠣救逆湯 治驚狂不安。陽氣散失。或因灸

熨火邪而陽氣浮越。致成上證。

桂枝三兩 去皮 甘草二兩 炙 生薑三兩 牡蠣五兩 熬

龍骨四兩 大棗十二枚 蜀漆三兩 洗 去腥

右爲末。以水一斗二升。先煮蜀漆減一升。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。

東垣硃砂安神丸見第九

醫燈續焰

明 錢塘 王 紹 隆 著

明 錢塘 潘 楫 碩甫輯

明 錢塘 王佑賢聖翼評

鄞縣 曹赤電炳章校

卷十九 補遺

古有四診。謂望、聞、問、切也。經以神聖工巧配之。正文八十一。第其言非以脈求證。則問證合脈。僅從事於工巧。而望聞之法。十無一二。豈以後學庸劣。皆不足與語神聖之道乎。今彙輯補入。至若觸類引伸。又不止此數條已也。唯同志者屬意焉。

望診

藏府部分

痘科觀
面知身
法本諸
此亦藏
裏府表
義

靈樞五色篇曰。五藏六府。各有部分。能別部分。萬舉萬當。自額而下。闕庭上。屬咽喉之部分也。自闕中循鼻而下。鼻端。屬五藏之部分也。自內眥挾鼻而下。至承漿。屬六府之部分也。自顴而下。頰。屬肩背手之部分也。自牙車以下。頤。屬股膝脛足之部分也。又曰。五藏次於中央。六府挾其兩側。首面上於闕庭。王宮在於下極者是也。


五官

靈樞五閱五使篇曰。鼻者。肺之官也。目者。肝之官也。口脣者。脾之官也。舌者。心之官也。耳者。腎之官也。故肺病者。喘息鼻張。肝病者。眦青。脾病者。脣黃。心病者。舌卷短。顴赤。腎病者。顴與顏黑。

診病新久


素問脈要精微論曰。徵其脈小。色不奪者。新病也。徵其脈不奪。其色奪者。此久病也。徵其脈與五色俱奪者。此久病也。徵其脈與五色俱不奪者。新病也。

面部部圖




五色篇曰。明堂者。鼻也。闕者。眉間也。庭者。顏也。蕃者。頰側也。蔽者。耳門也。其間欲方大。去之十步。皆見於外。如是者。壽必中百歲。明堂骨高以起。平以直。五藏次於中央。六府挾其兩側。首面上於闕庭。王宮在於下極。五藏安於胸中。真色以致。病色不見。明堂潤澤以清。五官惡得無辨乎。

藏府色見面部部圖



庭者。首面也。闕上者。咽喉也。闕中者。肺也。下極者。心也。直下者。肝也。肝左者。膽也。下者。脾也。方上者。胃也。中央者。大腸也。挾大腸者。腎也。當腎者。臍也。面王以上者。小腸也。面王以下者。膀胱子處也。男子色在於面王。為小腹痛。下為卵痛。其圈直為莖痛。在女子為膀胱子處之病。散為痛。搏為聚。

肢節色見面部部圖



顴者。肩也。顴後者。臂也。臂下者。手也。目內眥上者。膺乳也。挾繩而上者。背也。循牙車以下者。股也。中央者。膝也。膝以下者。脛也。當脛以下者。足也。巨分者。股裏也。巨屈者。膝膕也。此五藏六府肢節之部也。

統論色

素問脈要精微論曰。能合色脈。可以萬全。五色者。氣之華也。赤欲如帛裹朱。不欲如赭。白欲如鵝羽。不欲如鹽。青欲如蒼璧之澤。不欲如藍。黃欲如羅裹雄黃。不欲如土黃。黑欲如重漆色。不欲如地蒼。素問五藏生成篇曰。青如翠羽者生。赤如雞冠者生。黃如蟹腹者生。白如豕膏者生。黑如烏羽者生。此五色之見生也。青如草茲者死。黃如枳實者死。黑如炔者死。白如枯骨者死。此五色之見死也。又云。生於心。如以縞裹朱。生於肺。如以縞裹紅。生於肝。如以縞裹紺。生於脾。如以縞裹牝。生於腎。如以縞裹紫。此五藏所生之外榮也。

夫氣由藏發。色隨氣華。如青黃赤白黑者。色也。如帛裹朱。如鵝羽。如蒼璧之澤。如羅裹雄黃。如重漆色。又云。如翠羽。如雞冠。如蟹腹。如豕膏。如烏羽。或有鮮明外露。或有光潤內含者。氣也。氣至而後色彰。故曰欲曰生。若赤如赭。白如鹽。青如藍。黃如土色。黑如地蒼。甚則青如草茲。黃如

鮮澤是有氣枯
槁是無氣故不
單言色而曰氣
色而曰氣

枳實。黑如炁。赤如衄血。白如枯骨。或晦黯不澤。或悴槁不榮。敗色雖呈。氣於何有。故曰不欲。且曰死。由此觀之。則色與氣固不可須臾離也。然而外露者。不如內含。內含則氣藏。外露則氣泄。亦猶脈之弦鈎毛石。欲其微。不欲其甚。下文所云。如以縞裹者。正取五色之微見。方是五藏之外榮。否則過於彰露。與弦鈎毛石之獨見。而無胃氣。名曰真藏者。何以異乎。

面

難經十三難曰。五藏有五色。皆見於面。亦當與寸口尺內相應。假令色青。其脈當弦而急。色赤。其脈浮大而散。色黃。其脈中緩而大。色白。其脈浮澀而短。色黑。其脈沉濡而滑。脈數。尺之皮膚亦數。脈急。尺之皮膚亦急。脈緩。尺之皮膚亦緩。脈濇。尺之皮膚亦濇。脈滑。尺之皮膚亦滑。假令色青。其脈浮澀而短。若大而緩。為相勝。木大為肝脈。得浮澀而短。為木尅土。是謂相勝。浮澀而短。若大而緩。為相勝。木大為肝脈。得浮澀而短。為木尅土。是謂相勝。浮澀而短。若大而緩。為相勝。木大為肝脈。得浮澀而短。為木尅土。是謂相勝。大而散。若小而滑。為相生也。浮大為腎脈。為水生木。是謂相生。大而散。若小而滑。為相生也。浮大為腎脈。為水生木。是謂相生。大而散。若小而滑。為相生也。浮大為腎脈。為水生木。是謂相生。

玉機真藏論曰。凡治病。察其形氣色澤。脈之盛衰。病之新故。乃治之。無後其時。形氣相得。謂之可治。色澤以浮。謂之易已。脈從四時。謂之可治。脈弱以滑。是有胃氣。命曰易治。取之以時。形氣相失。謂之難治。色夭不澤。謂之難治。脈實以堅。謂之益甚。脈逆四時。為不可治。必察四難而明告之。

五藏生成篇曰。色味當五藏。白當肺。辛。赤當心。苦。青當肝。酸。黃當脾。甘。黑當腎。鹹。故白當皮。赤當脈。青當筋。黃當肉。黑當骨。

靈樞五色篇曰。五藏六府之肢節。各有部分。有部分。用陰和陽。用陽和陰。

當明部分。萬舉萬當。和陰陽之盛衰。多益寡。能別左右。是謂大道。男女

易位。故曰陰陽。審察澤夭。謂之良工。左右乃陰陽之道。路而男女從逆不

也。天沉濁為內。浮澤為外。內為藏。外為府。以沉浮別之。黃赤為風。青黑為

痛。白為寒。黃為膏。潤為膿。赤甚者為血。痛甚為癰。寒甚為皮不仁。五色各

見其部。察其浮沉。以知淺深。察其澤夭。以觀成敗。察其散搏。以知遠近。視

色上下。以知病處。浮則病淺。沉則病深。澤則成。夭則敗。亡散解者。新近

積神於心。以知往今。故相氣不微。不知是非。屬意勿去。乃知新故。視色之

註證入
俗亦近
自然

從色觀
向而知
五藏之
侵乘於

神屬意乃知已往色明不麗。沉夭為甚。不明不澤。其病不甚。而明澤不粗顯。來今及新病故疾。色明不麗。沉夭為甚。不明不澤。其病不甚。而明澤不粗顯。雖必甚也。若無沉夭。其色散。駒駒然未有聚。其病散而氣痛。聚未成也。小駒。雖不明澤。病亦不甚。其色散。駒駒然未有聚。其病散而氣痛。聚未成也。小駒。馬也。奔逸不定。言其色散無。腎乘心。心先病。腎為應。色皆如是。而後賊邪。定所氣雖聚。痛未成形也。勝我者五藏皆然。男子色見於面王。為小腹痛。下為卵痛。其圖直為莖。痛高為本。下為首。狐疝瘻陰之屬也。其部位在於面王上。下故色見於彼。末俗以象鼻之大小驗前陰之巨細。有以哉。女子在於面王。為膀胱子處之。病散為痛。搏為聚。方圓左右各如其色形。其隨而下至臍為淫。有潤如膏。狀為暴食不潔。淋濁瘕聚之類。或有因暴食濕熱下流而成。前證者若淫帶。搏則聚而結色。左為左。右為右。其色有邪。聚散而不端。面色所指者也。見。散則聚而結色。左為左。右為右。其色有邪。聚散而不端。面色所指者也。見。於色左右不爽。故隨其色之所色者。青黑赤白黃。皆端滿。有別鄉。別鄉赤。指察聚散而知邪之搏與痛也。色者。青黑赤白黃。皆端滿。有別鄉。別鄉赤。者。其色亦大如榆莢。在面王為不日。有別鄉者。猶言正色時日者。是為無邪。一色也。如赤見於面王。則非其色。上銳。首空上向。下銳。下向。在左右如。部不當見。而見又非其時矣。其色上銳。首空上向。下銳。下向。在左右如。法。上銳。上乘。下銳。下乘。左銳。左乘。右銳。右乘。其法以五色命藏。青為肝。赤為心。白為。肺黃為脾。黑為腎。肝合筋。心合脈。肺合皮。脾合肉。腎合骨也。五藏因五藏知。

氣內又
有機焉
此註理
明辭顯
如指諸
掌

而知五合再察在何部而分
生尅吉凶病固無遁情矣

面上白點腹中蟲積

面青白黃色不常及面上如蟹爪路一黃一白者食積兩顴時赤虛火上
炎

病人面無血色無寒熱脈沉弦者紐也

病人見黃色光澤者爲有胃氣不死乾黃者凶

赤色出兩顴大如拇指病雖小愈必卒死

黑色出於庭大如拇指必不病而卒死

冬月面慘傷寒紫濁時病色白而肥氣虛多痰黑而瘦陰虛火旺

目

五藏之
精華注
於目則
病色亦
見於目

靈樞論疾診尺篇曰目赤色者病在心白在肺青在肝黃在脾黑在腎黃
色不可名者病在胸中

白睛黃淡脾傷泄痢黃而濁兼面如熏濕盛黃疸黃如橘子明者熱多黃

聚沫爲痰隨在皆有

中兼青紫。脈芤。是瘀血。胸中兩脇必有塊。

眼黑而頰赤者。熱痰也。眼胞上下如烟煤者。痰也。眼黑而行走艱難。呻吟者。入骨痰也。其證遍體骨節酸痛。眼黑面帶土色。四肢痿痺。屈伸不便者。風痰也。

目黃大煩。脈大爲病進。目黃心煩。脈和者。爲病將愈。目精暈黃。衄未止。平人見黑氣起口鼻耳目者。凶。

目睛黃酒疸。黃白及面。眼胞上下腫者。穀疸。其人心下必痞脹。明堂眼下青色。多慾。精神勞傷。不爾。卽未睡。

面黃目青。爲傷酒。

面無精光。齒黑者。凶。

瘰癧赤脈貫瞳者。凶。一脈。一歲死。二脈。二歲死。三脈。三歲死。

目間青脈起者。掣痛。乃少陽膽經之滯也瞳子高大者。太陽不足。病人面目俱等者。吉。

面黃目青。面黃目赤。面黃目白。面黃目黑。皆不死。

面赤目白。面青目黑。面黑目白。面赤目青。皆死。

面目有黃色。是有胃氣。為吉。前二節一有胃氣。一無胃氣。

傷寒眼下青色。屬挾陰。挾陰者。俗指房事也。

金匱要略曰。其目正圓者。瘥不治。主筋直屬太陽經。一作絕太陽。又色青為痛。色

黑為勞。色赤為風。色黃者。小便難。色鮮明者。有留飲。鮮明者。俗言水珠。

目睛不了了。鼻中呼不出。吸不入。氣短促而冷者。陰病。目睛了了。鼻中呼

吸出入。能往能來。口鼻息長而皆熱者。陽病也。

鼻

金匱要略曰。病人有氣色見於面部。願聞其說。師曰。鼻頭色微黑者。有水

氣。色黃者。胸上有寒。色白者。亡血也。設微赤。非時者死。

鼻頭色黃。小便必難。上云胸上有寒。寒則水不運。故小便難也。餘處無恙。獨鼻尖青黃者。其

人必為林也。

鼻頭青。腹中痛。苦冷者死。

鼻孔忽仰起者死。

鼻枯槁不澤者死。

鼻冷如冰。連兩頤者多死。

病人鼻頭明。山根亮。目皆黃光。起色。

鼻頭微白者亡血。

血脈

論疾診尺篇曰。診血脈者。多赤多熱。多青多痛。多黑爲久痺。多赤多黑多

青。皆見者。寒熱。血脈即絡脈肌皮嫩薄者視之可見

素問平人氣象論曰。臂多青脈曰脫血。絡中血脫故不紅而多青

毛髮

髮枯生穗。血少火盛。

毛髮不堅。多墮落者。衛氣疎。或有風。眉墮者。風也。

病人頭毛上逆者。凶。血枯不榮如枯草不柔順而勁直小兒疳病多此亦主有蟲

形體

人之大體爲形。形之所充者氣。形勝氣者夭。肥白氣不充氣勝形者壽。修長黑氣實形實氣虛形虛

形盛脈細。少氣不足以息者死。形瘦脈大。胸中多氣者死。

形氣相得者生。參伍不調者死。

肥人多中風。以形厚氣虛。難以周流。而多鬱滯生痰。

痰壅氣塞成火。而多暴厥也。

瘦人陰虛。血液衰少。相火易亢。故多勞嗽。

病人形脫而氣盛者死。正虛則氣盛形體充大而皮膚寬緩者壽。形體充

大而皮膚緊急者夭。

形氣相失。謂之難治。

形盛氣虛。氣盛形虛。形澀而脈滑。形大脈小。形小脈大。形長脈短。形短脈

長。形滑脈澀。肥人脈細小。輕虛如絲。羸人脈躁。俱凶。

血實氣虛則肥。氣實血虛則瘦。肥者能寒不能熱。耐讀瘦者能熱不能寒。

美髯而長至胸。陽明血氣盈。髯少血氣弱。不足則無髯。美髯者。太陽多血。

坐而下一脚者。腰痛也。行遲者。痺也。或表強。或腰脚痛。或麻木風疾。裏實護腹。如懷卵物者。心痛

也。

持脈。病人欠者。無病也。經云陽引而上陰引而下則欠

息搖肩者。心中堅。息引胸中上氣者。欬。息張口短氣者。肺痿吐沫。

形肉已脫。九候雖調者。死。

掌中寒者。腹中寒。掌中熱者。陰不足。虛火盛。

診時病人。叉手捫心。閉目不言。必心虛怔忡。

倉廩不藏者。門戶不要也。水泉不止者。膀胱不藏也。

頭者。精明之府。頭傾視深。精神將奪。
背者。胸中之府。背曲肩隨。府將壞矣。
腰者。腎之府。轉搖不能。腎將憊矣。
膝者。筋之府。屈伸不能。行則僂附。筋將憊矣。
骨者。髓之府。不能久立。行則振掉。骨將憊矣。
眼胞腫十指頭微腫者。必久欬。

死證

爪甲下
肉黑有
瘀血亦

屍臭。舌卷。囊縮。肝絕。口不合。脾絕。肌肉不滑。脣反。胃絕。髮直。齒枯。及遺尿。
腎絕。毛焦。面黑。直視。目瞑不見。陰氣絕。目眦陷。目系傾。汗出如珠。陽絕。病後喘瀉。脾絕。目正圓。手撒。戴眼。太陽絕。吐沫。脾絕。聲如鼾睡。脾絕。面赤。脾絕。面青黑。脣青。脾絕。人中滿。脣反。脾絕。髮與眉衝起。
○爪甲下肉黑。○手掌無紋。臍凸。足跗腫。○面青。但欲伏眠。目視不見。汗出如油。肝絕。八日死。○眉傾者。膽死。○手足爪甲青。或脫落。呼罵不休。筋

有下
能生者

絕。八日死。○肩息直視。心絕。立死。○髮直如麻。不得屈伸。自汗不止。小腸
絕。六日死。○口冷。足腫。腹熱。臙脹。泄利無時不覺。脾絕。五日死。○脊痛腫。
身重不可反覆。胃絕。五日死。○耳乾舌背腫。溺血。大便赤泄。肉絕。九日死。
○口張氣出不返。肺絕。三日死。○泄利無度。大腸絕。○齒枯面黑。目黃。腰
欲折。自汗。腎絕。四日死。○齒黃枯落。骨絕。

五藏絕證

五藏已奪。神明不守。聲嘶。

循衣摸床。譫語。陽明絕。妄語錯亂。及不語失音。熱病猶可生。

脈浮而洪。身汗如油。喘而不休。肺絕。汗膩不休。真氣外散。

陽反獨留。形體如烟熏。直視搖頭。心絕。心為火。藏故陽熱獨存。

脣吻反青。四肢縶縶。汗出。肝絕。腎吻屬脾。而青色屬。

環口鰲黑。柔汗發黃。脾絕。水色。凌土。冷汗。

洩便遺失。狂言目反。直視。腎絕。洩便。不閉。二陰。精敗。絕。目背。腫。人。

陽氣先絕。陰氣後竭者。死時身面必青。後陽先脫陰絕于後故青色存也

陰氣先絕。陽氣後竭者。死時身面手足必赤。陰先脫陽絕于後故赤色存也

見餘陽未即盡故腋溫心熱

水漿不下。形體不仁。乍靜乍亂。胃絕。胃納水穀合肌肉故

六府氣絕。足冷脚縮。五藏氣絕。便利不禁。手足不仁。手太陰氣絕。則皮毛

焦。太陰者肺也。行氣溫於皮毛者也。故氣不榮。則皮毛焦。而津液去。津液

去。則皮節傷。皮上紋皮節傷則皮枯毛折。津液去而皮節平。毛折者則毛先

死。丙日篤。丁日死。火尅金。手少陰氣絕。則脈不通。脈不通。則血不流。血不

流。則色澤去。故面色黑如鰲。此血先死。壬日篤。癸日死。

足太陰氣絕。則脈不榮。其口脣。口脣者。肌肉之本也。

脈不榮。則肌肉不滑澤。肌肉不滑澤。則肉滿。肉滿則脣反。脣反則肉先死。

甲日篤。乙日死。

足少陰氣絕。則骨枯。少陰者。冬脈也。伏行而溫於骨髓。故骨髓不溫。則肉

不着骨。骨肉不相親。則肉濡而却。肉濡而却。故齒長而垢。齒則長垢也。肉退却而

髮無潤澤。無潤澤者。則骨先死。戊日篤。己日死。
足厥陰氣絕。則筋縮引卵與舌。厥陰者。肝也。肝者。筋之合也。筋者。聚於陰
器而絡於舌本。故脈不榮。則筋縮急。筋縮急。則引卵與舌。故舌卷囊縮。此
筋先死。庚日篤。辛日死。
三陰氣俱絕。則目眩轉。目矇。目矇者。為失志。失志則志先死。死即目矇也。
目不見也。脫陰者。目矇。
六陽氣俱絕。則陰與陽相離。陰陽相離。則腠理泄。絕汗乃出。大如貫珠。轉
出不流。旦占夕死。夕占旦死。

詐病

向壁臥。聞師到。不驚起而目盼視。若二言三止。脈之嚙唾者。此詐病也。若
脈和平。當言此病太甚。須鍼灸數十處。服吐下藥乃愈。詐其也。

聲診

聲

難經六十一難曰。聞其五音以別其病。以五藏有五聲。以合於五音。謂肝呼應角。心言應徵。脾歌應宮。肺哭應商。腎呻應羽。是也。然此義深奧。非尋常所可彷彿者。今惟以名賢簡易之法。彙著於左。

脈之呻者。痛也。

爲彼診時有呻吟之聲

言遲者。風也。

風滯于氣機關不利。出言遲吃而蹇。

聲如從室中言。此中氣之濕也。

濕濁清氣言不清亮

言而微。終乃復言者。此奪氣也。

謂氣短弱不相接言未已停止半响復言

衣被不斂。言語罵詈不避親疎者。此神明之亂也。

即風狂之類。熱病不論

出言懶怯。先輕後重者。內傷不足。

出言壯厲。先重後輕者。外感有邪。

攢眉呻吟者。苦頭痛。

叫喊。或呻吟。以手捫心下者。中脘痛。

呻吟不能轉身。或轉而作楚態者。腰痛。
呻吟搖頭。或攢眉以手捫腮脣者。齒痛。

呻吟不能行起者。腰脚痛。

爲彼診時。數吁氣者。屬鬱結。吁則氣鬱少伸

搖頭言者裏痛。

形羸聲啞。勞瘵不治。此必咽中有瘡肺金火尅肺主聲故耳

暴啞者。風痰伏火。或忿怒叫喊所致。

聲嘶色敗。久病不治。

坐而氣促。喉聲者。痰火哮喘。

言語蹇澀者。風痰。

中年人聲濁。痰火。

診時獨言獨語。言談無緒者。思慮傷神。心神他寄故耳

傷寒壞證聲啞。爲狐惑。上脣有瘡。蟲食其藏。下脣有瘡。蟲食其肛。

雖病而聲音響如故者吉。

空能傳聲氣無阻無礙則聲為之變效所病而出焉細心靜聽其情乃得

金匱要略曰。病人語聲寂然。喜驚呼者。骨節間病。語聲喑喑然不徹者。心膈間病。語聲啾啾然細而長者。頭中病。欲言復寂。忽又驚呼。非深入骨節筋為肝合骨乃膽主驚呼。亦出于肝膽故耳。喑喑低渺之聲。聽不明微。必心膈間有所阻礙。啾啾細長之聲。所謂如室中甕中出者。頭中有濕。混其清陽。故鼻窒發聲如此也。

息

氣短促不足以息。虛甚。應呼不能。平人無寒熱。短氣不足以息者。實也。或中焦有礙。吸而微數。其病在中焦實也。當下之即愈。中實吸不得入。還虛者不治。則實可下。中虛吸不盡入。在上焦者。其吸促。在下焦者。其吸遠。此皆難治。呼吸而微數者。肝腎欲絕。入在上焦者。其吸促。在下焦者。其吸遠。此皆難治。呼吸動搖振振者不治。斯病愈矣。今上焦宜通。下焦宜達。上下交通。病能達上。上下不交通。病豈易治乎。動搖振振。氣不載形也。

問診

人品起居

凡診病。必先問所看何人。或男或女。或老或幼。或童僕。或婢妾。次問得病之日。受病之原。及飲食胃氣如何。便利如何。曾服何藥。日間何如。夜間何如。或寐或寤。有無脹悶痛處。

病證

問病不答。必耳聾。卽當詢之。是素聾否。不則病久。或汗下過傷虛聾。問而懶言答。惟點頭者。是中氣虛。昏憤不知人。問是暴厥。抑是久病。婦女僵厥。多是中氣。亦須問其曾大怒否。婦女當問其月水如何。寡婦氣血凝滯。兩尺多滑。不可誤斷爲胎。室女同。心腹脹痛。問是舊病新病。

嗜欲苦樂

於苦欲
虞見

問其所欲何味。所嗜何物。或縱酒。或齋素。喜酸者。則知肝虛。喜甘脾虛。他味準此。

頭身臂膊作痛。必問曾病惡瘡否。臨病必審形志。或形勞志苦。或抑鬱傷

中。故貴脫勢。眷戀於心。雖不中邪。病從內生。名曰脫營。謂脫散營氣

常富後貧。悲憂內結。名曰失精。謂精神喪失

二者皮焦筋屈。痿痺為攣。以其外耗於衛。內奪於榮。良工診之。必知病情。

再問飲食起居。暴樂暴苦。始樂後苦。暴怒傷陰。暴喜傷陽。形體毀沮。精華

日脫。邪氣內併。邪乘虛而襲

附辨舌

張三錫曰。金鏡錄載三十六舌。辨傷寒之深淺吉凶。可稱詳備。然細討究。不過陰陽表裏寒熱虛實而已。陶節菴曰。傷寒邪在表。則舌無胎。熱邪在表。則胎漸生。自白而黃。黃而黑。甚則黑裂矣。黑胎多凶。若根黑或中黑。或尖黑。皆屬裏熱。全黑。則熱極而難治。常見外感挾內傷。宿食重而結於心。

下者。五六日。舌漸黃。或中乾而邊潤。名中焙舌。此則裏熱尙淺。若全乾。無論黃黑。皆屬裏證。分輕重下之。若曾經下。或屢下不減。乃宿滯結於中宮也。詢其脈之虛實。及中氣何如。實者潤而下之。虛人神氣不足。當生津固中氣。有用生脈散。對解毒湯而愈者。有用附子理中湯。冷服而愈者。一則陰極似陽。一則陽極似陰。不可不辨。

白胎屬寒。外證煩躁。欲坐臥於泥水中。乃陰寒逼其無根失守之火而然。脈大不鼓。當從陰證治。若不大躁嘔吐者。從食陰治之。

白胎燥。虛而微熱。或不得汗。或胃中少有飲而不行。宜溫解。

白滑胎。虛寒胃寒。陽氣不振。宜溫。

白胎起芒刺。津液不足。胃中有物。宜運動。

黃胎。微熱。熱漸入裏。或燥渴之象。宜清解。

灰色胎。胃中有物。中氣虛熱。渴而不能消飲者。宜溫解。

黑色胎。熱入裏實。燥厚者。宜下。滑潤者。水困火。宜溫。雖黑而潤。所謂水極似火也。不燥爲異。

凡傷寒辨舌者。以舌屬心而主火。寒爲水也。水寒凌火。舌受其困。瘥後辨舌者。以心主血也。經云。少陰氣絕。則血不流。故舌紫黑者。爲血先死。

凡見黑舌。要問曾食酸甜鹹物否。能染成黑色。凡視舌色。雖有成見。亦必細審兼證。及脈之虛實。不爾。恐有毫釐千里之謬。

醫燈續焰

明 錢塘 王 紹 隆 著

明 錢塘 潘 楫 碩 甫 輯

明 錢塘 王 佑 賢 聖 翼 評

鄞縣 曹 赤 電 炳 章 校

卷二十一 附餘

醫範

張仲景曰。夫天布五行以運萬類。人稟五常以有五藏。經絡府俞。陰陽會通。玄冥幽微。變化難極。自非才高識妙。豈能探其理致哉。上古有神農黃帝、岐伯、伯高、雷公、少俞、少師、仲文。中世有長桑、扁鵲。漢有公乘、陽慶、及倉公。下此以往。未之聞也。觀今之醫。不念思求經旨。以演其所知。各承家技。終始順舊。省疾問病。務在口給。相對斯須。便處湯藥。按寸不及尺。握手不

及足。人迎跌陽三部不參。動數發息。不滿五十。短期未知。決診九候。曾無
髣髴。明堂闕庭。盡不見察。所謂窺管而已。夫欲視死別生。實爲難矣。孔子
云。生而知之者上。學則亞之。多聞博識。知之次也。余宿尙方術。請事斯語。
孫真人曰。醫方卜筮。藝能之難精者也。旣非神授。何以得其幽微。世有愚
者。讀方三年。便謂天下無病可治。及治病三年。乃知天下無方可用。故學
者必須博極醫源。精勤不倦。至若道聽塗說。而言醫者。豈不深自誤哉。
史崧曰。夫爲醫者。在讀書耳。讀而不能爲醫者有矣。未有不讀而能爲醫
者也。不讀醫書。又非世業。殺人豈不甚於挺刃乎。

切中時
病

金華戴叔能曰。醫以活人爲務。與吾儒道最切近。自唐書列之技藝。而吾
儒不屑爲之。世之習醫者。不過誦一家之說。守一定之方。以幸其病之偶
中。不復深探遠索。上求聖賢之意。以明夫陰陽造化之會歸。又不能博極
羣書。采撰衆議。以資論治之權變。甚者至於屏棄古方。附會臆見。展轉相
迷。而其爲患不少矣。是豈聖賢慈惠生民之本意哉。
學士商輅曰。醫者意也。如對敵之將。操舟之工。貴乎臨機應變。方固難於

隨機而
應道法
始圖

知彼知
此百戰
百勝

盡用。然非方。則古人之心弗傳。茫如望洋。如捕風。必有率意而失之者矣。方果可以弗用乎。雖然。方固良矣。然必熟之素問。以求其本。熟之本草。以究其用。熟之診視。以察其證。熟之治療。以通其變。始於用方。而終至於無俟於方。夫然後醫之道成矣。昔許胤宗謂我善讀仲景書。而知其意。然未嘗專用其方。誠名言哉。

續醫說云。近時醫者。偏執己見。或好用熱藥。或好用涼藥。然素問有異法方宜論。抑何嘗偏執耶。古之良醫。必量人之虛實。察病之陰陽。而後投以湯劑。或補或瀉。各隨其證。若的是陽虛失血。治以乾薑、附子。諸虛百損。補以人參、黃耆。痰熱壅嗽。清以芩、連。大便結熱。利以硝、黃。其法豈盡廢乎。許叔微有云。形有寒邪。雖嬰孩亦可服金液。藏有熱毒。雖老羸亦可服大黃。至哉通變之說也。

楊仁齋曰。治病如操舟。操舟在手。當風波震蕩之衝。一有轉移。則舟覆矣。醫衡主持在我。不可偏徇病家所欲。尤不可張皇。使病人驚聞。有病家粗識皮膚。辨難反覆。萬勿惑焉。又有瘥後觸犯再復。隱諱不言。須詰問其由。

庶得對病施藥。

天報聽
之無忤
是念

陸宣公論云。醫以活人爲心。故曰醫乃仁術。有疾而求療。不啻求救焚溺於水火也。醫乃仁慈之術。須披髮纓冠而往救之可也。否則焦濡之禍。及少有仁心者能忍乎。竊有醫者。乘人之急而詐取貨財。是則孜孜爲利。跖之徒也。豈仁術而然哉。比之作不善者。尤甚也。天地豈不報之以殃乎。今見醫家後裔。多獲餘慶。榮擢高科。此天道果報之驗。奚必計一時之利。而戕賊仁義之心。甚與道術相反背。有乖生物之天理也。從事者可不鑒哉。醫者當自念云。人身疾苦。與我無異。凡來請召。急去無遲。或止求藥。宜卽發付。勿問貴賤。勿擇貧富。專以救人爲心。冥冥中自有祐之者。乘人之急。故意求財。用心不仁。冥冥中自有禍之者。吾鄉有張彥明。善醫。僧道貧士。軍兵及貧者求藥。皆不受錢。或反以錢米與之。人來請召。雖至貧下。亦去。富者以錢求藥。不問多寡。必多與藥。期於必愈。未嘗萌再攜錢來求藥之心。病若危篤。亦多與好藥。以慰其心。終不肯受錢。予與處甚久。詳知其人爲醫而口終不言錢。可謂醫人中第一等人矣。一日城中火災。周回焚盡。

煙焰中獨存其居。一歲牛災尤甚。而彥明莊上獨全。此神明祐助之也。其子讀書。乃與魁薦。孫二三人。皆龐厚俊爽。亦天道福善之信然也。使其孜孜以錢物爲心。失此數者。所得不足以償其所失矣。同門之人。可不鑑哉。孫真人曰。其有患瘡瘍下痢。臭穢不可瞻視。人所惡見者。但發憐憫愛恤之心。不得起畏難蒂介之意。是吾志也。

孫真人曰。夫爲醫之法。不得多語調笑。談謔誼譁。道說是非。議論人物。炫耀聲名。訾毀諸醫。自矜己德。偶然治瘥一病。則昂頭戴面。而有自許之貌。謂天下無雙。此醫人之膏肓也。

孫真人曰。醫到病家。縱綺羅滿目。勿左右顧盼。絲竹湊耳。無得自有所娛。珍羞迭薦。食如無味。醯醢兼陳。看若無有。所以爾者。夫一人向隅。滿堂不樂。而况病人苦楚。不離斯須。而醫者安然歡娛。傲然自得。真人神之所共恥。至人之所不爲也。

老君曰。人行陽德。人自報之。行陰德。鬼神善之。陰陽報施。豈誣也哉。所以醫人不得恃己所長。專心經略財物。但作救苦之心。於冥冥之中。自膺多

福矣。

錢乙在神宗時。治皇子儀國公病瘕瘕。國醫莫能治。乙進黃土湯。遂愈。神宗問曰。黃土湯何以愈斯疾。乙對曰。以土勝水。水得其平。則風自止。且諸醫所治垂瘡。但小臣適當其瘡耳。神宗悅其對。賞賚甚厚。

有古今
理同異

程篁墩云。近世有儒名者。立說斥東垣丹溪之書。爲不足觀。曰。二家動引素難。猶儒者動引唐虞三代。何益於事。噫。爲此言者。亦悖之甚矣。

譚景升化書云。譽人者。人譽之。謗人者。人謗之。

朱丹溪先生誨子十說。其一云。同道中。切宜謙和。不可傲慢於人。年尊者。恭敬之。有學者。師事之。倘有醫類。但當義讓。不可攘奪。致怨招謗。經云。禮之用。和爲貴。

泊宅編云。王居安秀才。久苦痔疾。聞蕭山有善工。力不能招致。遂命舟自烏程走錢塘。舍於靜邸中。使人迎醫。醫絕江至杭。旣見。欣然爲治藥餌。且云。請以五日爲期。可以除根本。初以一藥。放下大腸數寸。又以一藥洗之。徐用藥線結痔。信宿痔脫。其大如桃。復以藥餌調養。數日遂安。此工初無

難色。但放下大腸了。方議報謝之物。病者知命。懸其手。盡許行囊所有。爲酬方許治療。又玉山周僅。調官京師。舊患膀胱氣。外腎偏墜。有貨藥人云。只立談間。可使之止。約以萬錢。及三縑之報。相次入室中。施一鍼。所苦果平。周大喜。卽如數酬金帛而去。後半月。其疾如故。使人訪醫者。已不見矣。古之賢人。或在醫卜之中。今之醫者。急於聲利。率用詭道。以劫流俗。殆與穴坯挾刀之徒無異。予目擊二事。今書之以爲世警。

申志載溫州醫僧法程。字無枉。少瞽。百端治之不愈。但晝夜誦觀世音菩薩名號。如是十五年。夢中聞菩薩呼之使前。若有物繫其足。不可動。菩薩歎曰。汝前世爲灸師。誤灸損人眼。今生當授此報。難以免。但吾憐汝誠心。但使汝衣食豐足。遂探懷中。掬寶珠滿手與之。旣寤。醫道大行。衣鉢甚富。至七十猶在。

已志載宜興段承務。醫術精高。然貪顧財賄。非大勢力者。不能屈致。翟忠惠公居常熟。欲見之不可。謾平江守梁尙書邀之始來。旣回平江。適一富人病來謁醫。段曰。此病不過湯藥數劑可療。然非五百千爲謝不可。其家

始許半酬。拂衣去。竟從其請。別奉銀五十兩爲藥資。段求益至百兩。乃出藥爲治。數日愈。挾所獲西歸。中途夜夢一朱衣曰。上帝以爾爲醫。厚取賄賂。殊無濟物之心。命杖脊二十。遂勅左右。捽而鞭之。旣寤。覺脊痛。呼僕視之。捶痕宛然。還家未幾而死。

宣城符裏鎮人符助教。治癰疽。操心亡狀。病者瘡不毒。先以藥發之。忽一黃衣卒來。持片紙示之云。陰司追汝。以藤杖點其背。符大叫痛。黃衣曰。汝元來也知痛。隨手成大疽而死。

名醫錄云。京師有一婦人。姓白。有美容。京人皆稱爲白牡丹。貨下胎藥爲生。忽患腦疼。日增其腫。名醫治之。皆不愈。日久潰爛。臭穢不可聞。每夜聲喚。遠近皆聞之。一日遂與家中云。我所蓄下胎方。盡爲我焚之。戒子弟曰。誓不可傳此業。其子告母云。我母因此起家。何棄之有。其母曰。我夜夜夢數百小兒。啞我腦袋。所以疼痛叫喚。此皆是我以毒藥壞胎。獲此果報。言訖遂死。

醫說載宣城管內水陽村。醫陸陽。字義若。以技稱。建炎中。朱萃老編修妻。

避寇驚憂致疾。陸誤投以小柴胡湯殺之。溧水高淳鎮李氏子。病瘵召之。用藥未效。從出娼家飲。索錢并酒饌。不與。投以剛劑數十粒。又殺之。紹興九年。陸暴病。呼曰朱宜人。李六郎。休打我。我便去也。旬日死。黃帝曰。經脈十二。絡脈三百六十五。此皆人之所明知。工之所循用也。所以不十全者。精神不專。志意不理。外內相失。故時疑殆。診不知陰陽逆從之理。此治之一失也。受師不卒。妄作雜術。謬言爲道。更各自功。妄用鍼藥。後遺身咎。此治之二失。不適貧富貴賤之居。坐之厚薄。形之寒溫。不適飲食之宜。不別人事之勇怯。不知比類。足以自亂。不足以自明。此治之三失也。診病不問其始。憂患飲食之失節。起居之過度。或傷於毒。不先言此。卒持寸口。何病能中。妄言作名。爲粗所窮。此治之四失也。黃帝曰。凡未診病者。必問嘗貴後賤。雖不中邪。病從內生。名曰脫營。嘗富後貧。名曰失精。五氣留連。病有所併。醫工診之。不在藏府。不變軀形。診之而疑。不知病名。身體日減。氣虛無精。病深無氣。灑灑然時驚。病深者。以其外耗於衛。內奪於營。良工所失。不知病情。此亦治之一過也。凡欲診病者。

必問飲食居處。暴樂暴苦。始樂後苦。皆傷精氣。精氣竭絕。形體毀沮。暴怒傷陰。暴喜傷陽。厥氣上行。滿脈去形。愚醫治之。不知補瀉。不知病情。精華日脫。邪氣乃併。此治之二過也。善爲脈者。必以比類奇恆。從容知之。爲工而不知道。此診之不足貴。此治之三過也。診有三常。必問貴賤。封君敗傷。及欲侯王。故貴脫勢。雖不中邪。精神內傷。身必敗亡。始富後貧。雖不傷邪。皮焦筋屈。痿躄爲攣。醫不能嚴。不能動神。外爲柔弱。亂至失常。病不能移。則醫事不行。此治之四過也。凡診者。必知終始。有知餘緒。切脈問名。當合男女。離絕菀結。憂恐喜怒。五藏空虛。血氣離守。工不能知。何術之語。嘗富大傷。斬筋絕脈。身體復行。令澤不息。故傷敗結。留薄歸陽。膿積寒炅。粗工治之。亟刺陰陽。身體解散。四肢轉筋。死日有期。醫不能明。不問所發。唯言死日。亦爲粗工。此治之五過也。凡此五者。皆受術不通。人事不明也。周禮醫師掌醫之政令。聚毒藥以供醫事。凡邦之有疾病者。疖瘍者。造焉。則使醫分而治之。

政謂聚毒藥以供醫事。令謂使醫分而治之。毒藥藥之。辛苦者。頭瘡曰

疔身瘡曰瘍。分治者。醫各有能也。凡藥有有毒者。有無毒者。無毒所以療病。有毒所以發病。而藥物之性。隨四時而生死。金石之性。稟五行而厚薄。其類不一。其性必偏。而人之身。感陰陽寒暑之偏。而有病。病以偏而感。藥以偏而用。必相攻而後相濟。用之不善。則無毒者亦毒矣。必欲醫者。知用藥之爲毒。而不敢輕辨君臣佐使之制。調溫涼燥濕之宜。審表裏吐納之方。達造化性命之理。則雖毒不毒矣。故其職以聚毒藥爲主者。重之也。

歲終。則稽其醫事。以制其食。十全爲上。十失一次之。十失二次之。十失三次之。十失四次爲下。

稽。計也。食。祿也。十全謂所治十人皆愈也。失謂其不效者。失四次爲下。則其祿最薄。失五者黜之而無祿。罰之重者。重民命也。豈他職之可比也。疾醫。嘗養萬民之疾病。四時皆有癘疾。春時有瘡首疾。夏時有癢疥疾。秋時有瘧寒疾。冬時有嗽上氣疾。

天有六氣。謂陰陽風雨晦明。皆足以傷形。人有六疾。謂寒熱末腹惑心。

皆足以傷氣。運行於榮衛。周流於四肢。交通則爲和。有餘不足則爲疾。苟調養不得其道。而與之值焉。是以氣疾交攻。甚者或至於病。此疾醫於治病言養者。精察夫六疾之本。而順適夫六氣之運。此醫之良者也。癘疾者。氣不和之疾。瘡。酸削也。首疾。頭痛也。嗽。咳也。上氣。逆喘也。凡人四時之間。冬傷於寒。陽主於內。春木用事。而陽發於外。然後寒氣搏之。爲瘡首之疾。春木爲肝。而主色。火勝於夏。以子勝母。故暑氣溢而爲疥癢之疾。夏傷於暑。陰主於內。秋金用事。而陰發於外。然後暑氣搏之。爲瘡寒之疾。秋金爲肺。而主聲。水勝於冬。以子勝母。故寒氣壅而爲嗽。上氣疾。是四者。皆四時不和之氣。故謂之癘。

以五味五穀五藥養其病。以五氣五聲五色。眡其死生。兩之以九竅之變。參之以九藏之動。

五味醯酒飴蜜薑鹽之屬。五穀麻黍稷麥豆也。五藥草木蟲石穀也。養猶治也。病繇氣勝負而生氣之贏。則攻之。其不足則養之也。五氣者。肝氣溫。心氣熱。脾氣和。肺氣涼。腎氣寒是已。五聲者。肝聲呼。心聲嘆。脾聲

歌。肺聲哭。腎聲呻是已。五色者。肝色青。心色赤。脾色黃。肺色白。腎色黑。是已。三者劇易之徵見於外。察其盈虛休王。則吉凶可知矣。九竅者。陽竅七。兩耳兩目兩鼻一口也。陰竅二。大小二府也。竅謂其有形而見於外者。兩之謂陰陽。變謂陰陽之變。觀其證之變而有通塞之二候。九藏者。正藏五。謂肺心肝脾腎。及六府中。胃膀胱大腸小腸四者。藏謂皆有形而藏於內者。參之謂陽陰與冲氣。察其脈之動而有浮中沉之二部。以要而言。九藏皆不出於五藏。而上關九竅。兩之參之而得其要。則五要可用。而醫無過誤之失矣。

凡民之有疾病者。分而治之。死終。則各書其所以而入於醫師。少者曰死。老者曰終。所以謂治疾不愈之狀也。入於醫師者。醫師得以制其祿。且以爲後戒。

瘍醫。掌腫瘍潰瘍。金瘍折瘍之祝藥。剗殺之齊。

腫瘍。雍而上生創者。潰瘍。癰而含膿血者。金瘍。刀創也。折瘍。踣跌者。祝當爲注。以藥附之也。剗。刮去膿血也。殺。以藥食其惡肉也。

凡療瘍。以五毒攻之。以五氣養之。以五藥療之。以五味節之。

止病曰療。五毒。五藥之有毒者。今醫方有五毒之藥。作之合黃墜。置石膽。丹砂。雄黃。礬石。磁石。其中。燒之三晝夜。其煙上著。以雞羽掃取之。以注創。惡肉破。則骨盡出。刮謂刮去敗血。殺謂蝕去惡肉。蓋腫者欲散。潰者欲合。傷者欲復。斷者欲續。故必先攻之以五毒。而後養之以五穀。瘥之以五藥。節之以五味也。

凡藥以酸養骨。以辛養筋。以鹹養脈。以苦養氣。以甘養肉。以滑養竅。凡有瘍者。受其藥焉。

此言各以其類相養也。酸木味。木根立地中似骨。辛金味。金之纏合異物似筋。鹹水味。水之流行地中似脈。苦火味。火出入無形似氣。甘土味。土含載四者似肉。滑滑石也。凡諸滑物通利往來似竅。然治瘍以骨爲主。而筋脈氣不可以過盛。用藥宜得其中焉。

陶弘景曰。今庸醫處療。皆恥看本草。或倚約舊方。或聞人傳說。或遇其所憶。便攬筆疏之。俄然戴面。以此表奇。其惡畏相反。故自寡昧。而藥類違僻。

分量參差。亦不以爲疑。脫或偶爾值差。則自信方驗。若旬月未瘳。則言病源深結。了不反求諸己。詳思得失。虛構聲稱。多納金帛。非惟在顯宜責。固將居幽貽譴矣。

張湛曰。夫經方之難精。由來尙矣。今病有內同而外異。亦有內異而外同。故五藏六府之盈虛。血脈榮衛之通塞。固非耳目之所察。必先診候以審之。而寸口關尺。有浮沉弦緊之亂。俞穴流注。有高下淺深之差。肌膚筋骨。有厚薄剛柔之異。惟用心精微者。始可與言於茲矣。今以至精至微之事。求之於至粗至淺之思。豈不殆哉。若盈而益之。虛而徹之。塞而壅之。寒而滯之。是重加其疾而望其生。吾見其死矣。

孫真人曰。凡古今病名。率多不同。緩急尋檢。常致疑阻。若不判別。何以示衆。且如世人呼陰毒傷寒。最爲劇病。嘗深據其由。然口稱陰毒之名。意指少陰之證。病實陰陽之候。命一疾而涉三病。以此爲治。豈不茫昧。殊不知陰毒少陰陰陽。自是三候。爲治全別。古有方證。其說甚明。今而混淆。害人最急。又如腸風藏毒。效逆慢驚。遍稽方論。無此名稱。深窮其狀。腸風乃腸

痔下血。藏毒。乃痢之蟲毒。咳逆者。噦逆之名。慢驚者。陰癇之病。若不知古。知今。何以爲人司命。加以古之經方。言多雅奧。以利爲滯下。以蹶爲脚氣。以淋爲癰。以實爲秘。以天行爲傷寒。以白虎爲歷節。以膈氣爲膏肓。以喘嗽爲欬逆。以彊直爲瘓。以不語爲瘧。以緩縱爲非。以怔忡爲悸。以痰爲飲。以黃爲瘰。諸如此論。可不討論。而况病有數候相類。二病同名者哉。宜其視傷寒。中風。熱病。瘟疫。通曰傷寒。膚脹。鼓脹。腸覃。石瘕。率爲水氣。療中風。專用乎痰藥。指滯下。或以爲勞疾。伏梁。不辨乎風根。中風。不分乎時疾。此。今天下醫者之公患也。是以別白而言之。

始終要
治虛勞
保胃氣

古云。不得爲賢宰相。則爲明醫。甚哉醫之難明也。略舉數事。一曰涼藥治損謬。其說盛於丹溪。謂人之一身。陽常有餘。陰常不足。而用知母。黃蘗等。謂之滋陰。至今治虛勞者。遵而用之。初服胃氣尙強。久之則中寒而食減。陰未滋。陽已竭矣。或曰瀉南方。補北方。經語也。然不知經云。東方實。西方虛。乃不治東西。而惟瀉南補北。腎爲肝母。水旺則金不受熏。而能制木。故曰母能令子虛也。爲金木謀則然。而非概治虛勞也。以王節齋之高明。亦

攻病用
毒補亢
用熱主
治亦自
不同

切中時
病

因仍而不覺。豈一時之誤否耶。二曰炮製失宜謬。今人以童便浸參。曰肺熱還傷肺也。本草參忌酒與溲。酒鹽也。溲便溺也。何反用其忌也。又附子者。正取其勇悍之性。亦用童便煮之。至三五日。譬如用猛將以禦勁敵。取其猛也。而損傷其手足。饑餓其體膚。乃使其臨陣。可乎。夫用藥者。宜察其當用與否。如不當用。曷若已之。三曰認藥舛錯謬。青皮則以小枳實混之。其枳殼則以香圓混之。石膏則以方解石混之。又另立軟石膏。軟柴胡之說。猶未也。以五倍子爲文蛤。以蓮花鬚爲蓮花蕊。以山蘿蔔爲沙參。皆舛也。夫青皮入足厥陰經。故陳皮治高。青皮治低。小枳實。胸中藥也。何由入厥陰經也。餘可類推矣。又枸杞子。地骨皮。根之於實。一樹也。王節齋分屬草木二部。皆舛也。四率意處方謬。古人處方。慎重不苟。所有成方。如四君子。四物。二陳。平胃等號。玉笈三十六方。孫思邈真人傳自龍宮。而雜布於諸方書中。名各皆有深意。後人合宜則用。稍爲增減出入。無不應者。乃今時處方。或散漫無紀。或任便自用。或慣作平淡庸柔之劑。無大益。亦無大損者。將謂成則歸功。敗則無所歸咎。而不知緊要之疾。乃作誤害矣。又王

氏類方。最爲精密。而四君子易甘草以黃耆。夫臨證處方。自無死法。而錄刻古方。不宜變損。或古有之則可。古未有。則仍舊爲是。愚謂用藥如用兵。兵本殺人。善用之則生人。醫本生人。不善用之則殺人。旨哉言乎。故孔子以戰疾並慎。而醫家者言。則有四診九候。五科八要。誠慎之也。不然而平日不調習。臨敵無節制。鹵莽決裂。其不以兵爲戲乎。

王忠文公禕云。李明之弟子。多在中州。獨劉守真之學。傳之荆山浮圖師。師至江南。傳之中人羅知悌。而南方之醫。皆宗之矣。及國朝。天下之言醫者。非劉氏之學。弗道也。劉李之法。雖攻補不同。會而通之。隨證而用之。自中其病矣。近時吾吳中。稱良醫師。則以能持東垣者。謂之王。持張劉者。謂之伯。噫。堯舜以揖讓。湯武以干戈。苟合道濟世。何必曰同。余嘗病世之專於攻伐者。邪氣未退。而真氣先斂然矣。專於補養者。或致氣道壅塞。爲禍不少。正氣未復。而邪氣愈熾。古人有云。藥貴合宜。法當應變。泥其常者。人參反以殺人。通其變者。烏頭可以活命。孫真人所謂隨時增損。物無定方。真知言哉。

震澤王文恪公云。今之醫者。祖述李明之、朱彥修。其處方不出參、朮之類。所謂醫之王道。信知本者矣。然病出於變。非朮、參輩所能效者。則藥亦不得不變。可變而不知變。則坐以待亡。變而失之毫釐。則反促其死。均之爲不可也。故曰。可與立。未可與權。藥而能權。可謂妙矣。明之、彥修。未嘗廢權也。世醫師其常而不師其變。非用權之難乎。

孔志約云。動植形生。因方舛性。春秋節變。感氣殊功。離其本土。則質同而效異。乖於採摘。乃物是而時非。名實旣爽。寒溫多謬。用之凡庶。其欺已甚。施之君父。逆莫大焉。

陳嘉謨曰。醫學貿易。多在市家。諺云。賣藥者。一眼。用藥者。兩眼。服藥者。無眼。非虛語也。古壙灰云。死龍骨。苜蓿根爲土黃耆。麝香搗荔枝攪。藿香採茄葉雜。煮半夏爲玄胡索。鹽松梢爲肉蓯蓉。草仁充草豆寇。西呆代木香。熬廣膠入蕎麥作阿膠。煮鷄子及魚枕爲琥珀。枇杷蕊代款冬花。臚脚脛作虎骨。松脂混麒麟。番硝和龍腦香。巧詐百般。甘受其侮。甚至殺人。歸咎用藥。乃大關係。非比尋常。不可不慎也。

陶貞白外傳云。有弟子桓闔。先得道。將超昇。弘景問曰。某行教修道。勤亦至矣。得非有過而淹延在世乎。桓闔曰。君之陰功著矣。所修本草。以蟲蟲。水蛭爲藥。功雖及人。而害於物命。以此一紀之後。當解形去世。署蓬萊都水監耳。言訖乃去。弘景復以草木之藥。可代物命者。著別錄本草三卷。以贖其過焉。後陶弘景果解形仙去。又爲茅山上清第九代宗師也。許胤宗曰。醫特意耳。思慮精。則得之。脈之候。幽而難明。吾意所解。口莫能宣也。古之上醫。要在視脈。病乃可識。病與藥值。惟用一物攻之。氣純而愈速。今之人不善爲脈。以情度病。多其物以幸有功。譬獵不知兔。廣絡原野。冀一人獲之。術亦疏矣。一藥偶得。它味相制。弗能專力。此難愈之驗也。脈之妙處不可傳。虛著方劑。終無益於世。此吾所以不著書也。太微仙君功過格云。以符法鍼藥救重疾一人爲十功。小疾一人爲五功。如受病家賄賂。則無功。施藥一服。爲一功。傳人保益性命符法藥術等。每一事爲五功。如受賄而傳。則一功。凡有重疾告治。不爲拯救者。一人爲二過。小疾一人爲一過。治不如法。爲一過。不愈而受賄。百錢爲一過。貫錢爲

害人性
命過豈
有限

十過。修合毒藥。欲害於人。爲十過。害人性命。爲百過。害人不死而病。爲五十過。害一切衆生禽畜性命。爲十過。害而不死。爲五過。故傷殺人性命者。爲百過。誤傷殺性命。爲八十過。大明律。凡庸醫爲人用藥鍼刺。誤不依本方。因而致死者。責令別醫辨驗藥餌穴道。如無故害之情者。以過失殺人論。不許行醫。若故違本方。詐療疾病而取財物者。計贓准竊盜論。因而致死。及因事故用藥殺人者。斬。

樵談有曰。殺人者死。法也。庸醫殺人。不死。猛將殺人。不死。酷吏殺人。不死。法在乎。

繆仲淳祝醫五則

凡人疾病。皆由多生。不惜衆生身命。竭用人力。好殺鳥獸昆蟲。好箠楚下賤。甚則枉用毒刑。加諸無罪。種種業因。感此苦報。業作醫師。爲人司命。見諸苦惱。當興悲憫。詳檢方書。精求藥道。諦察深思。務期協中。常自思惟。藥不對病。病不對機。二旨或乖。則下咽不返。人命至重。冥報難逃。勿謂一時。

衣食自貽莫懺之罪於千百劫。戒之哉。宜懼不宜喜也。

凡爲醫師。當先讀書。凡欲讀書。當先識字。字者。文之始也。不識字義。寧解文理。文理不通。動成窒礙。雖詩書滿目。於神不染。觸途成滯。何由省入。譬諸面牆。亦同木偶。望其拯生民之疾苦。顧不難哉。故昔稱太醫。今日儒醫。太醫者。通天地人者也。儒醫者。讀書窮理。本之身心。驗之事物。戰戰兢兢。求中於道。造次之際。罔敢或肆者也。外此。則俗工耳。不可以言醫矣。凡爲醫師。當先識藥。藥之所產。方隅不同。則精蘊頓異。收采不時。則力用全乖。又或市肆飾僞。足以混真。苟非確認形質。精嘗氣味。鮮有不爲其誤者。譬如將不知兵。立功何自。醫之於藥。亦猶是耳。旣識藥矣。宜習修事。雷公炮炙。固爲大法。或有未盡。可以意通。必期躬親。勿圖苟且。譬諸飲食。烹調失度。尙不益人。反能增害。何況藥物。關乎軀命者耶。可不慎諸。凡作醫師。宜先虛懷。靈知空洞。本無一物。苟執我見。便與物對。我見堅固。勢必輕人。我是人非。與境角立。一靈虛竅。動爲所塞。雖日親至人。終不獲益。白首故吾。良可悲已。執而不化。害加於人。清夜深思。宜生愧耻。况人之

才識。自非生知。必假問學。問學之益。廣博難量。脫不虛懷。何由納受。不耻無學。而耻下問。私心自勝。於道何益。苟非至愚。能不儆省乎。醫師不患道術不精。而患取金不多。舍其本業。專事旁求。假寵貴人。冀其口脰。以希世重。縱得多金。無拔苦力。於當來世。豈不酬償。作是思惟。是苦非樂。故當勤求道術。以濟物命。縱有功效。任其自酌。勿責厚報。等心施治。勿輕貧賤。如此。則德植厥躬。鬼神幽贊矣。已上所祝五條。皆關切醫師才品道術。利濟功過。仰願來學。俯從吾祝。則進乎道而不囿於技矣。詎非生人之至幸。醫道之大光也哉。陶弘景曰。五經四部。軍國禮服。若講用乖越者。猶可矣。止於事迹。非宜爾。至於湯藥。一物有謬。便性命及之。千乘之君。百夫之長。何不深思戒慎耶。昔許太子侍藥。不嘗招弑君之惡。季孫饋藥。仲尼有未達之辭。知其藥性之不可輕信也。

袁氏醫家十事

一、醫之志。須發慈悲惻隱之心。誓救大地含靈之苦。視衆生之病。不論親疎貴賤。賢愚貧富。皆當恫癘乃身。盡心殫力。曲爲拯理。

二、醫之學。須上通天道。使五運六氣。變化鬱復之理。無一不精。中察人身。使十四經絡。內而五藏六府之淵涵。外而四肢百骸之貫串。無一不徹。下明物理。使昆蟲草木之性情氣味。無一不暢。然後可以識病而用藥。

三、醫之識。醫之用藥。如將之用兵。縱橫合變。呼吸異宜。非識見之高。不能神會而獨斷也。然此識非可襲取。非可商量。全在方寸中。虛明活潑。須滌除嗜慾。恬澹無爲。則虛空自然生白也。

四、醫之慎。醫爲人之司命。生死係之。用藥之際。須兢兢業業。不可好奇而妄投一藥。不可輕人命而擅試一方。不可聘聰明而遽違古法。倘或稍誤。明有人非。幽有鬼責。可懼也。

五、醫之養。君子之游藝。與據德依仁。皆爲實學。故古人技藝之工。都從善養中得來。若承蜩。若養雞。皆是法也。醫雖小道。實具甚深三昧。須收攝心體。涵泳性靈。動中習存。忙中習定。外則四體常和。內則元神常寂。然後望

色聞聲。問病切脈。自然得其精。而施治得宜也。

六、醫之術。醫非徒仁術。亦仙術也。諺云。古來醫道通仙道。此豈無稽之言哉。凡欲學醫。須將玄門之旨。留神講究。玄牝之門。生身之戶。守中養氣之訣。觀竅觀妙之理。務求明師指示。親造其藩。而闢其室。此處看得明白。則病候之生滅。身中之造化。已洞悉矣。以之治疾。豈不易易。況人之疾。有草木金石所不能治者。則教之依法用功。無不立愈。天台智者禪師。謂一日一夜調息之功。可以已二十餘年之痼疾。蓋天之陽氣一回。則萬物生色。人之元氣一復。則百體皆和。宿疾普消。特其餘事耳。

七、醫之量。書云。必有忍。其乃有濟。有容德乃大。醫者術業既高。則同類不能無忌。識見出衆。則庸庶不能無疑。疑與忌合。而誹謗指摘。無所不至矣。須容之於不校。付之於無心。而但盡力於所事。間有排擠毀訾。形之辭色者。亦須以孟子三自反之法應之。彼以逆來。我以順受。處之超然。待之有禮。勿使病家動念可也。

八、醫之言。仲尼大聖。屢以慎言爲訓。而醫者之言。尤當慎者。不可誇己之

長。不可談人之短。不可浮誕而駭惑病人。不可輕躁而詆誹同類。病情之來。歷用藥之權衡。皆當據實曉告。使之安心調理。不可誣輕爲重。不可誑重爲輕。卽有不諱。亦須委曲明諭。病未劇。則寬以慰之。使安心調理。病既劇。則示以全歸之道。使心意泰然。寧默毋譁。寧慎毋躁。九醫之行。語曰。以身教者從。以言教者訟。故慎吾之言。不若端吾之行。道高天下。守之以謙。智絕人羣。處之以晦。敦孝弟。重倫理。而於禮義廉耻四字。則秉之如著龜。遵之如柱石。久而勿失。自然起敬起信。而醫道易行也。十醫之守。醫雖爲養家。尤須以不貪爲本。凡有病人。在卽舉家不寧。當此時而勒人酬謝。家稍不足。則百計營求。艱難更倍。卽充足之家。亦於滿堂懊惱之中。而受其咨詛痛苦之惠。亦非心之所安也。故我生平於病人所餽。不敢纖毫輕受。有不給者。或更多方周給之。非以市恩。吾盡吾心而已矣。子孫習醫。而能依此十事。古之聖賢。何以加此。

醫家存心。當自重。不當自輕。當自謙。不當自傲。當計功。不當計利。當憐貧。不當諂富。自重必多道氣。自輕必無恆心。自謙者久必學進。自傲者久必術疎。計功則用心於治病而技巧生。計利則用心於肥家而詭詐出。憐貧則不擇人而醫。陰德無窮。諂富則不待請而至。卑污莫狀。

采芝之八則

明州蔣式金著

立己宜養重。不宜自輕。

吾黨既以斯道爲己任。則此一人之身。實千萬人之所繫命者也。必當立志清華。持躬敦樸。以示吾道之不苟。倘復徇人喪己。徑竇甘趨。且非懷珍待聘之心。難免枉尋直尺之誚。

臨證宜計功。不宜圖利。

業以治生。若謂憂道不憂貧。斯不近情之語也。第貪得之念勝。則隨在而急欲奏功。未能殫厥心以從事。有以人圖僥倖者矣。是宜痼瘕乃身。以祈必濟。庶功成而利亦隨之。洵不必攫情得失而已。祿在其中。

存心立
品學問
養身入
則備矣

持心宜善下。不宜恃能。

學問之道。虛己者多助。自恃者罔功。况岐伯之傳。義精理奧。豈一人之私智所能洞測者乎。若彼管窺。狃於一得。遂有蔑視儕類之思。是以安於寡陋。而所業日荒。古人所以有持滿之戒也。良賈深藏。允宜被服。

行道宜憐貧。不宜諂富。

炎涼醜態。涉世恆情。吾黨雖無是行。而或存是心。每見遇貴介之子。持術惟患其不精。值窶寒之徒。用意輒隣于忽略。抑思此術。原爲救人而設。苟獨無告者。更宜加以矜憐。匪第完濟世之初心。是亦陰行善之一節。

看書宜辦理。不宜執方。

陳言往論。雖古人已試之明驗。然神而明之存乎其人。况五方之風氣強弱不齊。古今人之稟性厚薄亦異。若必執成法而不善變。是何異強方枘以就圓鑿也。淵博之士。宜出自心之玄解。毋泥括帖之舊聞。

治病宜究因。不宜務末。

標本之說。昔人論之甚詳。今之圖治者。不審其致之之繇。而漫施補救。如

救焚者。第撲其燎原之焰。而不滅其火。焰雖熄而火性尙存。終必復燃也。是在培其根塞其源。殲厥渠魁。而羣醜自向風而遁矣。

處友宜從厚。不宜懷讒。

慨自人不古處。交道寢衰。在同途共事者。更深操戈下石之慘。不知譖人者。人亦譖之。曷若息厥雌黃。互相規勸。宏其黨類。各借聲援。一以收同人之益。一以維聲氣之窮。

製藥宜求精。不宜就簡。

質本五行。各宜其用。製法咸宗雷公矣。然考諸出處。或一本而根梢異治。或一味而呔咀不同。所產有地土之殊。所藏有新舊之別。慎毋指鹿爲馬。徒取充籠。認魯爲魚。漫誇具眼。致令奇方聖劑。竟介於效與不效之間。不惟無以起沉疴。而適足以損令望。

吳鶴皋太素脈論

醫家以岐黃爲祖。其所論脈。不過測病情。決死生而已。未有所謂太素也。

扁鵲、倉公之神。仲景、叔和之聖。亦無所謂太素也。何後世有所謂太素者。不惟測人之病情。而能占人之窮通。不惟決人之死生。而能知人之禍福。豈其術反過於先聖耶。是亦風鑑巫家之教耳。初學之士。先須格致此理。免爲邪說搖惑。則造詣日精。而倉、扁、張、王之堂可闢矣。故太素乃醫之旁門。不得不辨。亦惡紫亂朱。距邪放淫之意。

又

太素之說。固爲不經。然其間亦有可採者。如曰脈形圓淨。至數分明。謂之清。脈形散濇。至數模糊。謂之濁。質清脈清。富貴而多喜。質濁脈濁。貧賤而多憂。質清脈濁。此謂清中之濁。外富貴而內貧賤。失意處多。得意處少也。質濁脈清。此謂濁中之清。外貧賤而內富貴。得意處多。失意處少也。若清不甚清。濁不甚濁。其得失相半。而無大得喪也。富貴而壽。脈清而長。貧賤而夭。脈濁而促。清而促者。富貴而夭。濁而長者。貧賤而壽。此皆太素可採之句也。然亦不能外乎風鑑。故業太素者。不必師太素。但師風鑑。風鑑精而太素之說自神矣。至其甚者。索隱行怪。無所不至。是又巫家之教耳。孔

子曰。攻乎異端。斯害也已。正士豈爲之。

吳鶴皋脈案式

脈案者。竊公案之義。醫者察得病情。立定方法。使病邪不能逃。吾之方論。藥至而邪伏。譬之老吏聽訟。援律定刑。使奸人無所逃也。

一書某年某月某地某人。二書其人年之高下。形之肥瘦長短。色之黑白。枯潤。聲之清濁長短。三書其人之苦樂。病由。始於何日。四書初時病證。服某藥。次服某藥。再服某藥。某藥少效。某藥不效。五書時下晝夜孰甚。寒熱孰多。喜惡何物。脈之三部九候如何。六引經旨以定病名。某證爲標。某證爲本。某證爲急。當先治。某證爲緩。當後治。某藏當補。某藏當瀉。七書當用某方。加減某藥。某藥補某藏。某藥瀉某藏。君臣佐使之理。吐下汗和之意。一一詳盡。

書年之干支。月之春秋者。占運氣也。書某地者。占方宜也。書年形聲色者。用之以合脈也。書苦樂者。占七情也。書始於何日者。占久近也。歷問

某病證藥物而書其驗否者。以之斟酌己見也。書晝夜寒熱者。辨氣血也。書喜惡何物者。察陰陽藏府也。書脈狀者。以之合年形聲色病證也。書經旨者。如法家引律。使確乎不可逃也。書病名者。用藥如用兵。師出貴有名也。書標本者。識輕重也。書方藥君臣之理者。欲病人達而嘗也。凡看王公大人。貴宦儒門之病。必書此一案。便無一毫苟且。自然奏功。即不愈。亦免誤投藥劑之疑也。

陶弘景曰。晉時有一才人。欲刻正周易。及諸藥方。先與祖訥共論。祖云。辯釋經典。縱有異同。不足以傷風教。至於湯藥。小小不達。便至於壽夭所由。則後人受弊不少。何可輕以裁斷。祖之此言。可爲仁識。足爲龜鏡矣。曲禮曰。醫不三世。不服其藥。宋景濂云。古之醫師。必通於三世之書。所謂三世者。一曰黃帝鍼灸。二曰神農本草。三曰素女脈經。脈經所以察證。本草所以辨藥。鍼灸所以祛疾。非是三者。不足以言醫。傳經者。旣明載其說。復斥其非。而以父子相承三世爲言。何其惑與。夫醫之爲道。必志慮淵微。機穎明發。然後可與於斯。雖父不能必其子也。

施笠澤曰。愚按古今之稱神醫者。莫若扁鵲。倉公。而扁鵲之術。則受之長桑君。倉公之術。則傳之公乘。陽慶。初未聞以世傳也。至如李東垣。朱丹溪。滑伯仁輩。皆豪傑自振者。是知醫在讀三世書。而不在於祖父之三世也。明矣。

張顧存先生回頭歌

奉勸仁術們。亟回頭。從寬譬。不爲良相爲良醫。願得博濟行仁義。資彼青
 蚨半養身。先要陰功積漸次。念關天休計利。朱秀水宰相錢山陰宰相嚴雲南宰相廖雲南
 中丞齊昌嗣。

楫曰。虛言謗人而不知悔。大言譽己而不知慚。惟以利亂厥心。不顧醜出。其口此。小人之尤者也。而醫黨特甚。殊不知世有明眼。虛言大言。如見肺肝。不旋踵而爲人鄙笑者多矣。所謂謗人譽己者。適所以譽人謗己也。吳因之先生曰。造謗者甚忙。受謗者甚閑。忙者不能造閑者之命。閑者則能定忙者之品。亦名言哉。

醫燈續焰 卷二十 張顧存先生回頭歌

醫燈續焰

明 錢塘 王 紹 隆 著

明 錢塘 潘 楫 碩甫輯

明 錢塘 王佑賢聖翼評

鄞縣 曹赤電炳章校

卷二十一 附餘

病則

史記曰。病有六不治。驕恣不論於理。一不治也。輕身重財。二不治也。衣食不能適。三不治也。陰陽并藏氣不定。四不治也。形羸不能服藥。五不治也。信誣不信醫。六不治也。

秦觀勸善錄云。今人或爲湯火所傷。或爲鍼刀誤傷。手足痛已難忍。必號叫求救。至於暫時頭昏腹痛。或小可疾病。便須呼醫買藥。百般救療。於我

自身愛惜如此。至於生物。則恣意屠宰。不生憐憫。未論佛法。明有勸戒。未論天理。明有報應。若不仁不恕。唯知愛物。亦非君子長者之所當爲。諦觀物情。當念衆生。不可不戒。不可不戒。

家富婦
女坐此
自害

沈蓮池曰。世人有疾。殺牲祀神。以祈福祐。不思己之祀神。欲免死而求生也。殺他命而延我命。逆天悖理。莫甚於此矣。夫正直者爲神。神其有私乎。寇宗奭曰。治婦人。雖有別科。然亦有不能盡聖人之法者。今豪足之家。居煖室之中。處帷幔之內。復以帛蒙手臂。既不能行望色之神。又不能殫切脈之巧。四者有二闕焉。黃帝有言曰。凡治病。察其形氣色澤。形氣相得。謂之可治。色澤以浮。謂之易已。形氣相失。謂之難治。色夭不澤。謂之難已。又曰。診病之道。觀人勇怯。骨肉皮膚。能治其情。以爲診法。若患人脈病不相應。既不得見其形。醫人止據脈供藥。其可得乎。如此言之。烏能盡其術也。此醫家之公患。世不能革。醫者不免盡理質問。病家見所問繁速。爲醫業不精。往往得藥不肯服。似此甚多。扁鵲見齊侯之色。尙不肯信。況其不得見者乎。嗚呼。可謂難也已。

王海藏云。常人求診拱默。苟令切脈。試其能知病否。且脈者人之氣血。附於經絡。熱勝則脈疾。寒勝則脈遲。實則有力。虛則無力。至於得病之由。及所傷之物。豈能以脈知乎。故醫者不可不問其由。病者不可不說其故。孫真人云。未診先問。最爲有準。

丹溪云。病而服藥。須守禁忌。孫真人千金方。言之詳矣。但不詳言所以禁忌之由。敢陳其略。以爲規戒。夫胃氣者。精純冲和之氣。人之所賴以爲生者也。若謀慮神勞。動作形苦。嗜慾無節。思想不遂。飲食失慮。藥餌違法。皆能致傷。况傷之後。須用調補。恬不知怪。而又恣意犯禁。舊染之症。與日俱積。吾見醫將日不給。而傷敗之胃氣。無復完全之望。去死近矣。

龔廷賢曰。南方人有患病者。每延醫至家。診視後。止索一方。令人購藥於市。不論藥之真僞。新陳。有無。炮炙製度。輒用服之。不效。不責己之非。惟責醫之庸。明日遂易一醫。如是者數。致使病症愈增。而醫人亦惑亂。莫知其所以誤也。吁。此由病家之過歟。抑醫家之不明歟。

王海藏曰。病人服藥。必擇人煎藥。能識煎熬制度。須令親信恭誠至意者。

煎藥銚器。除油垢腥穢。必新淨甜水爲上。量水大小。斟酌以慢火煎熬分數。用紗濾去滓。取清汁服之。無不效也。

孫真人曰。古來醫人。皆相嫉害。扁鵲爲秦太醫。令李醯所害。卽其事也。一醫處方。不得使別醫和合。脫或私加毒藥。令人增疾。漸以致困。如此者非一。特須慎之。寧可不服其藥。以任天真。不得使愚醫相嫉。賊人性命。甚可哀傷。

陶弘景曰。王公貴勝。合藥之日。悉付羣下。其中好藥貴石。無不竊換。乃有紫石英丹砂。吞出洗取一片。動經十數過。賣諸有此例。巧僞百端。雖復監檢。終不能覺。以此療病。故難卽效。如斯並是藥家之盈虛。不是醫人之淺拙也。

龔廷賢曰。北方有患病者。每延醫至家。不論病之輕重。時刻欲效。否則卽復他求。朝秦暮楚。殊不知人稟有虛實。病感有淺深。且夫感冒腠理之疾。一二劑可愈。至於內傷勞瘵之證。豈可以一二劑而愈哉。此習俗之弊。誤人者多矣。唯智者辨之。

寇宗奭曰。夫病不可治者。有六失。失於不審。失於不信。失於過時。失於不擇醫。失於不識病。失於不知藥。六失之中。有一於此。卽爲難治。非止醫家之罪。亦病家之罪也。矧有醫不慈仁。病者猜鄙。二理交馳。於病何益。由是言之。醫者不可不慈仁。不慈仁則招非。病者不可猜鄙。猜鄙則招禍。惟賢者洞達物情。各就安樂。亦治病之一說耳。

蘇東坡曰。脈之難明。古今之所病也。至虛有盛候。大實有羸狀。疑似之間。便有死生之異。士大夫多祕所患。以求痊。驗醫能否。使索病於冥漠之中。辨虛實冷熱於疑似之間。醫者不幸而失。終不肯自謂失也。巧飾遂非。以全其名。間有謹愿者。雖合主人之言。亦參以所見。兩存而雜治。吾平生求醫。蓋於平時默驗其工拙。有疾求療。必盡告以所患。使醫了然知患之所在。然後診之。虛實冷熱。先定於中。脈之疑似。不能惑也。故雖中醫治吾疾。常愈。吾求疾愈而已。豈以困醫爲事哉。

緒澄曰。用藥如用兵。用醫如用將。善用兵者。徒有車之功。善用藥者。蓋有桂之用。知其才智。以軍付之。用將之道也。知其方伎。以生付之。用醫之道。

也。世無難治之疾。有不善治之醫。藥無難代之品。有不善代之人。非命而絕。從可知矣。

素問曰。拘於鬼神者。不可與言至德。惡於鍼石者。不可與言至巧。病不許治者。病必不治。治之無功矣。

王符潛夫論曰。疾棄醫藥。更往事神。故至於死亡。不自知爲巫所欺誤。乃反恨事巫之晚。此熒惑細民之甚者也。

病家須知

潘之洪著

一、養神明。凡人一身。精血從氣。氣從神。神者。精氣之母也。禮曰。有疾。疾者。齋。養者皆齋。齋也者。清明之至也。心不苟慮。身不苟動。志一氣應。達乎神明。所以理陰陽而迎天庥也。肝主仁。心主禮。肺主義。腎主智。脾主信。性情之宅也。是故却病法有曰。靜坐觀空。覺四大皆從假合。此上之上者也。又曰。常將不如我者。巧自寬解。萬事到來。以死譬之。庶亦心安意定。清虛日來。又曰。時請高明親友。講開懷出世之事。亦足以蕩滌煩襟。開發志意。若

不但愈
疾更可
長生

入骨之
語

夫愁思縷結。則神鬱於內。內而不出。爲滯爲幽。暴怒炎攻。則氣衝於上。上而不下。爲張爲蹶。又或棲棲身後。盼盼妻孥。視眼前一切。可欣可喜。難割難捨之物。繫戀不已。營度不休。未有不至於傷生隕命者也。試想到傷生隕命時。那一人能替得我。那一物能將得去耶。蘇東坡曰。因病得閑殊不惡。安心是藥更無方。此真病人一服清涼散也。

一防邪物。房室不遠。則耗其精。勞動不戒。則耗其力。言語不省。則耗其氣。此邪之自內受者也。起居不謹。則風露侵。飲食不節。則腸胃損。此邪之自外入者也。健人有此。不免於病。況病者而可以益之毒乎。然病人性情多恣。稍不當意。忿悞意生。父母妻子。懼其拂也。而任之。偏於數事。多所違犯。故病者不可自輕其生。而侍病者。尤不可不慎防密攝。事事留心。若縱其所欲。未有不至於壞者。慎之慎之。

一戒諱疾。醫家四要曰。望聞問切。猶人之有四肢也。一肢廢。不成其爲人。一要缺。不成其爲醫。然必先望先聞。而後切者。所重有甚於切也。乃病家不知此理。往往祕其所患。以俟醫之先言。卽以驗醫之能否。豈知病固有

以性命為戲舉世皆然不識何類以如此耳

證似脈同。而所患大相刺謬。若不先言明白。猝持氣口。其何能中。昔丹溪有叔祖。年七十。患泄瀉。脈瀼而帶弦。詢其喜食鯉魚。遂以茱萸、陳皮、生薑、砂糖等藥。探吐膠痰而瀉止。又有隣人。素患疳瘡。夏初泄瀉。脈亦瀼而弦。丹溪曰。此下疳之重者。與當歸、蘆薈丸去麝。四劑而瀉止。此兩人症似脈同。而治之迥別者。以其問之詳。言之明也。又如其人。或先貴後賤。或先貧後富。暴樂暴苦。始樂後苦。及所思所喜。所惡所欲。所疑所懼之云何。其始病所傷所感。所起所在之云何。以至病體日逐轉變之情形。病後所服藥餌之違合。必詳言之。則切脈自無疑惑。投劑便可奏功。若種種諱忌不言。而懵然伸臂授醫。使其倖邀射覆之一中。是直以性命為戲也。王海藏曰。常人求診。拱默惟令切脈。殊不知氣血附於經絡。熱則脈疾。寒則脈遲。實則有力。虛則無力。若得病之因。與所傷之物。豈能以脈知之乎。蘇東坡曰。吾疾必盡告醫者。使胸中了然。然後診脈。疑似不能惑也。吾求疾愈而已。豈以困醫為事哉。兩翁真高明之見也。病家不可不知。一、謹微疾。凡服藥於微。則其病易療。若過半而治療者。什三矣。過七八而

治療者。什不得一矣。昔齊中尉潘滿如小腹痛。倉公診曰。病得之酒且內。中尉不復自止於內。二十八日。當洩血而死。居二十五日。果洩血三日死。王仲宣年二十。仲景謂之曰。君有病。四十歲當眉落。半年而死。授五石湯令服。可免。居數日。復問之。詭云。已服湯。仲景曰。色候固非服湯之診。君何輕命也。後至期。果如其言。眉落而死。今人染病在身。不自珍惜。罔遵醫戒。忽略初機。直至深重。乃始張皇。卒以喪亡而不救。噫。晚矣。一慎藥石。病家有三種陋習。一者聽信師巫。廣行殺戮。禱賽鬼神。而醫藥反若可緩。煎調漫託匪人。二者不明藥理。旦暮更醫。致使源流不清。臧否淆溷。亂投雜劑。罔知適從。三者自命知醫。膠持意見。妄爲加減。以掣醫人之肘。有此三弊。雖倉扁無以見其能矣。善養者知之。

尊生十一 二鑑輯著

遠房室。經脈篇云。人始生。先成精。又上古天真論爲素問首篇。亦單說得一精字。蓋精者。先天之胚胎。生生之種子也。故欲修長年。必先遠色。矧

循循善誘之法

病者乎。病既因虛致邪。務宜堅城却寇。

寡嗜欲。嗜欲不滿。心無寧時。損耗精神。莫此爲甚。人非木石。安能絕無。簡而寡之。斯爲得矣。

斷思想。思想無窮。神結於內。展轉勿置。煩由以生。時日未覺。久則暗損。氣血多矣。亟宜斬絕。

消暴怒。內經云。怒則氣上。上而不下。病從生矣。甚有嘔血者。痰塞仆蹶者。皆氣上不下故耳。能臨事顧身。怒將潛滅。

戒勞動。動而生陽。勉力動之。成火矣。故勞字上從火。下從力。動亦從力。從重。非重力不能動也。勞動則氣血煩沸。諸火上騰。病變不出。而素有火疾者。更爲甚焉。唯靜逸爲對治之法。

省言語。言由心發。既發於心。則恐其錯誤。未免煩費吾心。細爲檢點。又人之一言一語。必由呼吸而出。費心損神。呼吸損氣。神氣兩虧。於人何益。慎起居。起居者何。一切行住坐臥。早起晚息也。慎起居者何。言一切行住坐臥。早起晚息間。謹而慎之。勿使風寒暑濕之邪。乘虛侵襲。而病中尤

當防備。要令我城堅固。莫教圍寇益兵。

勿迎送。迎送勞形。周全於迎送之間。則勞神矣。諒我病夫。雖禮可廢。

節飲食。飲食賴以養生。而養生中有戕生者。故生氣通天論云。陰之所生。本在五味。陰之五宮。傷在五味。傷者言其偏勝也。五味且不可偏。而乃有偏於涼冷。偏於炙燂。偏於膏粱。偏於麪蘖者。漸令濕熱垢膩。久積腸胃。一旦發爲瘡瘍疔毒。痰火癰疽。種種惡疾。必不能免。人又何苦取一時之快。而博他日之大不快也。愚哉。

檢藥石。藥石聽醫。吾何以檢之哉。擇其善者從之。其不善者棄之。善與不善。評之於理而已。更有效醫自試。君佐妄施。致令輕者困。重者篤。忽於入口。遺爾噬臍。愚之甚矣。

修德行。古語云。人有善念。天必從之。故國有災異。君唯修德。可以弭之。是君一身修德。卽能蔭庇一國。而人一心修德。豈不能獲免己身。所謂修德者何。卽懺悔改過也。要在掃除舊習。頓悟昨非。束步繩趨。兢時惕日。如此不輟。如此終身。是之謂真懺悔。真改過也。天意自然向注。凶眚自然潛

消。若急來抱佛脚。上岸討行李。試問頭上翁。已早知之矣。

明用度。諺言黃白爲世間活寶。寶固不可浪費。活豈教人死守乎。有等家富矣。而貧狀浮面。窮語挂脣。惟利是圖。卑污不顧。詎知此生之光景有限。饒君粟貫陳紅。究竟來一樣耳。較彼處貧安。隨分樂者。果孰得孰失乎。噫。良可悲也。

閩李廉泉者。商吾浙。戊辰正月。忽中風昏憤。延醫治療。至四月不愈。召余診。余與藥。復諄諄戒忌。踰月。復不減。詢知其以余所囑戒忌者。竟忘矣。因命筆書調攝事宜十二則。令置座右。不月而李疾頓愈。是知調攝力勝吾籠中物百倍。敢梓傳爲病家一助云。

寇宗奭曰。夫未聞道者。放逸其心。逆於生樂。以精神徇智巧。以憂畏徇得失。以勞苦徇禮節。以身世徇財利。四徇不置。心爲之病矣。極力勞形。躁暴氣逆。當風縱酒。食嗜辛鹹。肝爲之病矣。飲食生冷。溫涼失度。久坐臥大飽大饑。脾爲之病矣。呼叫過常。辯爭陪答。冒犯寒暄。恣食鹹苦。肺爲之病矣。久坐濕地。強力入水。縱欲勞形。三田漏溢。腎爲之病矣。五病旣作。故未

老而羸。未羸而病。病至則重。重則必斃。嗚呼。是皆弗思而自取之也。衛生之士。謹此五者。終身無苦。經曰。不治已病。治未病。正此謂矣。寇宗奭曰。夫安樂之道。在能保養者得之。况招來和氣之藥少。攻決之藥多。不可不察也。是知人之生。須假保養。無犯和氣。以資生命。纔失將護。便至病生。苟或處治乖方。旋見顛越。防患須在閑日。故曰。安不忘危。存不忘亡。此聖人之預戒也。

朱丹溪曰。與其救療於有疾之後。不若攝養於無疾之先。是故已病而求治。所以爲醫家之法。未病而先治。所以明攝生之理。夫如是。則思患而預防者。何患之有哉。此聖人不治已病。治未病之意也。食治通說云。燕居暇日。何所用心。善養形神。周防疾患。常存謹畏。無失調將。食飲之間。最爲急務。安危所繫。智力可分。與其畏病而求醫。孰若明理以自求。與其有病而治以藥。孰若抑情而預治。情斯可抑。理亦自明。能任理而不任情。則所養可謂善養者矣。防患却病之要。其在茲乎。寇宗奭曰。夫用藥如用刑。刑不可誤。誤卽千人命。用藥亦然。一誤卽便隔

生死。然刑有鞠司。鞠成然後議定。議定然後書罪。蓋人命一死。不可復生。故須如此詳謹。今醫人纔到病家。便以所見用藥。若高醫識病知脈。藥又相當。如此卽應手作效。或庸下之流。孟浪亂投湯劑。逡巡便至困危。如此殺人。何太容易。世間此事甚多。良由病家不擇醫。平日未嘗留心於醫術也。可不懼哉。

物理論曰。夫醫者。非仁愛不可託也。非聰明達理。不可任也。非廉潔淳良。不可信也。是以古之用醫。必選名姓之後。其德能仁恕博愛。其智能宣暢曲解。能知天地神祇之次。能明性命吉凶之數。處虛實之分。定逆順之節。原疾疹之輕重。而量藥劑之多少。貫微達幽。不失細小。如此乃謂良醫。豈區區俗學者能之哉。

陶弘景曰。醫貴有恆。不可權飾妄造。所以醫不三世。不服其藥。九折臂者。乃成良醫。蓋謂藥功積深故也。今之承藉者。多恃銜名價。不能精心研習。虛傳聲美。京邑諸人。皆尙聲譽。不取實學。聞風競往。自有新學。該明而名稱未播。貴勝以爲始習。多不信用。委命虛名。良可惜也。

爲痛哭
流涕

吳球曰。西鄉一人患病。久慕城間名醫。輿迎治病。因事絆。不得親行。遂令伊兄前去。患者不樂。服藥無效。遂送歸。仍請本醫。至途遇兄。詢其病源。兄曰。某病。某脈。用某藥。今在此囊中。遂將藥帶至病家。病者聞至。遂有喜色。診脈後。竟將前藥煎與服之。病者曰。此藥氣味。與前者大不相同。須臾問曰。何如。答曰。稍可。次日又進。其病瘳矣。吁。藥一也。其氣味異焉。蓋其人疑心故耳。

宋景濂贈鄭院判序云。有其術而無所於用。值可用之機。而人不能任之。欲望其以有成者。百家之所難也。惟醫爲甚。扁鵲、華陀。天下固不常有也。使有之。而值淺易之疾。遇難語之人。上之不足展吾術。次之不能從吾所欲。爲法宜鍼而責我以砭。法宜實而命我以虛。乖迂拘執。卒之與恆醫無異。是豈醫之罪哉。勢使然也。誠有善任人者。惟吾所用而不較。期以成效而不泥於私謀。人人皆可得而勉矣。故疾有死於過愛而生於達理。過愛者。恐其危而不肯任人。達理者。知非己之所能爲。則信人而求其成效。其達者。乃所以生之。而愛乃所以殺之也。若福建承宣布政使陳君彥銘。其

達理者歟。陳君之妻。偶得寒疾。羸弱已甚。徵太醫院判官鄭某治之。鄭請曰。愈否在我。幸無撓我。陳君許諾。鄭君乃視脈而療之。或謂藥性與疾戾。以語懾陳君。君不聽。任之不變。已而果愈。陳君出金帛謝之。鄭君辭曰。子善任吾故爾。使子不我任而自用。雖欲愈。可得耶。

孫真人曰。世間凡有病人親朋。故舊交游來問疾。其人曾不經事。未讀一方。自誇了了。詐作明能。談說異端。或言是虛。或言是實。或云是風。或云是

今之通

蟲。或云是水。或云是痰。紛紛謬說。種種不同。破壞病人心意。不知孰是。遷延未就。時不待人。歛然致禍。各自散走。是故大須好人。及好名醫。識病深淺。探蹟方書。博覽古今。事事明解者看病。不爾。大誤人事。見聞搜玉云。飲食男女。人之大欲存焉。制之若無期。爲聖人。節而不縱。可謂賢人。縱而不節。是爲下愚。蓋殺生以資口腹。淫欲以喪天真。二者更相助法。因美飲食。則血氣盛。血氣盛。則淫欲多。淫欲多。則反損血氣。血氣損。則又賴飲食以資補。是二者更相造罪也。若欲省口腹。先節淫欲。若能節淫欲。即可省口腹。此乃安身延年之道。若縱之。則人生受用之數有限。限

盡則早終矣。

徐春甫云。愚見患者小愈。胃氣纔回。咸謂以爲能食者不死。率意恣欲。妄投厚味。惟其不嗜勝人爲憂。噫。弗思甚也。殊不悟厚味逐邪。古人攝養。每以寡嗜欲。薄滋味爲先。况病人傷敗之際。而又重傷。其不危殆者寡矣。又見久病之人。少愈而目尙昏。腰尙重痛。謂病久鬱抑。精閉不通。率爾入房。以疏鬱結。往三行而病遽起。反至不救者多矣。飲食不節。反輕爲重。反安爲危者。歷歷有之。此天下之通弊。惟賢者知之。

本草衍義云。身以安樂爲本。安樂以保養爲本。本旣固。疾病何由而生。夭橫何由而至。攝生之道。無逮於此。夫草木無知。猶假灌溉。矧人爲萬物之靈。豈不資保養。然保養之義。其理萬計。約而言之。其術有三。一養神。二惜氣。三隄疾。忘情去智。恬憺虛無。離事全真。內外無寄。如是。則神不內耗。境不外惑。真一不雜。神自寧矣。此養神也。抱元一之本根。固歸真之精氣。三焦定位。六賊忘形。識界旣空。大同斯契。則氣自定矣。此惜氣也。飲食得宜。溫涼合度。出處無犯於八邪。寤寐不可以勉強。則身自安矣。此隄疾也。

和氣湯 專治一切客風怒氣。怨氣抑鬱不平之氣。先用一忍字。後用一忘字。右二味和勻。不語唾送下。服後更飲醇酒五七杯。使熏然半酣尤佳。快活無憂散 除煩惱。斷妄想。右二味等。研爲極細末。用清淨湯調服。凡合此藥。先要灑掃一淨室。窓櫺虛朗。前列小檻。栽花種竹。貯水養魚。室中設一几。一榻。一蒲團。每跏趺靜坐。瞑目調息。將前藥服之。至三炷香久。任意所適。或散步空庭。吟弄風月。或展玩法帖名畫。或歌古詩二三首。倦則啜茗一甌。就枕偃息。久之。覺神清氣爽。天君泰然。不知人間有煩惱。不見我心有妄想。斯則效可睹矣。

我命在我。不在於天。愚人所自致百病。風邪者。皆由恣意極情。不知自惜。故虛損生也。譬如枯朽之木。遇風卽折。將崩之岸。值水先頽。今若不能服藥。但知愛精節情。亦得一二百年壽也。

吳山里人日記云。太上曰。真人在己。莫問鄰。老子曰。事天治人。莫如嗇。是爲深根固蒂。長生久視之道。則彼家採戰之說。決非真道可知矣。其原始於富貴。人旣欲長生。又耽情慾。方術之士。因進其說。以逢其慾。而要重脣。

老到之語

據余所見。士大夫誤信而誤用之。弱者必夭。強者必衰。大都不得終其天年。況長生乎。夫參耆草木也。可以補虛。酒肉長食也。可以助羸。秋石河車。人所棄也。製而服之。可以起廢。如所云二弦真氣。童少津液。豈得無補。但採取之法。既無真傳。臨境之時。又多危險。所得者少。所失者多。不如一切屏絕可也。

奉親養老書云。老人之食。宜其溫熱熟軟。忌粘硬生冷。每日晨朝。宜以醇酒先進。平補下元藥一服。女人則平補血海藥一服。無燥熱者良。尋猪羊腎。煮一盃壓之。五味葱薤鶉羹等粥皆可。至辰時。服人參平氣散一服。然後次第以順四時溫軟飲食進之。食後引行一二百步。令運動消散。臨臥時。進化痰利膈人參半夏圓一服。尊年之人。不可頓飽。但頻頻與食。使脾胃易化。穀氣長存。若頓令飽食。腸胃虛薄。不能消納。故成疾患。爲人子者。深宜體悉。此養老之大要也。日止可進前藥三服。不可多餌。如無疾患。亦不須服藥。但只調停飲食。自然無恙矣。

奉親養老書云。老人藥餌。止是扶持之法。只可用溫平順氣。進食補虛。中

和之藥治之。不可用市肆贖買。他人惠送。不知方味。及狼虎之藥。與之服餌。切宜詳審。

奉親養老書云。天癸數窮。則精血耗竭。神氣浮弱。返同小兒。全假將護。以助衰晚。若遇水火兵寇。非橫驚怖之事。必先扶持老人於安穩處。避之。不可喧忙驚動。尊年之人。一遭大驚。便至冒昧。因生餘疚。凡喪葬凶禍。不可令弔。疾病危困。不可令問。寢寐飲食。不可令驚。悲哀憂愁。不可令人預報。穢惡臭敗。不可令聞。生冷粘硬毒物。不可令食。蔽漏卑濕。不可令居。卒風暴寒。不可令冒。煩惱大熱。不可令中。動作行步。不可令勞。暮夜之食。不可令飽。陰霧晦暝。不可令饑。假借鞍馬。可不令乘。偏僻藥餌。不可令服。廢宅欹宇。不可令入。墳園塚墓。不可令遊。危險之地。不可令登。淵急之水。不可令渡。闇昧之室。不可令孤。凶禍遠報。不可令知。輕薄婢使。不可令親。家園冗事。不可令管。皆宜忌之。以保長年。

奉親養老書云。老人骨肉疎。冷風易中。若窄衣貼身。暖氣着體。自然氣血流利。四肢和暢。雖遇盛夏。亦不可袒露。其頸後連項。常用紫軟夾帛。自頸

後巾幘中。垂下着肉。入衣領中。至背脾間。以護腠理。中年人肌肉瘦怯。腠理開疎。若風傷腠中。便成大患。深宜慎之。

瑣碎錄云。老不醫風。非不醫風也。只當調氣爾。少不醫勞。非不醫勞也。只當調脾爾。

瑣碎錄云。世人奉養。往往倒置。早漱口。不若將困而漱。去齒間所積。牙亦堅固。

千金要方云。大喜大悲。男女熱病未差。女子月血新產者。不可合陰陽。熱疾新差。交者死。

千金要方云。老子曰。凡人生多疾病者。是風日之子。生而早死者。是晦日之子。在胎而傷者。是朔日之子。生而母子俱死者。是雷霆霹靂日之子。能行步有知而死者。是下旬之子。兵血死者。是月水盡之子。又是月蝕之子。能胎不成者。是弦望之子。命不長者。是大醉之子。不癡必狂者。是大勞之子。生而不成者。是平曉之子。意多恐悸者。是日出之子。好爲盜賊貪欲者。是禺中之子。性行不良者。是日中之子。命能不全者。是日映之子。好詐及

妄者。是晡時之子。不音耳聾者。是人定之子。天地閉。氣不通。其子死。夜半合陰陽。生子上壽。賢明。夜半後合會。生子中壽。聰明智慧。雞鳴合會。生子下壽。尅父母。此乃天地之常理也。

千金要方云。患赤目。須忌房事。不然。令人患內障。

千金要方云。善攝生者。凡覺陽事轉盛。必謹而抑之。不可縱心竭意。以自賊也。若一度制得。則一度火滅。一度增油。若不能制。縱情施瀉。卽是膏火將滅。更去其油。可不深自防。

千金要方云。夜夢惡。不須說。旦以水面東嚥之。咒曰。惡夢着草木。好夢成寶玉。卽无咎也。

巢氏病源論云。人臥不寤。皆是魂魄外遊。爲他邪所枕錄。欲還未得。致成魘也。忌火照。則神魂不復入。乃至於死。而人有於燈光前魘者。是本由明出。故不忌矣。

葛洪肘後方云。人忽不寤。勿以燈照之。殺人。但痛嚙撮脣髮際而唾其面。則清。取韭搗汁。吹鼻中。薤汁亦得。冬乃用韭根汁。灌于口中。

瑣碎錄云。浴出不可和衫裙寢熟。恐成外腎疼。腰背拳曲。方勻泊宅篇云。眼疾不可浴。浴則病甚。至有失明者。能斷沐頭。則一生無眼疾。

沐浴身心經云。沐浴用五種香湯。一者白芷。能去三尸。二者桃皮。能辟邪氣。三者柏葉。能降真仙。四者零陵香。能集靈聖。五者青木香。能消穢召真。本草云。甌氣水浴髮。令髮長密黑潤。

本草云。乾粳米飯。常食令人熱中。脣口乾。不可和蒼耳食。令人卒心痛。急燒倉米炭。和蜜漿服之。不爾。卽死。不可與馬肉食。發痼疾。陳倉米亦然。

張文潛云。張安道每晨起。食粥一大盃。空腹胃虛。穀氣便作。所補不細。又極柔膩。與藏府相得。妙齊和尚說。山中僧每將旦一粥。甚繫利害。如不食。則終日覺藏府燥渴。蓋能暢胃氣。生津液也。東坡云。夜坐饑甚。吳子野勸食白粥。云能推陳致新。利膈養胃。

食治通說云。食飲以時。饑飽得中。水穀變化。冲氣和融。精血以生。榮衛以行。府藏調平。神志安寧。正氣充實於內。元真通會於外。內外邪沴。莫能干。

一切疾患無從作。

瑣碎錄云。啖資餌之類過多。覺不快者。唯飲酒至醉。則既醒之後。所苦皆差。其效過於服藥。陳橘皮湯亦能解。

食治通說云。當盛夏時。食飲加意調節。緣伏陰在內。腐化稍遲。又果蔬園蔬。多將生噉。蘇水桂漿。唯冷飲生冷相值。尅化尤難。微傷即飧泄。重傷即霍亂吐利。是以暑月食物。尤要節減。使脾胃易於磨化。戒忌生冷。免有腹藏之患。

食治通說云。好食生冷者。將爲腹痛心疼。嘔吐泄痢之疾。好食炙煇者。將爲口瘡咽痛。壅熱癰瘍之疾。

翰府名談云。今人食冷物。必飲湯。將溫其脾。已冰其脾。何溫之有。不若未食冷物。先飲湯溫之。繼食冷無患。

千金要方云。善養性者。先饑而食。先渴而飲。食欲數而少。不欲頓而多。則難消也。常欲令如飽中饑。饑中飽耳。蓋飽則傷脾。饑則傷氣。故每學淡食。食當熟嚼。使米泔入腹。

先飲溫
後食冷
何取於
冷可笑

食治通說云。食飲之宜。當候已饑而進食。食不厭熟嚼。仍候焦渴而引飲。飲不厭細呷。無待饑甚而後食。食不可大飽。或覺微渴而省飲。飲不欲太頻。食不厭精細。食不厭溫熱。

王叔和洞識攝生之道。常謂人曰。食不欲雜。雜則或有所犯。當時或無災患。積久爲人作疾。尋常飲食。每令得所。多飡令人膨脹短氣。或致暴疾。夏至秋分。少食肥膩餅臠之屬。此物與酒食瓜果相妨。當時不覺病。入秋陽消陰盛。寒氣總至。多諸暴卒。良由涉夏取冷太過。飲食不節故也。而不達者。皆至病至之日。謂是受病之始。不知其所由來者漸矣。豈不惑哉。

瑣碎錄云。食後以小紙撚打噴嚏數次。氣通則目自明。痰自化。

食療本草云。野鴨九月以後。卽中食。全勝家者。雖寒不動氣。人身上小熱瘡。多年不好者。但多食之。卽瘡。

本草云。飲食須逐日熬熟用。經宿卽動氣。有牙齒并脾疾人。切不可吃。

瑣碎錄云。伏熱者。不可飲水。衝寒者。不可飲湯。

本草拾遺云。溫病起。食蓴菜多死。

博物志云。秋蟹毒者。無藥可療。目相向。足斑者。尤甚。

食療本草云。女人倒生。吞麻子二三粒。即順生。

瑣碎錄云。欲醒酒。食橄欖。

瑣碎錄云。食韭後。楊枝皮擦牙。用冷水漱之。不作氣。

瑣碎錄云。大雪中跣足。不可便以熱湯洗。或飲熱酒。足指隨墮。

雲笈七籤云。飲食伏床凶。不可向北喫食。

本草服藥食忌。凡藥中有甘草。忌食猪肉、菘菜、海菜。黃連、胡黃連忌猪

肉、冷水。蒼耳忌猪肉、馬肉、米泔。桔梗、烏梅忌猪肉。仙茅忌牛肉、牛

乳。半夏、菖蒲忌羊肉、羊血、飴糖。牛膝忌牛肉。陽起石、雲母、鍾乳、硃

砂、礬石。並忌羊血。商陸忌犬肉。丹砂、空青、輕粉。並忌一切血。吳茱

萸忌猪心、猪肉。地黃、何首烏忌一切血、葱、蒜、蘿蔔。補骨脂忌猪血、蠶

薑。細辛、藜蘆忌狸肉、生菜。荊芥忌驢肉、黃頰魚、河豚、一切無鱗魚、蟹。

紫蘇、天門冬、丹砂、龍骨忌鯉魚。巴豆忌野猪肉、菰笋、蘆笋、醬、冷水。

蒼朮、白朮忌雀肉、青魚、菘菜、桃李。薄荷忌鱉肉。麥門冬忌鯽魚。常

山忌生葱、生菜。附子、烏頭、天雄。忌豉汁、稷米。牡丹忌葱、胡荽。厚朴、
草麻忌炒豆。鱉甲忌莧菜。威靈仙、土茯苓忌醋及一切酸味。蜜忌
鮓及生葱。

凡服藥不可雜食肥猪、犬肉、油膩、羹膾、腥臊、陳臭諸物。

凡服藥不可多食生蒜、胡荽、生葱、諸菓、諸滑滯之物。

凡服藥通忌見死屍、產婦、厭穢等事。

瑣碎錄云。凡服藥。藥氣與食氣不得相逢。食氣消。則服藥。藥氣散。則進食。
其藥有食前食後者。皆宜審此。

醫家難事有二情

張介賓著

一曰病人之情。所謂病人之情者。有素稟之情。如五藏各有所偏。七情各
有所勝。陽藏者。偏宜於涼。陰藏者。偏宜於熱。耐毒者。緩之無功。不耐毒者。
峻之爲害。此藏氣之有不同也。有好惡之情者。不惟飲食有憎愛。抑且舉
動皆關心。性好吉者。危言見非。意多憂者。慰安云僞。未信者。忠告難行。善

疑者。深言則忌。此情性之有不同也。有富貴之情者。富多任性。貴多自尊。任性者。自是其是。真是者。反成非是。自尊者。遇士或慢。自重者。安肯自輕。此交際之有不同也。有貧賤之情者。貧者衣食不能周。况乎藥餌。賤者焦勞不能釋。懷抱可知。此調攝之有不同也。又若有良言甫信。謬說更新。多歧亡羊。終成畫餅。此中無主而易亂者之爲害也。有最畏出奇。惟求穩當。車薪杯水。寧甘敗亡。此內多懼而過慎者之爲害也。有以富貴而貧賤。或深情而挂牽。戚戚於心。心病焉能心藥。此得失之情爲害也。有以急性而遭遲病。以更醫而致雜投。皇皇求速。速變所以速亡。此緩急之情爲害也。有偏執者。曰吾鄉不宜補。則虛者受其禍。曰吾鄉不宜瀉。則實者被其傷。夫十室且有忠信。一鄉焉能皆符。此習俗之情爲害也。有參朮入脣。懼補心先否塞。硝黃沾口。畏攻神卽飄揚。夫杯影亦能爲祟。多疑豈法之良。此成心之情爲害也。有諱疾而不肯言者。終當自誤。有隱情而不敢露者。安得其詳。然尙有故隱病情。試醫以脈者。使其言而偶中。則信爲明良。言有弗合。則目爲庸劣。抑孰知脈之常體。僅二十四。病之變象。何啻百千。是以

一脈所主非一病。一病所見非一脈。脈病相應者。如某病得某脈則吉。脈病相逆者。某脈值某病則凶。然則理之吉凶。雖融會在心。而病之變態。又安能以脈盡言哉。故知一知二知三。神聖諄諄於參伍。曰工曰神曰明。精詳豈獨於指端。彼俗人之淺見。固無足怪。而士夫之明慧。亦每有蹈此弊者。故忌望聞者。診無聲色之可辨。惡詳問者。醫避多言之自慚。是於望聞問切。已舍三而取一。且多有并一未明。可欲得夫病情者。吾知其必不能也。所以志意未通。醫不免爲病困。而朦朧猜疑。病不多爲醫困乎。凡此皆病人之情。不可不察也。

二曰傍人之情。所謂傍人之情者。如浮言爲利害所關。而人多不知檢。故或爲自負之狂言。則醫中有神理。豈其能測。或執有據之鑿論。而病情多玄豕。最所難知。或操是非之柄。則同於我者是之。異於我者非之。而真是真非。不是真人不識。或執見在之見。則頭疼者云救頭。脚疼者云救脚。而本標綱目。反爲迂遠庸談。或議論於貴賤之間。而尊貴執言。孰堪違抗。故明哲保身之士。寧爲好好先生。或辨析於親疎之際。而親者主持。牢不可

拔。雖真才實學之師。亦當唯唯而退。又若薦醫。爲死生之攸係。而人多不知慎。有或見輕淺之偶中。而爲之薦者。有意氣之私厚。而爲之薦者。有信其便便之談。而爲之薦者。有見其外飾之貌。而爲之薦者。皆非知之真者也。又或有貪得而薦者。陰利其酬。關情而薦者。別圖冀望。甚有斗筭之輩。者。妄自驕矜。好人趨奉。薰蕕不辨。擅肆品評。譽之則盜跖卽堯舜。毀之則鸞鳳亦鷓鴣。洗垢索瘢。無所不至。而懷真抱德之士。必其不侔。若此流者。雖其發言容易。欣戚無關。其於淆亂人情。莫此爲甚。多致明醫有掣肘之去。病家起刻骨之疑。此所以千古是非之不明。總爲庸人擾之耳。故竭力爲人任事者。豈不岌岌其危哉。凡此皆傍人之情。不可不察也。

只此數
事說微
醫家病
家骨髓
矣

三曰同道人之情。所謂同道人之情者。尤爲閃灼。更多隱微。如管窺蠡測。醯雞笑天者。固不足道。而見偏性拗。必不可移者。又安足論。有專恃口給者。牽合支吾。無稽信口。或爲套語以誑人。或爲甘言以悅人。或爲強辯以欺人。或爲危詞以嚇人。儼然格物君子。此便佞之流也。有專務人事者。典籍經書。不知何物。道聽途說。拾人唾餘。然而終日營營。綽風求售。不邀自

赴。僂媚取容。偏投好者之心。此阿諂之流也。有專務奇異者。腹無藏墨。眼不識丁。乃詭言神授。僞託祕傳。或假脈以言禍福。或弄巧以亂經常。最覺新奇。動人甚易。此欺詐之流也。有務飾外觀者。誇張侈口。羊質虎皮。不望色。不聞聲。不詳問。一診而藥。若謂人淺我深。我明人昧。此粗疎孟浪之流也。有專務排擠者。陽若同心。陰爲浸潤。夫是曰是非。曰非。猶避隱惡之嫌。第以死生之際。有不得不辨者。固未失爲真誠之君子。若以非爲是。以是爲非。顛倒陰陽。掀翻禍福。不知而然。庸庸不免。知而故言。此其良心已喪。讒妬之小人也有。貪得無知。藐人性命者。如事已疑難。死生反掌。斯時也。雖在神良。未必其活。故一藥不敢苟。一着不敢亂。而僅僅冀於挽回。忽遭若輩求速貪功。謬妄一投。中流失楫。以致必不可救。因而嫁謗自文。極口反噬。雖朱紫或被混淆。而蒼赤何辜受害。此貪倖無知之流也。有道不同。不相爲謀者。意見各持。異同不決。夫輕者不妨少謬。重者難以略差。故凡非常之病。非非常之醫。不能察。用非常之治。又豈常人之所知。故獨聞者。不侔於衆。獨見者。不合於人。大都行高者謗多。曲高者和寡。所以一齊之。

傳。何當衆楚之咻。直至於敗。而後羣然退散。付之一人。則事已無及矣。此庸庸不揣之流也。又有久習成風。苟且應命者。病不關心。些須惟利。蓋病家既不識醫。則倏趙倏錢。醫家莫肯任怨。則惟苓惟梗。或延醫務多。則互爲觀望。或利害攸係。則彼此避嫌。故爬之不癢。搥之不痛。醫稱穩當。誠然得矣。其於坐失機宜。奚堪耽誤乎。此無他。亦惟知醫者不真。而任醫者不專耳。詩云。發言盈庭。誰執其咎。築室於道。不潰於成。此病家醫家近日之通弊也。尙多難盡。必期不失。未免遷就。但遷就則礙於病情。不遷就則礙於人情。有必不可遷就之病情。而復有不得不遷就之人情。其將奈之何哉。當局者能詳察斯言。而各爲儆省。非惟病人之情。傍人之情。同道人之情。不難於不失。而相與共保天年。同登壽域之地。端從此始。惟明者鑒之。陶弘景曰。凡煮湯須微火。令小沸。其水依方大略二十兩。藥用水一斗。煮取四升。以此爲推。然利湯欲生。少水而多取汁。補湯欲熟。多水而少取汁。不得令水多少。用新布兩人一尺木絞之。澄去涎濁。紙覆令密。溫湯勿用鐵器服。湯寧小沸。熱則易下。冷則嘔湧。

李時珍曰。陶氏所說。乃古法也。今之小小湯劑。每一兩。用水二甌爲準。多則加。少則減之。如劑多水少。則藥味不出。劑少水多。又煎耗藥力也。凡煎藥。並忌銅鐵器。宜用銀器瓦罐。洗淨封固。令小心者看守。須識火候。不可太過不及。火用木炭蘆葦爲佳。其水須新汲味甘者。流水井水沸湯等。各依方法。若發汗藥。必用緊火熱服。攻下藥。亦用緊火煎熟。下硝黃再煎。溫服。補中藥。宜慢火溫服。陰寒急病。亦宜緊火急煎服之。又有陰寒煩躁。及暑月伏陰在內者。宜水中沉冷服。

孫真人曰。夫百病之本。有中風、傷寒、寒熱、溫瘧、中惡、霍亂、大腹、水腫、腸癖、下利、大小便不通、貴豚、上氣、咳逆、嘔吐、黃疸、消渴、留飲、癖食、堅積、癥瘕、驚邪、癰疽、鬼證、喉痺、齒痛、耳聾、目盲、金瘡、痿折、癰腫、惡瘡、痔瘻、瘤癭。男子五勞七傷、虛乏羸瘦、女子帶下、崩中、血閉、陰蝕、蠱蛇、蠱毒。此皆大略。宗兆其間。變動枝葉。各依端緒以取之。又有冷熱勞損、傷飽、房勞驚悸、恐懼、憂恚、恍惚。又有產乳、落胎、墮下、瘀血。又有貪餌玉石。以求房中之樂。此皆病之根源爲患。生諸枝葉也。不可不知其本末。但尙醫說。男女長幼之病。有半

與病源相附會者。便可服藥也。男子者。衆陽所歸。常居於燥。陽氣游動。強力施泄。便成勞損。損傷之病。亦以衆矣。若比之女人。則十倍易治。凡女子十四已上。則有月事。月事來日。得風冷濕熱。四時之病相協者。皆自說之。不爾。與治誤相觸動。更增困也。處方者。亦應問之。

孫真人曰。比來田野下里家。因市得藥。隨便市上僱人搗合。非止諸不如法。至於石斛。菟絲子等難搗之藥。費人功力。賃作搗者。隱主悉盜棄之。又爲塵埃穢氣入藥中。羅篩粗惡。隨風飄揚。衆口嘗之。衆鼻嗅之。藥之精氣。一切都盡。與朽木不殊。又復服餌。不能盡如法。服盡之後。反加虛損。遂謗醫者。處方不效。夫如此者。非醫之咎。自緣發意甚誤。宜熟思之。

玉華子云。知邪思者。覺也。斷邪思者。不續也。人之有疾。必有所因。及知其因。則謹於未因。及去其因。勿復其因。此愈疾之功也。斷念之覺。由於不續。每覺每去。勿續則已。故曰。瞥求是病。不續是藥。

張大復曰。殺物以療病。不若全物以療之之善也。昔予舅氏之病疹也。外大父將求鵲卵而療焉。既得之矣。鵲且逐卵而仆於地。大父傷之曰。有死

子而求生之。有生卵而必傷之。何見之舛也。遂舍之。夜半疹愈。夫使食卵而愈。未有不以爲卵驗矣。鵲有其卵而子得生。亦非鵲之能生之也。然而生非卵驗也。因是可以解世人之惑。余常病悸。有醫者教之食鰾。曰。食鰾則血滋。血滋則悸去。從之期月而悸自如也。一夕夢羣鰾來囓余。自頸以及於臂。膚無完者。覺而心怦怦焉。悸乃益甚。嗟乎。固有以殺而病甚者矣。

醫燈續焰終

醫燈續焰 卷二十一 醫家難事有三情

跋

嘗謂天地無脈。則轆轤不轉。山川無脈。則靈秀不鍾。草木無脈。則蒼翠不舒。凡所以能生生者。唯有脈之紆迴運行而已。乃知人一小天地耳。胎形於先。生成於後。形具而氣周。氣周而脈見。是人之生於脈也。益信。今欲治生者。孰不洞悉脈之原委。以察陰陽之虛實。辨臟腑之寒熱。定吉凶於呼吸乎。第紫虛以四言舉要。闡奧於前。意括未該。我師推廣於今。鉤深致遠。因脈及症。因症及方。辯析無剩義。而且多別解。卽郭象之註莊。張湛之註老。不是過焉。書成。題曰醫燈續燄。夫以五都九市之奇。羅於暗室。非太乙之藜。無以別其珍奇異寶。是集也。洵紫虛之薪傳。後學之指南也歟。所謂一燈纔煜。而千百世之暗皆除。予追隨歷有年所。周旋於風雨晦明。得藉離明之照。茲殺青告成。分校及門。因附言於殿。以是知壽天下。壽萬世者。端此矣。寧小補哉。壬辰浴佛日。甬東門人蔣式金頓首謹跋并書。

醫燈續焰跋